

**CALENDARIOS DE VACUNACIÓN INFANTIL DE ARAGÓN**
**Serie cronológica**

Versión 25/09/2017

	0 m	1 m	3 m	5 m	7 m	15 m	18 m	6 años	11 a	14 a
<b>1984</b>			VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP	SRP	VPO DT	VPO T	RUB Niñas	VPO T
<b>1995</b>	HB*	HB*	VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP HB*	SRP	VPO DTP	VPO DT	SRP Niñas Niños	dT HBx3*

**1984:** se incluye la vacuna de **Polio atenuada trivalente** desde la 1ª dosis.

**1995:** se incluye **Hepatitis B**, 3 dosis, en lactantes, a 0-1-7 meses y a los 14 años (\*oficialmente en 1995, en la práctica se incorpora en 1994); se añade **Pertussis** a los 18 meses; **Difteria** a los 6 y 14 años; **Sarampión, Rubeola y Parotiditis** segunda dosis a los 11 años, niños y niñas. Desaparece la **Polio atenuada** (VPO) a los 14 años.

	0 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
<b>1998</b>	HB	VPO DTP HB Hib	VPO DTP Hib	VPO DTP HB Hib	SRP	VPO DTPa Hib	VPO DT	SRP	dT HBx3
<b>1999</b>							SRP		
<b>2000</b>		MC	MC	MC				HBx3	
<b>2003</b>							DTPa		

**1998:** cambia **Hepatitis B** a 0-2-6 meses, **Haemophilus i. tipo b** (2-4-6 y 18 meses) y **Pertussis acelular** a los 18 meses.

Se cambia edad de primovacunación de polio, difteria, tétanos y Pertussis (2-4-6 meses).

**1999:** se adelanta **Sarampión, Rubeola y Parotiditis** a los 6 años (comienzo en septiembre) y se mantiene a los 11 años hasta que lleguen las cohortes de niños de 6 años a los 11 años.

**2000:** se adelanta la **Hepatitis B** a los 11 años (bajas coberturas a los 14 años) y se mantiene hasta que lleguen las cohortes de niños de los 11 años a los 14 años.

Se incluye la **Meningitis C conjugada** a los 2, 4 y 6 meses y se hace campaña para vacunar a todos los nacidos después de 1 de enero de 1995.

**2003:** a partir del 1 de mayo de 2003, se introduce la 5ª dosis de **Pertussis acelular** a los 6 años.

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2004	HB	HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC HB	SRP	VPI DTPa Hib	DTPa  SRP	HBx3 SRP	dT

#### 2004:

- **Polio inactivada (VPI):** sustituye a Polio atenuada (VPO). Desaparece la 5ª dosis de polio a los 6 años.
- **Hepatitis B:** se adelanta la 2ª dosis al primer mes de vida. A los 11 años administrar 3 dosis si no hay vacunación anterior. A los 14 años deja de administrarse de forma sistemática pero conviene revisar y completar dosis.
- **Pertussis:** Se sustituye en la primovacuna, la Pertussis de células enteras por la **acelular**.

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2005	HB	HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC HB	SRP	VPI DTPa Hib	DTPa  SRP		dT

#### 2005:

- **Hepatitis B:** a los 11 años deja de administrarse de forma sistemática, revisar y completar dosis si procede. Todos los niños al cumplir los 15 años de edad deberán haber recibido 3 dosis de vacuna frente a Hepatitis B. No está indicada la revacunación.
- **Sarampión, Rubeola y Parotiditis:** deja de administrarse la 2ª dosis a los 11 años de forma sistemática. Todos los niños al cumplir los 15 años deberán haber recibido 2 dosis de vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis.
- **Meningitis C conjugada:** Se realiza campaña de vacunación con **dosis única**, a todos los nacidos desde el 1/01/85 hasta el 31/12/94. A partir de esa fecha deberán tener al menos 1 dosis de vacuna conjugada frente a Meningitis C.

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2006	HB	HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib	VPI DTPa Hib MC HB	SRP	VPI DTPa Hib MC	DTPa  SRP	Varicela	dT

#### 2006:

- **Meningitis C:** se modifica la pauta de administración de la vacuna frente a Meningitis C, vacunando a los niños a 2, 6 y 18 meses de edad.
- **Varicela:** se vacuna frente a Varicela a los 11 años a los niños sin antecedentes de haber padecido la enfermedad, ni vacunación previa.

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
<b>2008</b>	HB		VPI DTPa Hib HB MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib HB	MC SRP	VPI DTPa Hib	DTPa  SRP	Var	Td  VPH x 3

**2008:**

- **Hepatitis B:** A los niños nacidos a partir del 1 de marzo de 2008, se vacuna a los 0, 2 y 6 meses de edad, utilizando a los 2 y 6 meses, vacunas Hexavalentes.
- **VPH:** Se vacuna frente a VPH (3 dosis) a las niñas de 14 años, es decir nacidas a lo largo del año 1994 (incluyéndose en los años sucesivos, las cohortes nacidas posteriormente a esa fecha).
- **Meningitis C:** A los niños nacidos a partir del 1 de marzo de 2008, se modifica la pauta de administración frente a Meningitis C, vacunando a los niños a los 2, 4 meses de edad (primovacunación) y 15 meses de edad (recuerdo).

**2009:**

- **Varicela:** A los 11 años, se pasa a pauta de 2 dosis, con intervalo mínimo de 1 mes.

**2011:**

- **dTpa:** A los 6 años de edad se sustituye la dosis de vacuna frente a DTPa de alta carga antigénica, por la vacuna de dTpa de baja carga antigénica.
- **Triple vírica:** Con motivo de la situación epidemiológica, adelanto temporal de la primera dosis desde los 15 a los 12 meses (se mantiene a los 15 meses para aquellos niños que no recibieron la primera dosis entre los 12 y los 15 meses).

**2012:**

- **VPH:** A partir de enero se vacuna frente a VPH según las niñas vayan cumpliendo los 14 años a las nacidas en 1998 y sucesivas, no esperando a noviembre para vacunar a todas de forma intensiva.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
<b>2008*</b>	HB	VPI DTPa Hib HB MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib HB	SRP	MC SRP**	VPI DTPa Hib	dTpa  SRP	Var x 2	Td  VPH x 3

\* Se considera vigente el calendario de 2008, con las instrucciones de 2009, 2011 y 2012 realizadas mediante Circulares de la Dirección General de Salud Pública.

\*\* A los 15 meses únicamente para aquellos que no recibieron la primera dosis previamente.

**2014:**

- **Meningitis C:** Nueva pauta: 4 meses, 12 meses y 12 años. Se suspende la dosis de los 2 meses y la de los 15 meses (se mantiene temporalmente a los 15 meses para aquellos niños que no recibieron la dosis a los 12 meses).
- **Triple vírica:** Se adelanta de forma definitiva la primera dosis desde los 15 a los 12 meses. Se adelanta la segunda dosis desde los 6 a los 3 años (se mantiene a los 6 años hasta que las cohortes de niños vacunados a los 3 años alcancen los 6 años).
- **Varicela:** Se retrasa la vacuna desde los 11 a los 12 años; únicamente para los niños sin antecedentes de haber padecido la enfermedad, ni de vacunación previa.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
<b>2014</b>	HB	VPI DTPa Hib HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib HB	MC SRP	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa	MC Var x 2	Td VPH *

\* VPH: 2 o 3 dosis dependiendo de la vacuna -consultar instrucciones específicas recogidas en la Circular de la DGSP nº 01/14-.

Para más detalle se puede consultar la Tabla Resumen de los Cambios de Calendario y Estrategias Temporales, Aragón 2014 y la Circular DGSP 02/2014.

**2015:**

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
<b>2015</b>	HB	VPI DTPa Hib HB	VPI DTPa Hib HB MC	VPI DTPa Hib HB	MC SRP	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa/ DTPa	MC Var x 2	Td VPH *

Por las dificultades de suministro de vacunas con componente frente a tosferina se sustituye la dosis de vacuna pentavalente de los 4 meses de edad por vacuna hexavalente. Parte de la cohorte de nacidos en 2009 recibe vacuna DTPa a los 6 años. Consultar Circulares DGSP 03/2015 y 05/2015-.

Comienza en diciembre la vacunación frente a **tosferina a las embarazadas en el último trimestre** de gestación. Consultar Circular DGSP 06/2015.

**2016 (Orden de 15/10/2015):**

- **Vacuna antineumocócica conjugada:** Pauta: 2 meses, 4 meses y 12 meses. Para nacidos después del 1 de enero de 2016, comienzo el 01/03/2016. Circular DGSP 01/2016.
- **VPH:** Se adelanta la vacunación desde los 14 años a los 12 años; comienzo el 04/01/2016 para las nacidas en 2004.

Se mantiene la vacunación a los 14 años hasta que las chicas vacunadas a los 12 años alcancen los 14 años de edad. Pauta con dos dosis -tanto a los 12 como los 14 años-. Circular DGSP 07/15.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
<b>2016</b>	HB	VPI DTPa Hib HB Nc	VPI DTPa Hib <b>HB</b> Nc MC	VPI DTPa Hib HB	Nc MC SRP	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa/ <b>DTPa</b>	MC  VPH x 2 Var x 2	Td

Se mantiene la sustitución de la dosis de vacuna pentavalente de los 4 meses de edad por vacuna hexavalente.

Se retrasa la dosis de vacuna DTPa / dTpa de los 6 años a los niños nacidos en 2010 -y siguientes si fuera necesario- a la espera de disponibilidad de dosis. En 2016 se vacunará a los nacidos en 2009 que no hayan recibido aún la dosis -Circular DGSP 05/2015 y Notas informativas de 10/12/2015 y 02/02/2016-.

En 2016 se administra la vacuna triple vírica a los 6 años a los nacidos en 2010 -última cohorte pendiente de vacunar a esta edad-.

**2016 (Orden de 21/03/2016):**

- **Vacuna frente a varicela:** Pauta: 15 meses y 3 años. Comienzo el 01/04/2016 para nacidos a partir del 1 de enero de 2015. Circular DGSP 02/2016.

Se mantiene la vacunación a los 12 años, con dos dosis, para aquellas personas que refieran no haber pasado previamente la enfermedad ni haber sido vacunados previamente.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
<b>2016</b>	HB	VPI DTPa Hib HB Nc	VPI DTPa Hib <b>HB</b> Nc MC	VPI DTPa Hib HB	Nc MC SRP	Var	VPI DTPa Hib	SRP  Var	dTpa/ <b>DTPa</b>	MC  VPH x2 Var x2	Td   <b>VPH x2</b>

Se mantiene la sustitución de la dosis de vacuna pentavalente de los 4 meses de edad por vacuna hexavalente por dificultades de suministro.

Se retrasa la dosis de vacuna DTPa o dTpa de los 6 años a los niños nacidos en 2010 -y siguientes si fuera necesario- a la espera de disponibilidad de dosis. En 2016 se vacunará exclusivamente a los nacidos en 2009 que no hayan recibido aún la dosis -Circular DGSP N° 05/2015 y Notas informativas de 10/12/2015 y 02/02/2016-.

En 2016 se administra la vacuna triple vírica a los 6 años a los nacidos en 2010 -última cohorte pendiente de vacunar a esta edad-. Circular DGSP 02/2014

Para más detalle se puede consultar la Tabla Resumen de los Cambios de Calendario y Estrategias Temporales y las Circulares de la DGSP 07/2015 (vacuna VPH), DGSP 01/2016 (vacuna conjugada frente a neumococo) y DGSP 02/2016 (vacuna varicela).

**2017 (Orden de 13/12/2016), en vigor desde el 10/01/2017:**

- **Vacuna frente a hepatitis B:** Desde el 10/01/2017 se suspende la vacunación universal frente a hepatitis B al nacimiento. Se reserva la vacunación al nacer exclusivamente para hijos de madres portadoras de Ag HBs -junto con inmunoglobulina específica- y de madres sin resultados serológicos en el momento del parto -se realizará analítica de urgencia-.
- **Nueva pauta vacunación 2+1 con vacunas hexavalentes:** Se incorpora la nueva pauta de vacunación "2+1" frente a hepatitis B, DTPa, VPI, *Haemophilus influenzae* b: los niños recibirán únicamente dos dosis como primovacuna -la primera a los 2 meses de edad y la segunda a los 4 meses de edad-.
  - Por tanto, desde el 10/01/2017 se suspende la administración de la 3ª dosis de primovacuna a los 6 meses de edad.
  - Estos niños recibirán un primer recuerdo con vacuna hexavalente a los 11 meses de edad -comenzará en junio de 2017- y por tanto, no recibirán el recuerdo a los 18 meses.
  - Estos mismos niños recibirán un segundo recuerdo, cuando alcancen los 6 años de edad, con vacuna DTPa-VPI -vacuna Tétanos, Difteria, Tosferina acelular de alta carga antigénica y antipoliomielítica inactivada-, previsiblemente en 2022.
  - Los niños que hayan comenzado la pauta "3+1" antes del 10/01/2017 -aquellos que recibieron a los 6 meses una dosis de vacuna hexavalente- recibirán un primer recuerdo con pentavalente a los 18 meses y un segundo recuerdo a los 6 años con vacuna dTpa. Es decir, no se les adelanta el recuerdo a los 11 meses ni cambian el tipo de vacuna que recibirán a los 6 años.
- **Vacuna conjugada frente a neumococo:** A los niños vacunados con la pauta "2+1" la edad de administración del recuerdo de vacuna antineumocócica se adelanta desde los 12 meses a los 11 meses de edad. Los niños vacunados con pauta "3+1" seguirán recibiendo el recuerdo de vacuna conjugada frente a neumococo a los 12 meses de edad.

**Tabla resumen. En rojo y en negrita vacunaciones "de transición"**

	0 m	2 m	4 m	11 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
<b>2017</b>	<i>HB</i>	VPI DTPa Hib HB Nc	VPI DTPa Hib HB Nc MC	VPI DTPa Hib HB Nc	<b>Nc<sup>1</sup></b> MC SRP	Var	<b>VPI</b> <b>DTPa</b> <b>Hib<sup>2</sup></b>	SRP  Var	VPI DTPa / <b>dTpa<sup>3</sup></b>	MC  VPH x2 Var x2	Td  <b>VPH x2<sup>4</sup></b>

1 Se mantiene la dosis de recuerdo con vacuna conjugada frente a neumococo a los 12 meses de edad hasta que los vacunados con la pauta 2+1 -ya con recuerdo administrado a los 11 meses- alcancen esta edad, previsiblemente en julio de 2017. Durante junio de 2017 se vacunará a los 11 y 12 meses de edad.

2 Se mantiene la dosis de recuerdo con vacuna pentavalente a los 18 meses de edad hasta que los vacunados con la pauta 2+1 -con recuerdo a los 11 meses- alcancen esta edad, previsiblemente en enero de 2018.

3 Se ha recuperado la dosis de vacuna dTpa de los 6 años a los niños nacidos en 2011 en abril de 2017 -Circular DGSP 03/2017- y de los nacidos en 2010 en septiembre niños nacidos en 2011 en abril de 2017 -Circular DGSP 08/2017-. Sin vigor la Circular DGSP 05/2015 y Notas informativas de 10/12/2015 y 02/02/2016.

4 Se mantiene la vacunación frente a VPH a los 14 años, durante 2017 para las nacidas en 2003; en 2018 se suspende a los 14 años, dado que las chicas vacunadas a los 12 años alcanzarán los 14 años de edad -nacidas en 2004 y siguientes cohortes-. Pauta con dos dosis -tanto a los 12 como los 14 años-. Circular DGSP 07/2015.

**Neumococo**, únicamente para nacidos en 2016 y siguientes cohortes. Los niños con factores de riesgo recibirán una dosis adicional a los 6 meses de edad. Circular DGSP 01/2016.

**Varicela**, segunda dosis a los 3 años para nacidos en 2015 y siguientes cohortes -esta vacunación comenzará en 2018-. Circular DGSP 02/2016.

Varicela a los 12 años, dos dosis, exclusivamente para aquellos que no hayan pasado la enfermedad ni estén previamente vacunados.

En 2017 se suspende administración la segunda dosis de vacuna **triple vírica** a los 6 años, dado que los vacunados a los 3 años alcanzarán esta edad -nacidos en 2011 y siguientes cohortes-. Circular DGSP 02/2014.

Se mantiene la vacunación frente a **tosferina** (vacunas dTpa) a las **embarazadas en el último trimestre** de gestación. Circular DGSP 06/2015.

HB: Hepatitis B; VPI: Vacuna Polio Inactivada; Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b;

DTPa: Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular de alta carga; MC: Meningococo C;

Nc: Neumococo conjugada; dTpa: Difteria, Tétanos, Pertussis acelular de carga reducida;

Td: Tétanos, Difteria tipo adulto; SRP: Sarampión, Rubeola, Parotiditis;

Var: Varicela; VPH: Virus del Papiloma Humano.

Para más detalle se puede consultar la **Tabla Resumen de los Cambios de Calendario y Estrategias Temporales y la Circular DGSP 04/2016** (Implantación Nuevo Calendario Vacunación 2017).

Sobre la **profilaxis perinatal frente a la hepatitis B** se puede consultar la **Circular DGSP 03/2016** y la tabla resumen.

**Para más información:** [www.aragon.es/vacunas](http://www.aragon.es/vacunas)