

CALENDARIO DE VACUNACIÓN SISTEMÁTICA EN POBLACIÓN ADULTA

VACUNAS	15-64 años	65 y más años
VACUNACIÓN EN POBLACIÓN GENERAL		
Tétanos-difteria	Td ¹	Td ^{1,2}
Triple vírica	TV ³	
Varicela	VVZ ⁴	
Herpes zóster		HZ ⁵
Antineumocócica		VN ⁶
Gripe		Campaña anual
<p>¹ Vacunar o completar vacunación en caso de no tener 5 dosis administradas.</p> <p>² Revisar estado vacunal a los 65 años; iniciar o completar pauta de vacunación si procede. Si pauta completa (5 dosis), administrar una dosis de recuerdo si han transcurrido más de 10 años desde la última dosis.</p> <p>³ Nacidos a partir de 1970, vacunar con 2 dosis si es susceptible. Pauta 2 dosis (0, 1 meses).</p> <p>⁴ Personas que no han pasado la enfermedad ni han sido vacunadas. Si tiene 18 o más años, pedir serología. Pauta 2 dosis (0, 2 meses). Se realizará búsqueda activa en los nacidos después del 1/01/1970.</p> <p>⁵ Cohortes que cumplen 65 años y 80 años en el año en curso. Dos dosis (0, 2 meses).</p> <p>⁶ Cohorte que cumple 65 años en el año en curso. Una única dosis.</p>		
VACUNACIÓN EN COHORTES ESPECÍFICAS		
Hepatitis B		HB ⁷
Meningococo ACWY		MenACWY ⁸
Virus Papiloma Humano		VPH ⁹
<p>⁷ Nacidos a partir de 1980 no vacunados previamente. No se precisa serología pre- ni pos-vacunación. Pauta 3 dosis (0, 1 y 6 meses).</p> <p>⁸ Nacidos después del 01/01/2000 hasta los 20 años, incluidos, si no han recibido 1 dosis de esta vacuna después de los 10 años de edad. Pauta 1 dosis.</p> <p>⁹ Mujeres nacidas después del 1/1/1994 hasta los 26 años, incluidos. Pauta 3 dosis.</p>		
VACUNACIÓN EN MUJER EMBARAZADA		
Difteria-Tétanos-Tosferina		dTpa ¹⁰
Gripe		Gripe ¹¹
<p>¹⁰ 1 dosis en cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28.</p> <p>¹¹ En cada embarazo, independiente de su edad gestacional, si coincide con la temporada gripal.</p>		

INDICACIONES DE SEROLOGÍA PREVIA:

Varicela: en mayores de 18 años, sin antecedentes de padecer varicela o herpes zóster ni vacunación documentada. Solicitar IgG.

Hepatitis B: solo en personas con alto riesgo de exposición (conviviente o contacto sexual de portador AgHBs, infección por el VIH, personas que se inyectan drogas o inmigrantes provenientes de países de alta endemia).