

Serie cronológica CALENDARIOS DE VACUNACIÓN INFANTIL Versión 28/02/2020

En España la vacunación se inicia en 1800 con la vacuna frente a la viruela, no se alcanzan buenas coberturas hasta mediados del s. XX, lo que permite eliminar la enfermedad en España.

La vacunación masiva con BCG -tuberculosis- comienza en 1956, se calcula que se vacunó al 80% de los niños entre los 5 y los 14 años.

Los programas de vacunación se inician en 1963 con la introducción de la vacuna oral frente a la poliomielitis (VPO) en forma de campañas masivas. En 1965 se incorpora a las campanas la vacuna frente a difteria-tétanos y tosferina (DTP).

A partir de 1975 se implanta el primer calendario nacional de vacunación infantil. Las coberturas de vacunación en estos primeros años no se consideran óptimas.

CALENDARIOS DE VACUNACIÓN PREVIOS A LAS TRASFERENCIAS EN SANIDAD

	0 m	3 m	5 m	7 m	9 m	15 m	18 m	20 m	6 a	11 a	14 a
1975	BCG	VPO ¹ DTP	VPO DTP	VPO DTP		VPO DT		Viruela	VPO T		VPO T
1978	BCG	VPO ¹ DTP	VPO DTP	VPO DTP	SAR	VPO DT		Viruela	VPO T	RUB Niñas	VPO T
1980		VPO ¹ DTP	VPO DTP	VPO DTP	SAR	VPO DT			VPO T	RUB Niñas	VPO T
1981		VPO ¹ DTP	VPO DTP	VPO DTP		SRP ²	VPO DT		VPO T	RUB Niñas	VPO T

¹ Dosis VPO 3 meses solo monocomponente (frente a poliomielitis 1); resto dosis trivalentes.

² Sarampión a los 9 meses en niños de especial riesgo.

CALENDARIOS DE VACUNACIÓN INFANTIL DE ARAGÓN

1984: se incluye la vacuna de **Polio atenuada trivalente** desde la 1ª dosis.

	0 m	1 m	3 m	5 m	7 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
1984			VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP	SRP	VPO DT	VPO T	RUB Niñas	VPO T

1995: se incluye **Hepatitis B**, 3 dosis, en lactantes, a 0-1-7 meses y a los 14 años (*oficialmente en 1995, en la práctica se incorpora en 1994); se añade **Pertussis** a los 18 meses; **Difteria** a los 6 y 14 años; **Sarampión, Rubeola y Parotiditis** segunda dosis a los 11 años, niños y niñas. Desaparece la **Polio atenuada** (VPO) a los 14 años.

	0 m	1 m	3 m	5 m	7 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
1995	HB*	HB*	VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP HB*	SRP	VPO DTP	VPO DT	SRP Niñas Niños	dT HBx3*

1998: cambia **Hepatitis B** a 0-2-6 meses, **Haemophilus i. tipo b** (2-4-6 y 18 meses) y **Pertussis acelular** a los 18 meses.

Se cambia edad de primovacunación de polio, difteria, tétanos y Pertussis (2-4-6 meses).

	0 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
1998	HB	VPO DTP HB Hib	VPO DTP Hib	VPO DTP HB Hib	SRP	VPO DTPa Hib	VPO DT	SRP	dT HBx3

1999: se adelanta **Sarampión, Rubeola y Parotiditis** a los 6 años (comienzo en septiembre) y se mantiene a los 11 años hasta que lleguen las cohortes de niños de 6 años a los 11 años.

	0 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
1999	HB	VPO DTP HB Hib	VPO DTP Hib	VPO DTP HB Hib	SRP	VPO DTPa Hib	VPO DT SRP	SRP	dT HBx3

2000: se adelanta la **Hepatitis B** a los 11 años (bajas coberturas a los 14 años) y se mantiene hasta que lleguen las cohortes de niños de los 11 años a los 14 años.

Se incluye la **Meningitis C conjugada** a los 2, 4 y 6 meses y se hace campaña para vacunar a todos los nacidos después de 1 de enero de 1995.

	0 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2000	HB	VPO DTP HB Hib MC	VPO DTP Hib MC	VPO DTP HB Hib MC	SRP	VPO DTPa Hib	VPO DT SRP	HBx3 SRP	dT HBx3

2003: a partir del 1 de mayo de 2003, se introduce la 5ª dosis de **Pertussis acelular** a los 6 años.

	0 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2003	HB	VPO DTP HB Hib MC	VPO DTP Hib MC	VPO DTP HB Hib MC	SRP	VPO DTPa Hib	VPO DTPa SRP	HBx3 SRP	dT HBx3

2004:

- **Polio inactivada (VPI):** sustituye a Polio atenuada (VPO). Desaparece la 5ª dosis de polio a los 6 años.
- **Hepatitis B:** se adelanta la 2ª dosis al primer mes de vida. A los 11 años administrar 3 dosis si no hay vacunación anterior. A los 14 años deja de administrarse de forma sistemática, pero conviene revisar y completar dosis.
- **Pertussis:** Se sustituye en la primovacunación, el componente Pertussis de célula entera por **acelular**.

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2004	HB	HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC HB	SRP	VPI DTPa Hib	DTPa SRP	HBx3 SRP	dT

2005:

- **Hepatitis B:** a los 11 años deja de administrarse de forma sistemática, revisar y completar dosis si procede. Todos los niños al cumplir los 15 años de edad deberán haber recibido 3 dosis de vacuna frente a Hepatitis B. No está indicada la revacunación.
- **Sarampión, Rubeola y Parotiditis:** deja de administrarse la 2ª dosis a los 11 años de forma sistemática. Todos los niños al cumplir los 15 años deberán haber recibido 2 dosis de vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis.
- **Meningitis C conjugada:** Se realiza campaña de vacunación con **dosis única**, a todos los nacidos desde el 1/01/85 hasta el 31/12/94. A partir de esa fecha deberán tener al menos 1 dosis de vacuna conjugada frente a meningitis C.

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2005	HB	HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib MC HB	SRP	VPI DTPa Hib	DTPa SRP		dT

2006:

- **Meningitis C:** se modifica la pauta de administración de la vacuna frente a meningitis C, vacunando a los niños a 2, 6 y 18 meses de edad.
- **Varicela:** se vacuna frente a Varicela a los 11 años a los niños sin antecedentes de haber padecido la enfermedad, ni vacunación previa.

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2006	HB	HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib	VPI DTPa Hib MC HB	SRP	VPI DTPa Hib MC	DTPa SRP	Varicela	dT

2008:

- **Hepatitis B:** A los niños nacidos a partir del 1 de marzo de 2008, se vacuna a los 0, 2 y 6 meses de edad, utilizando a los 2 y 6 meses, vacunas Hexavalentes.
- **VPH:** Se vacuna frente a VPH (3 dosis) a las niñas de 14 años, es decir nacidas a lo largo del año 1994 (incluyéndose en los años sucesivos, las cohortes nacidas posteriormente a esa fecha).
- **Meningitis C:** A los niños nacidos a partir del 1 de marzo de 2008, se modifica la pauta de administración frente a meningitis C, vacunando a los niños a los 2, 4 meses de edad (primovacunación) y 15 meses de edad (recuerdo).

	0 m	1 m	2 m	4 m	6 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2008	HB		VPI DTPa Hib HB MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib HB	MC SRP	VPI DTPa Hib	DTPa SRP	Var	Td VPH x 3

2009:

- **Varicela:** A los 11 años, se pasa a pauta de 2 dosis, con intervalo mínimo de 1 mes.

2011:

- **dTpa:** A los 6 años de edad se sustituye la dosis de vacuna frente a DTPa de alta carga antigénica, por la vacuna de dTpa de baja carga antigénica.
- **Triple vírica:** Con motivo de la situación epidemiológica, adelanto temporal de la primera dosis desde los 15 a los 12 meses (se mantiene a los 15 meses para aquellos niños que no recibieron la primera dosis entre los 12 y los 15 meses).

2012:

- **VPH:** A partir de enero se vacuna frente a VPH según las niñas vayan cumpliendo los 14 años a las nacidas en 1998 y sucesivas, no esperando a noviembre para vacunar a todas de forma intensiva.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	6 a	11 a	14 a
2008*	HB	VPI DTPa Hib HB MC	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib HB	SRP	MC SRP**	VPI DTPa Hib	dTpa SRP	Var x 2	Td VPH x 3

* Se considera vigente el calendario de 2008, con las modificaciones e instrucciones de 2009, 2011 y 2012 realizadas mediante Circulares de la Dirección General de Salud Pública.

** A los 15 meses únicamente para aquellos que no recibieron la primera dosis previamente.

2014:

- **Meningitis C:** Nueva pauta: 4 meses, 12 meses y 12 años. Se suspende la dosis de los 2 meses y la de los 15 meses (se mantiene temporalmente a los 15 meses para aquellos niños que no recibieron la dosis a los 12 meses).
- **Triple vírica:** Se adelanta de forma definitiva la primera dosis desde los 15 a los 12 meses. Se adelanta la segunda dosis desde los 6 a los 3 años (se mantiene a los 6 años hasta que las cohortes de niños vacunados a los 3 años alcancen los 6 años).
- **Varicela:** Se retrasa la vacuna desde los 11 a los 12 años; únicamente para los niños sin antecedentes de haber padecido la enfermedad, ni de vacunación previa.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2014	HB	VPI DTPa Hib HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib HB	MC SRP	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa	MC Var x 2	Td VPH *

* VPH: 2 o 3 dosis dependiendo de la vacuna -consultar instrucciones específicas recogidas en la Circular de la DGSP nº 01/14-.

Para más detalle se puede consultar la Tabla Resumen de los Cambios de Calendario y Estrategias Temporales, Aragón 2014 y la Circular DGSP 02/2014.

2015:

Por las dificultades de suministro de vacunas con componente frente a tosferina se sustituye la dosis de vacuna pentavalente de los 4 meses de edad por vacuna hexavalente. Parte de la cohorte de nacidos en 2009 recibe vacuna DTPa a los 6 años. Consultar Circulares DGSP 03/2015 y 05/2015-.

Comienza en diciembre la vacunación frente a **tosferina a las embarazadas en el último trimestre** de gestación. Consultar Circular DGSP 06/2015.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2015	HB	VPI DTPa Hib HB	VPI DTPa Hib HB MC	VPI DTPa Hib HB	MC SRP	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa/ DTPa	MC Var x 2	Td VPH *

2016 (Orden de 15/10/2015):

- **Vacuna antineumocócica conjugada:** Pauta: 2 meses, 4 meses y 12 meses. Para nacidos después del 1 de enero de 2016, comienzo el 01/03/2016. Circular DGSP 01/2016.
- **VPH:** Se adelanta la vacunación desde los 14 años a los 12 años; comienzo el 04/01/2016 para las nacidas en 2004.

Se mantiene la vacunación a los 14 años hasta que las chicas vacunadas a los 12 años alcancen los 14 años de edad. Pauta con dos dosis -tanto a los 12 como los 14 años-. Circular DGSP 07/15.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2016	HB	VPI DTPa Hib HB Nc	VPI DTPa Hib HB Nc MC	VPI DTPa Hib HB	Nc MC SRP	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa/ DTPa	MC VPH x 2 Var x 2	Td

Se mantiene la sustitución de la dosis de vacuna pentavalente de los 4 meses de edad por vacuna hexavalente.

Se retrasa la dosis de vacuna DTPa / dTpa de los 6 años a los niños nacidos en 2010 -y siguientes si fuera necesario- a la espera de disponibilidad de dosis. En 2016 se vacunará a los nacidos en 2009 que no hayan recibido aún la dosis -Circular DGSP 05/2015 y Notas informativas de 10/12/2015 y 02/02/2016-.

En 2016 se administra la vacuna triple vírica a los 6 años a los nacidos en 2010 -última cohorte pendiente de vacunar a esta edad-.

2016 (Orden de 21/03/2016):

- **Vacuna frente a varicela:** Pauta: 15 meses y 3 años. Comienzo el 01/04/2016 para nacidos a partir del 1 de enero de 2015. Circular DGSP 02/2016.

Se mantiene la vacunación a los 12 años, con dos dosis, para aquellas personas que refieran no haber pasado previamente la enfermedad ni haber sido vacunados previamente.

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2016	HB	VPI DTPa Hib HB Nc	VPI DTPa Hib HB Nc MC	VPI DTPa Hib HB	Nc MC SRP	Var	VPI DTPa Hib	SRP Var	dTpa/ DTPa	MC VPH x2 Var x2	Td VPH x2

Se mantiene la sustitución de la dosis de vacuna pentavalente de los 4 meses de edad por vacuna hexavalente por dificultades de suministro.

Se retrasa la dosis de vacuna DTPa o dTpa de los 6 años a los niños nacidos en 2010 -y siguientes si fuera necesario- a la espera de disponibilidad de dosis. En 2016 se vacunará exclusivamente a los nacidos en 2009 que no hayan recibido aún la dosis -Circular DGSP N° 05/2015 y Notas informativas de 10/12/2015 y 02/02/2016-.

En 2016 se administra la vacuna triple vírica a los 6 años a los nacidos en 2010 -última cohorte pendiente de vacunar a esta edad-. Circular DGSP 02/2014

Para más detalle se puede consultar la Tabla Resumen de los Cambios de Calendario y Estrategias Temporales y las Circulares de la DGSP 07/2015 (vacuna VPH), DGSP 01/2016 (vacuna conjugada frente a neumococo) y DGSP 02/2016 (vacuna varicela).

2017 (Orden de 13/12/2016), en vigor desde el 10/01/2017:

- **Vacuna frente a hepatitis B:** Desde el 10/01/2017 se suspende la vacunación universal frente a hepatitis B al nacimiento. Se reserva la vacunación al nacer exclusivamente para hijos de madres portadoras de Ag HBs -junto con inmunoglobulina específica- y de madres sin resultados serológicos en el momento del parto -se realizará analítica de urgencia-.
- **Nueva pauta vacunación 2+1 con vacunas hexavalentes:** Se incorpora la nueva pauta de vacunación "2+1" frente a hepatitis B, DTPa, VPI, *Haemophilus influenzae* b: los niños recibirán únicamente dos dosis como primovacunación -la primera a los 2 meses de edad y la segunda a los 4 meses de edad-.
 - Por tanto, desde el 10/01/2017 se suspende la administración de la 3ª dosis de primovacunación a los 6 meses de edad.
 - Estos niños recibirán un primer recuerdo con vacuna hexavalente a los 11 meses de edad -comenzará en junio de 2017- y por tanto, no recibirán el recuerdo a los 18 meses.
 - Estos mismos niños recibirán un segundo recuerdo, cuando alcancen los 6 años de edad, con vacuna DTPa-VPI -vacuna Tétanos, Difteria, Tosferina acelular de alta carga antigénica y antipoliomielítica inactivada-, previsiblemente en 2022.
 - Los niños que hayan comenzado la pauta "3+1" antes del 10/01/2017 -aquellos que recibieron a los 6 meses una dosis de vacuna hexavalente- recibirán un primer recuerdo con pentavalente a los 18 meses y un segundo recuerdo a los 6 años con vacuna dTpa. Es decir, no se les adelanta el recuerdo a los 11 meses ni cambian el tipo de vacuna que recibirán a los 6 años.
- **Vacuna conjugada frente a neumococo:** A los niños vacunados con la pauta "2+1" la edad de administración del recuerdo de vacuna antineumocócica se adelanta desde los 12 meses a los 11 meses de edad. Los niños vacunados con pauta "3+1" seguirán recibiendo el recuerdo de vacuna conjugada frente a neumococo a los 12 meses de edad.

Tabla resumen. En rojo y en negrita vacunaciones “de transición”

	0 m	2 m	4 m	11 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2017	<i>HB</i>	VPI DTPa Hib HB Nc	VPI DTPa Hib HB Nc MC	VPI DTPa Hib HB Nc	Nc¹ MC SRP	Var	VPI DTPa Hib²	SRP Var	VPI DTPa / dTpa³	MC VPH x2 Var x2	Td VPH x2⁴

1. Se mantiene la dosis de recuerdo con vacuna conjugada frente a neumococo a los 12 meses de edad hasta que los vacunados con la pauta 2+1 -ya con recuerdo administrado a los 11 meses- alcancen esta edad, previsiblemente en julio de 2017. Durante junio de 2017 se vacunará a los 11 y 12 meses de edad.

2. Se mantiene la dosis de recuerdo con vacuna pentavalente a los 18 meses de edad hasta que los vacunados con la pauta 2+1 -con recuerdo a los 11 meses- alcancen esta edad, previsiblemente en enero de 2018.

3. Se recupera la dosis de vacuna dTpa de los 6 años a los niños nacidos en 2011 en abril de 2017 -Circular DGSP 03/2017- y de los nacidos en 2010 en septiembre niños nacidos en 2011 en abril de 2017 -Circular DGSP 08/2017-. Sin vigor la Circular DGSP 05/2015 y Notas informativas de 10/12/2015 y 02/02/2016.

4. Se mantiene la vacunación frente a VPH a los 14 años, durante 2017 para las nacidas en 2003; en 2018 se suspende a los 14 años, dado que las chicas vacunadas a los 12 años alcanzarán los 14 años de edad -nacidas en 2004 y siguientes cohortes-. Pauta con dos dosis -tanto a los 12 como los 14 años-. Circular DGSP 07/2015.

Neumococo, únicamente para nacidos en 2016 y siguientes cohortes. Los niños con factores de riesgo recibirán una dosis adicional a los 6 meses de edad. Circular DGSP 01/2016.

Varicela, segunda dosis a los 3 años para nacidos en 2015 y siguientes cohortes -esta vacunación comenzará en 2018-. Circular DGSP 02/2016.

Varicela a los 12 años, dos dosis, exclusivamente para aquellos que no hayan pasado la enfermedad ni estén previamente vacunados.

En 2017 se suspende administración la segunda dosis de vacuna **triple vírica** a los 6 años, dado que los vacunados a los 3 años alcanzarán esta edad -nacidos en 2011 y siguientes cohortes-. Circular DGSP 02/2014.

Se mantiene la vacunación frente a **tosferina** (vacunas dTpa) a las **embarazadas en el último trimestre** de gestación. Circular DGSP 06/2015.

Para más detalle se puede consultar la **Tabla Resumen de los Cambios de Calendario y Estrategias Temporales y la Circular DGSP 04/2016** (Implantación Nuevo Calendario Vacunación 2017).

Sobre la **profilaxis perinatal frente a la hepatitis B** se puede consultar la **Circular DGSP 03/2016** y la tabla resumen.

2019 (Orden SAN/662/2019, de 4 de junio), en vigor desde el 20/06/2019:

	0 m	2 m	4 m	11 m	12 m	15 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2019	<i>HB</i> ¹	VPI DTPa Hib HB Nc	VPI DTPa Hib HB Nc ² MC	VPI DTPa Hib HB Nc	MC SRP	Var	SRP Var ³	VPI DTPa / dTpa ⁴	MenACWY ⁵ Var x 2 ⁶ VPH x 2 ⁷	Td

1. **HB** al nacer exclusivamente para hijos de madres portadoras de AgHBs -junto con inmunoglobulina específica- y de madres sin resultados serológicos en el momento del parto -se realizará analítica de urgencia-.

2. **Neumococo**, dosis adicional a los 6 meses en aquellos niños con factor de riesgo.

3. **Varicela**, únicamente para los nacidos en 2015 y siguientes cohortes; para 2ª dosis, a los 3 años de edad, administrar vacuna **tetravérica**.

4. Los vacunados con pauta 3 + 1 recibirán **dTpa** -baja carga antigénica-. Se administrará **DTPa-VPI** -vacuna de alta carga antigénica y polio- a los vacunados con pauta 2 + 1 cuando alcancen los 6 años (en 2022).

5. Vacunación conjugada frente a **meningococo ACWY** en función de las instrucciones específicas de la D.G. de Salud Pública. 1 dosis para aquellos que no hayan recibido esta vacuna por encima de los 10 años de edad.

6. Únicamente para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas previamente. Pauta 2 dosis, separadas entre sí al menos 1 mes, idealmente al menos, 2 meses.

7. Únicamente para las chicas. Pauta de 2 dosis, separadas entre sí 6 meses.

Para más información consultar la [Circular DGSP 03/2019](#) (Implantación Nuevo Calendario Vacunación en todas las edades de la vida y en grupos de riesgo 2019).

Planificación de la vacunación frente a meningococo ACWY

Meningococo ACWY: fechas de comienzo en función de las instrucciones específicas emitidas por la Dirección General de Salud Pública, en base a la disponibilidad de vacunas y los procedimientos de contratación.

Pauta: 1 dosis de MenACWY si no han recibido antes 1 dosis de esta vacuna por encima de los 10 años de edad.

Sustitución de la vacunación frente a meningococo C por ACWY a los 12 años de edad:

- Desde julio de 2019 se sustituye la vacuna MenC por MenACWY según cumplan los 12 años de edad, para los nacidos a partir de julio de 2007. Y así, los nacidos en 2008 se vacunarán en 2020 al ir cumpliendo los 12 años y sucesivamente.

- Los nacidos entre enero y junio de 2007 -que ya recibieron la dosis de MenC a los 12 años- se vacunan en diciembre de 2019. [Circular DGSP 07/2019](#)

Vacunación de rescate frente a meningococo ACWY (cohortes de nacidos entre 2000 y 2006):

- Desde julio de 2019 se administra una dosis de MenACWY según cumplan los 14 años de edad, junto con la vacuna Td, para los nacidos entre julio y diciembre de 2005.
- Los nacidos entre enero y junio de 2005 -ya recibieron la Td a los 14 años- se vacunan en enero de 2020 [Circular DGSP 07/2019](#).
- Los nacidos en 2000 y 2001 se vacunan en septiembre y octubre de 2019, [Circular DGSP 04/2019](#).
- A lo largo de 2020 se vacunarán los nacidos en 2008 (al ir cumpliendo los 12 años de edad) y en 2006 (al ir cumpliendo los 14 años de edad, junto con la vacuna Td).
- Los nacidos en 2002, 2003 y 2004 se vacunan en campañas escalonadas en 2020, [Circular DGSP 01/2020](#), de acuerdo a las siguientes fechas:

Fecha de nacimiento	Fecha de vacunación *	Edad	Observaciones	Envío carta
2002 *	Marzo y abril 2020	17-18	Campaña	Sí
2003 *	Mayo y junio 2020	16-17	Campaña	Sí
2004 *	Julio y agosto 2020	15-16	Campaña	Sí

* En CCSS urbanos de Zaragoza, por logística, se vacunará media cohorte cada mes.

En caso de pertenecer a un grupo de riesgo la vacunación se considerará prioritaria y no será necesario esperar a la vacunación de rescate de su cohorte de nacimiento, en algunos grupos se puede precisar otras pautas.

Se enviarán cartas informativas a la población implicada.

Acrónimos empleados

- HB:** Hepatitis B;
- VPI:** Vacuna Polio Inactivada;
- Hib:** *Haemophilus influenzae* tipo b
- DTPa:** Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular de alta carga antigénica;
- dTpa:** Difteria, Tétanos, Pertussis acelular de carga reducida;
- Td:** Tétanos, Difteria tipo adulto;
- MC / MenC:** Meningococo C;
- MenACWY:** Meningococo ACWY;
- Nc:** Neumococo conjugada;
- SRP:** Sarampión, Rubeola, Parotiditis;
- Var:** Varicela;
- VPH:** Virus del Papiloma Humano.

Para más información: www.aragon.es/vacunas