

Situación	Año nacimiento	Edad administración	Vacunaciones correspondientes según calendario sistemático	
Terminada	1955 o antes	65 o más	Gripe en campaña	
	1955	65 años	Neumococo polisacárida 23 / Revisar Td / Gripe en campaña	
	1954-1999	21-64 años	Revisar estado vacunación según calendario edad adulta	
	2000	20 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY	
	2001	19 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY	
	2002	17-18 años	Campaña rescate MenACWY prevista en marzo y abril	
	2003	16-17 años	Campaña rescate MenACWY prevista en mayo y junio	
	Suspendido temporal.	2004	15-16 años	Campaña rescate MenACWY prevista en julio y agosto
		2005	15 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY
		2006	14 años	Td / Rescate Meningococo ACWY al cumplir los 14 años
		2007	13 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY
		2008	12 años	MenACWY / VPH, 2 dosis, solo chicas / Varicela, 2 dosis
		2014	6 años	dTpa
		2017	3 años	SRP / Varicela (usar vacuna tetravérica)
Se mantiene	2019	15 meses	Varicela	
Se mantiene		12 meses	SRP / Meningococo C	
Se mantiene		11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo	
Se mantiene	2020	11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo	
Se mantiene / prioritario		4 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo / Meningococo C	
Se mantiene / prioritario		2 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo	
Se mantiene / prioritario		0 meses	Vacunación al nacer frente a Hepatitis B Solo a hijos de madres portadoras -junto con inmunoglobulina- y de madres sin control serológico previo al parto -serología de urgencia-	
Se mantiene / prioritario	Embarazadas	dTpa en cada embarazo a partir de la 27 semana, preferentemente en semana 27 o 28		
Terminada		Gripe en campaña		
Se mantiene / prioritario		Profixalis Tétanos	Según protocolo	
Se mantiene / prioritario		Profixalis Rabia	Bajo indicación de salud pública	
Suspendido temporal., salvo excepciones		Grupos de Riesgo	Muy alto riesgo, p.e. tratamiento con eculizumab y trasplantados. Valoración individual riesgo beneficio de acudir al centro. O vacunación oportunista en visita inevitable, p.e. diálisis.	