

## RESUMEN VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO (NIÑOS Y ADOLESCENTES HASTA 17 AÑOS)\*

Orden SAN/662/2019, de 4 de junio

[www.aragon.es/vacunas](http://www.aragon.es/vacunas)

GRUPO DE RIESGO / VACUNACIÓN	Hib	Triple vírica	Varicela	Hepatitis B	Hepatitis A	VPH	Enfermedad meningocócica	Enfermedad neumocócica	Gripe
Inmunodepresión (excepto VIH)		Contraindicada	Contraindicada						
Infección VIH	CD4 <200			HB <sup>2</sup>	HA	VPH <sup>5</sup>	MenACWY	VNC13 + VNP23 <sup>6</sup>	Anual
	CD4 ≥200	Hib					MenACWY, MenB		
Asplenia, déficit complemento, eculizumab									
Enf. renal crónica, hemodiálisis				HB <sup>3</sup>					
Fístula LCR, implante coclear									
Sínd. Down				HB					
Enf. cardiovasculares y respiratorias crónicas <sup>a</sup>									
Enf. hepática crónica <sup>b</sup>				HB	HA				
Diabetes mellitus									
Enf. celiaca									
Enf. neurológicas y neuromusculares									
Hemofilia, trastornos crónicos coagulación <sup>c</sup>				HB					
Hemoglobinopatías y anemias <sup>d</sup>									
Obesidad mórbida									
Antecedente enf. meningocócica invasiva							MenACWY, MenB		
Antecedente enf. neumocócica invasiva <sup>e</sup>								VNC13 + VNP23 <sup>6</sup>	
Enf. cutánea diseminada grave									
Tto crónico con salicilatos o anticoagulantes									Anual

\* Ver tabla 6 para TOS, tabla 8 para TPH y tabla 11 para cáncer. Ver documento para más información.

**a)** No incluye hipertensión arterial aislada. En asma no complicada solo gripe (VNP23 si tratamiento con corticoides orales). **b)** Incluye infección crónica por Hepatitis B o C. **c)** Incluye trastornos que requieran recepción periódica de transfusiones o hemoderivados. **d)** Si necesitan otros tratamientos -transfusiones periódicas, esplenectomía, corticoides...- revisar recomendaciones específicas. **e)** No incluye la neumonía no bacteriémica.

<sup>1</sup> De acuerdo calendario oficial: personas no vacunadas con anterioridad. Pauta 2 dosis.

<sup>2</sup> En caso de no respondedor a primera pauta de vacunación, se administrará vacuna tipo adulto (pauta 0,1,6 meses).

<sup>3</sup> En diálisis y no vacunados, vacuna tipo adulto, si >15 años, vacuna alta carga o adyuvada. Revisión serológica 1-2 meses tras completar pauta y revacunación si fuera necesario.

<sup>4</sup> De acuerdo calendario sistemático: > 12 años si no ha pasado enfermedad ni vacunado previamente o nacidos después 1/01/2015. **O si fibrosis quística y >12 meses.** Pauta 2 dosis.

<sup>5</sup> Tanto varones como mujeres. 3 dosis.

<sup>6</sup> VNP23 está indicada a partir de los 2 años de edad.

<sup>7</sup> Si fibrosis quística o cirrosis hepática: VNC13 + VNP23.

Vacunación contraindicada	Vacunación no recomendada	Vacunación recomendada	Vacunación según calendario sistemático
------------------------------	------------------------------	---------------------------	--

## RESUMEN VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO (POBLACIÓN EDAD ADULTA)\*

Orden SAN/662/2019, de 4 de junio

[www.aragon.es/vacunas](http://www.aragon.es/vacunas)

GRUPO DE RIESGO / VACUNACIÓN	Hib	Triple vírica	Varicela	Herpes zóster	Hepatitis B	Hepatitis A	VPH	Enf. meningoc.	Enf. neumocóc.	Gripe	
Immunodepresión (excepto VIH)		Contraindicada	Contraindicada						VNC13 + VNP23	Anual	
Infección VIH		TV si susceptible	VVZ si susceptible	HZ/su <sup>2</sup>	HB <sup>1</sup>	HA	VPH <sup>3</sup>	MenACWY			
	CD4 <200										MenACWY, MenB
	CD4 ≥200						HB <sup>1</sup>				
Asplenia, déficit complemento, eculizumab	Hib										
Enf. renal crónica, hemodiálisis							HB <sup>1</sup>				
Fístula LCR, implante coclear											
Sínd. Down							HB				
Enf. cardiovascular y respiratorias crónicas <sup>a</sup>											VNP23 <sup>4</sup>
Enf. hepática crónica <sup>b</sup> , alcoholismo							HB	HA			
Diabetes mellitus											
Enf. celiaca											
Enf. neurológicas y neuromusculares											
Hemofilia, trastornos crónicos coagulación <sup>c</sup>							HB				
Hemoglobinopatías y anemias <sup>d</sup>											
Obesidad mórbida											
Tabaquismo											
Lesión intraepitelial cérvix de alto riesgo							VPH				
Antecedente enf. meningocócica invasiva								MenACWY, MenB			
Antecedente enf. neumocócica invasiva <sup>e</sup>								VNC13 + VNP23			
Enf. cutánea diseminada grave											
Tto crónico con salicilatos o anticoagulantes									Anual		

\* Ver tabla 7 para TOS, tabla 8 para TPH y tabla 12 para cáncer. Ver documento para más información.

**a)** No incluye hipertensión arterial aislada. En asma no complicada solo gripe (VNP23 si tratamiento con corticoides orales). **b)** Incluye infección crónica por Hepatitis B o C. **c)** Incluye trastornos que requieran recepción periódica de transfusiones o hemoderivados. **d)** Si necesitan otros tratamientos -transfusiones periódicas, esplenectomía, corticoides...- revisar recomendaciones específicas. **e)** No incluye la neumonía no bacteriémica.

<sup>1</sup> En diálisis y no vacunados previamente, de alta carga antigénica o adyuvada. Revisión serológica 1-2 meses tras administrar la pauta completa y revacunación si fuera necesario.

<sup>2</sup> Cuando la vacuna de subunidades (HZ/su) esté disponible. Se determinará la pauta y momento idóneo de vacunación.

<sup>3</sup> Hombres y mujeres hasta 26 años, incluidos.

<sup>4</sup> Si cirrosis hepática, alcoholismo crónico o fibrosis quística: VNC13 + VNP23.

<b>Vacunación contraindicada</b>	Vacunación no recomendada	Vacunación recomendada	Vacunación según calendario sistemático
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--