

**Priorización y situación de las vacunaciones**
[Ver Circular DGSP/03/2020 Normalización vacunaciones COVID-19](#) 01/06/2020

| Situación                        | Año nacimiento     | Edad administración                                  | Vacunaciones correspondientes según calendario sistemático   |
|----------------------------------|--------------------|--|--|
| <i>En otoño</i>                  | 1954 o antes       | 65 o más   | Gripe en campaña   |
| <i>Se reanuda</i>                | 1955               | 65 años  | <b>Neumococo polisacárida 23 (1<sup>er</sup> trimestre julio, 2<sup>o</sup> tr. agosto, 3<sup>er</sup> tr. septiembre, 4<sup>o</sup> tr. octubre) / Revisar Td / Gripe en otoño, campaña</b> |
|                                  | 1956-1999          | 20-64 años   | Revisar estado vacunación según calendario edad adulta   |
|                                  | 2000-2001          | 18-20 años   | Comprobar si recibieron dosis MenACWY  |
|                                  | 2002               | 17-18 años   | Campaña rescate MenACWY en <b>julio</b>  |
|                                  | 2003               | 16-17 años   | Campaña rescate MenACWY en <b>agosto</b>   |
|                                  | 2004               | 15-16 años   | Campaña rescate MenACWY en <b>septiembre</b>   |
|                                  | 2005               | 15 años  | Comprobar si recibieron dosis MenACWY  |
|                                  | 2006               | <b>14 años *</b>                                     | Td / Rescate Meningococo ACWY <b>al cumplir los 14 años</b>  |
|                                  | 2007               | 13 años  | Comprobar si recibieron dosis MenACWY  |
|                                  | 2008               | <b>12 años *</b>                                     | MenACWY / VPH, 2 dosis, solo chicas / Varicela, 2 dosis  |
|                                  | 2014               | <b>6 años *</b>                                      | dTpa   |
|                                  | 2017               | <b>3 años *</b>                                      | SRP / Varicela (usar vacuna tetravírica)   |
| Se mantiene                      | 2019               | 15 meses   | Varicela   |
| Se mantiene                      |                    | 12 meses   | SRP / Meningococo C  |
| Se mantiene                      |                    | 11 meses   | Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo  |
| Se mantiene                      | 2020               | 11 meses   | Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo  |
| Se mantiene / <b>prioritario</b> |                    | 4 meses  | <b>Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo / Meningococo C</b>   |
| Se mantiene / <b>prioritario</b> |                    | 2 meses  | <b>Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo</b>   |
| Se mantiene / <b>prioritario</b> |                    | 0 meses  | <b>Vacunación al nacer frente a Hepatitis B</b><br>Solo a hijos de madres portadoras -junto con inmunoglobulina- y de madres sin control serológico previo al parto -serología de urgencia-  |
| Se mantiene / <b>prioritario</b> | <b>Embarazadas</b> |  | dTpa en cada embarazo a partir de la 27 <sup>a</sup> semana, preferentemente en semana 27 o 28   |
| <i>En otoño</i>                  |                    |  | Gripe en campaña   |
| Se mantiene / <b>prioritario</b> |                    | <b>Profilaxis Tétanos</b><br><b>Profilaxis Rabia</b> | Según protocolo<br>Bajo indicación de salud pública  |
| <i>Se reanuda</i>                |                    | Grupos de Riesgo                                     | <b>Prioritario: Muy alto riesgo, p.e. tratamiento con eculizumab y trasplantados.</b><br>Según documento GGRR.<br><b>Plan especial en institucionalizados en verano, pendiente Circular.</b> |

\* Junio campaña de repesca, dosis "perdidas" de vacunaciones prioritarias y de los 3, 6, 12 y 14 años (no administradas en marzo-mayo)