

VACUNAS A ADMINISTRAR EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y AÑO DE NACIMIENTO ARAGÓN 2020

Orden de la Consejera de Sanidad, [SAN/662/2019](#), de 4 de junio - [Circular DGSP 03/2019](#)

Año nacimiento	Edad administración	Vacunaciones correspondientes según calendario sistemático
1955 o antes	65 o más	Gripe en campaña / Revisar estado según calendario edad adulta
1955	65 años	Neumococo polisacárida 23 / Revisar Td / Gripe en campaña
1954-1999	21-64 años	Revisar estado vacunación según calendario edad adulta
2000	20 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY ¹
2001	19 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY ¹
2002	17-18 años	<i>Campaña rescate MenACWY prevista en marzo y abril ¹</i>
2003	16-17 años	<i>Campaña rescate MenACWY prevista en mayo y junio ¹</i>
2004	15-16 años	<i>Campaña rescate MenACWY prevista en julio y agosto ¹</i>
2005	15 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY ¹
2006	14 años	Td / Rescate Meningococo ACWY al cumplir los 14 años ¹
2007	13 años	Comprobar si recibieron dosis MenACWY ¹
2008	12 años	MenACWY ¹ / VPH, 2 dosis, solo chicas / Varicela, 2 dosis ²
2009	11 años	
2010	10 años	
2011	9 años	
2012	8 años	
2013	7 años	
2014	6 años	dTpa
2015	5 años	
2016	4 años	
2017	3 años	SRP / Varicela (usar vacuna tetravérica) ³
2018	2 años	
2019	15 meses	Varicela ³
	12 meses	SRP / Meningococo C
	11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	6 meses	Neumococo -solo si Grupo de Riesgo- ⁴
2020	11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	6 meses	Neumococo -solo si Factor de Riesgo- ⁴
	4 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo / Meningococo C
	2 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	0 meses	<i>Vacunación al nacer frente a Hepatitis B ⁵</i> Solo a hijos de madres portadoras -junto con inmunoglobulina- y de madres sin control serológico previo al parto -serología de urgencia- ⁵
Embarazadas	Gripe en campaña / dTpa en cada embarazo a partir de la 27 semana, preferentemente en semana 27 o 28 de gestación ⁶	

1. **Meningococo ACWY:** fechas de comienzo en función de las instrucciones específicas emitidas por la Dirección General de Salud Pública, en base a la disponibilidad de vacunas y los procedimientos de contratación.

1 dosis MenACWY si no han recibido antes 1 dosis de esta vacuna por encima de los 10 años de edad.

Sustitución de la vacunación frente a meningococo C por ACWY a los 12 años de edad:

Desde julio de 2019 se sustituye la vacuna MenC por MenACWY, según cumplan los 12 años de edad.

Vacunación de rescate frente a meningococo ACWY (cohortes de nacidos entre 2000 y 2006):

Nacidos en 2000, 2001, 2005 y 2007 ya se les ofertó la vacunación en 2019.

A lo largo de 2020 se vacunarán los nacidos en 2008 (al ir cumpliendo los 12 años de edad) y los nacidos en 2006 (al ir cumpliendo los 14 años de edad, junto con la vacuna Td).

Los nacidos en 2002, 2003 y 2004 se vacunarán en 2020 en campañas escalonadas, [Circular DGSP 01/2020](#), de acuerdo a las siguientes fechas:

Fecha de nacimiento	Fecha de vacunación *	Edad	Observaciones	Envío carta
2002 *	Marzo y abril 2020	17-18	Campaña	Sí
2003 *	Mayo y junio 2020	16-17	Campaña	Sí
2004 *	Julio y agosto 2020	15-16	Campaña	Sí

* En CCSS urbanos de Zaragoza, por logística, se vacunará media cohorte cada mes.

En caso de pertenecer a un grupo de riesgo la vacunación se considerará prioritaria y no será necesario esperar a la vacunación de rescate de su cohorte de nacimiento, en algunos grupos se puede precisar otras pautas.

La Dirección General confirmará las fechas efectivas de vacunación MenACWY, que se anunciarán. Se enviarán cartas informativas a la población implicada en las campañas de rescate.

2. **Varicela, 12 años:** solo aquellos sin antecedentes de enfermedad ni vacunación previa.

2 dosis, separadas entre sí, al menos un mes, e idealmente al menos 2 meses;

si ya han recibido una dosis, administrar solo la segunda.

3. **Varicela, primera infancia (nacidos en 2015 y posteriormente):**

15 meses, 1ª dosis, vacuna frente a varicela monocomponente.

3 años, 2ª dosis, **vacuna tetravírica** (sarampión, rubeola, parotiditis y varicela). [Circular DGSP 03/2018](#).

4. **Neumococo.** Dosis adicional a los 6 meses para aquellos grupos de riesgo incluidos en el protocolo.

5. **Profilaxis perinatal hepatitis B.** [Circular DGSP 03/2016](#).

6. **Vacuna dTpa en embarazadas.** [Circular DGSP 06/2015](#).

HB: Hepatitis B; **VPI:** Vacuna Polio Inactivada; **Hib:** *Haemophilus influenzae* tipo b;

DTPa: Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular, de alta carga antigénica;

dTpa: Difteria, Tétanos, Pertussis acelular, de carga reducida; **Td:** Tétanos, Difteria tipo adulto;

SRP: Sarampión, Rubeola, Parotiditis -triple vírica-; **VPI:** Vacuna Poliomieltitis Inactivada;

VPH: Virus del Papiloma Humano;

MenC: Meningococo C; **MenACWY:** Meningococo ACWY.

Se debe aprovechar cualquier consulta para revisar el estado vacunal previo y actualizar si fuera necesario en base a los protocolos establecidos por la Dirección General de Salud Pública.

Es importante **no demorar la fecha de administración de las dosis de los 2 y 4 meses de edad** para reducir el riesgo de tosferina en lactantes.