

VACUNAS A ADMINISTRAR EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y AÑO DE NACIMIENTO

ARAGÓN 2019

Orden de la Consejera de Sanidad, [SAN/662/2019](#), de 4 de junio - [Circular DGSP 03/2019](#)

Año nacimiento	Edad administración	Vacunaciones correspondientes según calendario sistemático
1953 o antes	65 o más	Gripe en campaña / Revisar estado según calendario edad adulta
1954	65 años	Neumococo 23 / Revisar Td / Gripe en campaña
1955-1999	19-64 años	Revisar estado vacunación según calendario edad adulta
2000	18-19 años	<i>MenACWY según instrucciones rescate</i> ¹
2001	17-18 años	<i>MenACWY según instrucciones rescate</i> ¹
2002	17 años	Rescate MenACWY previsto en 2020
2003	16 años	Rescate MenACWY previsto en 2020
2004	15 años	Rescate MenACWY previsto en 2020
2005	14 años	<i>MenACWY según instrucciones rescate para los que ya cumplieron 14 años, nacidos enero-junio, ya vacunados con Td</i> ¹
		Td / Meningococo ACWY ¹ Nacidos julio-diciembre, al cumplir los 14 años
2006	13 años	Rescate MenACWY previsto en 2020
2007	12 años	<i>MenACWY según instrucciones rescate para los que ya cumplieron 12 años, nacidos enero-junio, ya vacunados con MenC</i> ¹
		MenACWY ¹ / VPH, 2 dosis, solo chicas / Varicela, 2 dosis ² Nacidos julio-diciembre, al cumplir los 12 años
2008	11 años	
2009	10 años	
2010	9 años	
2011	8 años	
2012	7 años	
2013	6 años	dTpa
2014	5 años	
2015	4 años	
2016	3 años	SRP / Varicela (usar vacuna tetravírica) ³
2017	2 años	
2018	15 meses	Varicela ³
	12 meses	SRP / Meningococo C
	11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	6 meses	Neumococo -solo si Grupo de Riesgo- ⁴
2019	11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	6 meses	Neumococo -solo si Factor de Riesgo- ⁴
	4 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo / Meningococo C
	2 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	0 meses	<i>Vacunación al nacer frente a Hepatitis B</i> ⁵ Solo a hijos de madres portadoras -junto con inmunoglobulina- y de madres sin control serológico previo al parto -serología de urgencia- ⁵
Embarazadas	dTpa en cada embarazo entre semana 28 y 32 de gestación ⁶ / Gripe en campaña	

1. **Meningococo ACWY:** fechas de comienzo en función de las instrucciones específicas emitidas por la Dirección General de Salud Pública, en base a la disponibilidad de vacunas y los procedimientos de contratación.

1 dosis MenACWY si no han recibido antes 1 dosis de esta vacuna por encima de los 10 años de edad.

Sustitución de la vacunación frente a meningococo C por ACWY a los 12 años de edad:

Desde julio de 2019, a medida que cada centro disponga de dosis de vacuna, se sustituirá la vacuna MenC por MenACWY según cumplan los 12 años de edad, para los nacidos a partir de julio de 2007.

Los nacidos entre enero y junio de 2007 -que ya recibieron la dosis de MenC a los 12 años- se vacunarán previsiblemente a finales de 2019 y principios de 2020.

Vacunación de rescate frente a meningococo ACWY (cohortes de nacidos entre 2000 y 2006):

Desde julio de 2019, a medida que cada centro disponga de vacuna, se administrará una dosis de MenACWY según cumplan los 14 años de edad, junto con la vacuna Td, para los nacidos a partir de julio de 2005.

Los nacidos entre enero y junio de 2005 -que ya recibieron la dosis de Td a los 14 años- se vacunarán previsiblemente a finales de 2019 y principios de 2020.

La previsión inicial es que los nacidos en 2000 y 2001 se vacunen en el segundo semestre de 2019 y que a lo largo de 2020 se vacunen los nacidos en 2008 (al ir cumpliendo los 12 años de edad), al igual que los nacidos en 2006 (al ir cumpliendo los 14 años de edad) junto con la vacuna Td.

Los nacidos en 2002, 2003 y 2004 se vacunarían también en 2020.

En caso de pertenecer a un grupo de riesgo la vacunación se considerará prioritaria y no será necesario esperar a la vacunación de rescate de su cohorte de nacimiento, en algunos grupos se puede precisar otras pautas.

La Dirección General confirmará las fechas efectivas de vacunación MenACWY, que se anunciarán. Se enviarán cartas informativas a la población implicada.

2. **Varicela, 12 años:** solo aquellos sin antecedentes de enfermedad ni vacunación previa.

2 dosis, separadas entre sí, al menos un mes, e idealmente al menos 2 meses; si ya han recibido una dosis, administrar solo la segunda.

3. **Varicela, primera infancia:**

15 meses, primera dosis, vacuna frente a varicela monocomponente.

3 años de edad (nacidos en 2015 y posteriormente), segunda dosis, **vacuna tetravírica** (sarampión, rubeola, parotiditis y varicela). [Circular DGSP 03/2018](#).

4. **Neumococo.** Dosis adicional a los 6 meses para aquellos grupos de riesgo incluidos en el protocolo.

5. **Profilaxis perinatal hepatitis B.** [Circular DGSP 03/2016](#).

6. **Vacuna dTpa en embarazadas.** [Circular DGSP 06/2015](#).

HB: Hepatitis B; **VPI:** Vacuna Polio Inactivada; **Hib:** *Haemophilus influenzae* tipo b;

DTPa: Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular, de alta carga antigénica;

dTpa: Difteria, Tétanos, Pertussis acelular, de carga reducida; **Td:** Tétanos, Difteria tipo adulto;

SRP: Sarampión, Rubeola, Parotiditis -triple vírica-; **VPH:** Virus del Papiloma Humano;

MenC: Meningococo C; **MenACWY:** Meningococo ACWY.

Se debe aprovechar cualquier consulta para revisar el estado vacunal previo y actualizar si fuera necesario en base a los protocolos establecidos por la Dirección General de Salud Pública.

Es importante **no demorar la fecha de administración de las dosis de los 2 y 4 meses de edad** para reducir el riesgo de tosferina en lactantes.