

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOA nº. 222, de 9 de noviembre de 2020)

CATEGORÍA:

ODONTOESTOMATÓLOGO

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 2 horas.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN” LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

**TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS. SU INCUMPLIMIENTO PODRÁ
SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- Según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos... (señale la respuesta INCORRECTA):

- A) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación
- B) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente
- C) Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos
- D) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención

2 - Respecto al sistema de clasificación CIAP-2 (Clasificación Internacional de Atención Primaria) señale la opción CORRECTA:

- A) Es un sistema de clasificación sistemática de los juicios clínicos organizados en siete campos y 30 clases.
- B) Utiliza el formato de codificaciones RAE- CMBD
- C) En su formato de códigos, el primer carácter es una letra que representa un aparato o sistema orgánico.
- D) Esta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud.

3.- Según la "ORDEN de 11 de julio de 2007, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula el procedimiento para la actualización de la cartera de Servicios Sanitarios del Sistema de Salud de Aragón.", en la evaluación de las propuestas de incorporación de nuevos servicios a la cartera, cuál de las siguientes NO pertenece a los criterios de congruencia:

- A) Pertinencia
- B) Coherencia
- C) Equidad
- D) Impacto en la organización y gestión de servicios

4.- En relación con el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución Española:

- A) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determinen los estatutos de autonomía o en su defecto los reglamentos.
- B) Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
- C) Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo colectivamente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
- D) Todos los españoles tendrán el derecho de solicitud telemática y por escrito, en la forma y con los efectos que determinen los reglamentos sobre la materia.

5 - Todos los siguientes son objetivos del proyecto Guía-Salud, EXCEPTO:

- A) Difundir Guía Salud en el SNS y otros ámbitos nacionales e internacionales.
- B) Promover el desarrollo, elaboración, adaptación, actualización de Guías de Práctica Clínica y de otros productos basados en la evidencia científica siguiendo una metodología común.
- C) Analizar la evidencia sobre la efectividad de las estrategias de promoción de la salud.
- D) Promover la formación para la elaboración, implementación y evaluación del impacto de las Guías de Práctica Clínica y de otros productos basados en la evidencia científica.

6.- Tradicionalmente, para evaluar la calidad de los servicios prestados se ha optado por realizar análisis en tres niveles diferentes EXCEPTO:

- A) Análisis de la estructura.
- B) Análisis de los procesos.
- C) Análisis de los resultados.
- D) Análisis de los costes.

7.- Según la Declaración de Alma Ata de 1978, la Atención Primaria de Salud:

- A) Es una etapa de asistencia centrada en el paciente en la que se da respuesta a sus necesidades básicas. Está orientada en base a criterios de eficacia y solidaridad. Ha de ser integral y accesible y basa su desarrollo en la optimización de los recursos.
- B) Es la asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, constituyendo el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.
- C) Es el nivel asistencial en el que se atienden los problemas de salud de menor entidad.
- D) Está compuesta por Centros de Salud, Consultorios Locales y Ambulatorios.

8.- Cuál de los siguientes órganos administrativos NO pertenece a la estructura de la Dirección General de Salud Pública:

- A) Servicio de Estrategias de Salud y Formación.
- B) Servicio de Salud en Todas las Políticas.
- C) Laboratorio de Salud Pública.
- D) Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental.

9- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas será de aplicación a:

- A) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
- B) Todo el personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho privado, fundaciones y consorcios.
- C) Todo el personal que perciba sus retribuciones mediante arancel.
- D) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas o privadas.

10.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, son derechos de los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud:

- A) A disponer de una tercera opinión facultativa sobre su proceso.
- B) A recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de residencia en un tiempo mínimo.
- C) A recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idéntica garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma.
- D) A recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idéntica garantías que hubiese recibido en su comunidad autónoma de origen.

11. - Respecto al Comité de Bioética de Aragón, señale la opción INCORRECTA:

- A) El Comité de Bioética de Aragón actúa en Pleno y en Comisión Permanente.
- B) Una de sus funciones es elaborar informes cuando medien quejas por escrito, denuncias o reclamaciones judiciales o administrativas.
- C) El Comité de Bioética de Aragón está integrado por 18 miembros.
- D) Dos vocales serán designados a propuesta de la Universidad.

12.- De acuerdo con el capítulo II del título II de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, son derechos de las personas en relación a la protección de datos (INDIQUE LA INCORRECTA):

- A) Derecho de enmienda
- B) Derecho de supresión
- C) Derecho de limitación del tratamiento
- D) Derecho de portabilidad

13.- Todas ellas son características del desarrollo de la gestión clínica EXCEPTO:

- A) Implica confiar en la organización que los profesionales, de forma autónoma y voluntaria, propongan para organizarse.
- B) Significa el reconocer que organizaciones homogéneas y rígidas responden mejor a las aspiraciones de profesionales altamente cualificados.
- C) Repercute en unos mejores resultados.
- D) Tiene una mayor aceptabilidad por parte de los usuarios.

14.- A la Comunidad Autónoma de Aragón le corresponde un territorio de:

- A) 61.850 Km² que representa aproximadamente el 18 % del total de la superficie estatal.
- B) 17.389 Km², que representa aproximadamente el 31 % del total de la superficie estatal.
- C) 39.775 Km² que representa aproximadamente el 7 % del total de la superficie estatal.
- D) 47.720 Km², que representa aproximadamente el 9 % del total de la superficie estatal.

15.- El Plan Integral de Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón se regirá por los siguientes Principios Generales, indique el principio INCORRECTO:

- A) Normalización
- B) Responsabilidad social y corresponsabilidad Pública
- C) Interculturalidad
- D) Integralidad

16.- Señale la respuesta FALSA en relación a la pulpitis irreversible asintomática:

- A) Los productos de la zona exudativa drenan hacia la lesión cariosa
- B) Los productos de la zona exudativa son absorbidos por la circulación venosa y linfática
- C) Los productos de la zona exudativa no se diseminan a una zona de tejido adyacente
- D) Puede presentar la conversión de la pulpitis irreversible sintomática a un estado latente

17.- En la respuesta defensiva pulpar ante la agresión por caries, es CIERTO que:

- A) La dentina terciaria reparativa la producen los odontoblastos.
- B) La dentina terciaria reactiva la secretan los dentinoblastos.
- C) Si la condiciones de la pulpa son favorables las células mesenquimales de la misma se diferencian a dentinoblastos.
- D) Los pulpoblastos elaboran una matriz tubular de fibrodentina.

18.- ¿Cuál es el tumor más frecuente en la cavidad oral?

- A) Fibroma
- B) Granuloma piógeno
- C) Queratoacantoma
- D) Lipoma

19. Respecto al virus del papiloma humano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) Actualmente se han descrito más de 100 tipos de VPH
- B) Pertenecen al grupo de virus ARN
- C) Algunos están relacionados con los carcinomas de cuello uterino
- D) Pertenecen al grupo de virus ADN bicatenarios sin cubierta

20.- Cuál de las siguientes NO es una función de la saliva

- A) Digestivas.
- B) Favorece la integridad de las mucosas.
- C) Acción inmunitaria.
- D) Las proteínas y glucoproteínas salivares favorecen la desintegración bacteriana de la película adherida.

21.- En la neuralgia idiopática o esencial del trigémino, es FALSO:

- A) Afecta más a la 1ª y 2ª rama.
- B) Es de afectación preponderantemente unilateral.
- C) Puede haber cuadros atípicos con dolor sordo o urente y prolongado en el tiempo.
- D) Puede haber zonas gatillo.

22. - El tumor de Warthin de glándulas salivales, es cierto que:

- A) Es el tumor maligno más frecuente de glándulas salivales accesorias.
- B) Es el tumor maligno más frecuente de glándulas salivales submaxilares.
- C) Es el tumor maligno más frecuente de parótida.
- D) Es un tumor benigno.

23.- El espacio o celda parotídea es un espacio donde se puede diseminar la infección odontógena. Indique qué estructura de las siguientes se encuentra en dicho espacio:

- A) Nervio lingual
- B) Arteria carótida externa
- C) Vena facial
- D) Arteria maxilar externa

24.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la lengua vellosa:

- A) Es una hipertrofia de las papilas filiformes del dorso de la lengua.
- B) La administración de antibióticos de amplio espectro y los corticoides son agentes etiológicos.
- C) Se relaciona con un déficit de vitamina D.
- D) Es fundamental recomendar al paciente una buena higiene lingual que estimule la descamación papilar.

25.- La sensibilidad orofacial se recoge a través de las fibras somáticas de los siguientes pares de nervios craneales:

- A) V, VIII, IX, X
- B) V, VII, X, XI
- C) V, VI, IX, X
- D) V, VII, IX, X

26. - En una fractura alveolar, tras reducirla, debemos ferulizar con composite los dientes afectados y adyacentes durante:

- A) 10 días.
- B) 1 semana.
- C) 3-4 semanas
- D) 2 semanas.

27.- En infecciones odontológicas en niños y embarazadas, es FALSO:

- A) En niños hay que adaptar la posología al peso.
- B) En embarazadas, los beta-lactámicos, son de elección.
- C) El tratamiento antibiótico en madres lactantes, puede afectar al niño con diarreas y/o sobreinfecciones por *Candida albicans*.
- D) Para instaurar un tratamiento adecuado, en estos grupos, es imprescindible consultar con el obstetra o/y el pediatra.

28.- En el PABIJ, cuantas veces se realizarán las reposiciones de las obturaciones en los casos en que no haya colaboración por parte del menor o su familia:

- A) Solo una vez
- B) Hasta 2ª vez
- C) Hasta la 3ª vez
- D) Hasta la 4ª vez

29.- Indique la respuesta correcta:

- A) Los hidratos de carbono de la dieta pueden ser fermentados directamente en la Placa Bacteriana.
- B) Cuando se controla el número de ingestas la Sacarosa tiene menor poder cariogénico que el Almidón.
- C) El acceso a los ácidos generados en el interior de la Placa por las sustancias tampón de la saliva es muy grande.
- D) Los microorganismos implicados en la fermentación de la glucosa son del tipo Spiroquetas y Treponemas.

30.- Una de las siguientes aseveraciones, es FALSA:

- A) Avulsión dental de menos de una hora; el tratamiento de elección es el reimplante dental.
- B) Avulsión dental de más de una hora con ápice cerrado; el tratamiento de reimplante puede provocar anquilosis.
- C) Avulsión dental de más de una hora con ápice abierto; el tratamiento exige la reimplantación y el tratamiento de conductos; este último se realizará previa o después del reimplante.
- D) La luxación lateral puede asociarse, con poca frecuencia, a fractura alveolar.

31.-Cuál de los siguientes NO es un tratamiento sistémico para el síndrome de boca ardiente:

- A) Ansiolíticos.
- B) Fármacos anticonvulsivantes.
- C) Antibióticos de amplio espectro asociados a clorhexidina.
- D) Antidepresivos tricíclicos.

32.- Todas estas características están presentes en una oclusión permanente adecuada EXCEPTO:

- A) Existe una adecuación entre el tamaño dentario y las bases óseas de modo que pueden alinearse correctamente.
- B) Los incisivos presentan una inclinación de las coronas hacia vestibular. Al ocluir con los antagonistas, forman un ángulo de, aproximadamente, 125 grados.
- C) Existen diastemas.
- D) En oclusión las líneas medias interincisivas, superior e inferior, coinciden.

33 - En la secuencia y lugar de la formación del granuloma periapical, señale la opción correcta:

- A) En una primera fase se acumulan monocitos y macrófagos para limpiar la lesión.
- B) La inmunoglobulina más frecuentemente hallada es la IgM.
- C) Primero hay un acúmulo de polimorfonucleares.
- D) La inmunoglobulina más frecuentemente hallada fue la IgA.

34.- En el nevo blanco esponjoso, es cierto que:

- A) Tiende a la malignización.
- B) Suele ser sintomático.
- C) Es innecesario el diagnóstico diferencial con el liquen plano.
- D) Se hereda como rasgo autosómico dominante.

35.- En las consultas dentales sin posibilidad de ventilación natural, ¿qué método parece presentar mejores cualidades en la prevención frente al covid-19?

- A) Uso de presión negativa asociada a filtros HEPA.
- B) Purificación con dióxido de cloro.
- C) Purificación con ozono.
- D) Utilización de radiaciones UVC.

36.- En cuanto a los anticoagulantes de nueva generación, inhibidores directos de la trombina o del factor Xa, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Es recomendable, según cuál se utilice, conocer la función renal del paciente para valorar el riesgo de sangrado en una cirugía oral.
- B) Tras una exodoncia o intervención quirúrgica es recomendable aplicar medidas hemostáticas locales.
- C) Deberemos medir el INR como medida de seguridad antes de realizar una exodoncia.
- D) En caso de suspensión del medicamento no se recomienda sustituirlo por heparina.

37 - Típicamente, los pacientes con hepatopatías crónicas suelen tener:

- A) Niveles normales o elevados de factores de coagulación VIII y VW (Von Willebrand).
- B) Niveles elevados de plaquetas y antitrombina III.
- C) Niveles aumentados de proteína C.
- D) Niveles aumentados de proteína S.

38.- Sobre la neuralgia del glossofaríngeo, es FALSO:

- A) Cursa con dolor intenso en oído y suelo de la boca.
- B) Se puede iniciar con el bostezo y la deglución.
- C) Se puede confundir con el dolor de ATM y/o de los músculos masticatorios.
- D) A veces se acompaña de síntomas vagales como síncope y arritmias.

39.- En prótesis parcial removible (P.P.R.) con extensión distal, el movimiento de rotación en el eje longitudinal encima de la cresta alveolar residual se contrarresta con:

- A) Colocación de conectores no rígidos.
- B) La colocación de rompefuerzas entre la extensión distal y el conector mayor.
- C) La rigidez de los conectores mayores y menores.
- D) La colocación de rompefuerzas entre la extensión distal y los conectores menores.

40.- Sobre las infecciones odontogénicas y el uso de antibióticos, es FALSO:

- A) Las nuevas quinolonas son activas, frente a casi todos los Gram negativos.
- B) Los gérmenes más frecuentes en la infección odontogénica (en general son infecciones polimicrobianas), son: estreptococos orales, actinobacilos, peptosesterptococos y fusobacterias.
- C) Los antibióticos de uso común, más eficaces frente a los gérmenes más frecuentes en la infección odontogénica, son: beta-lactámicos, clindamicina, fluorquinolonas, macrólidos y metronidazol.
- D) La clindamicina es un antibiótico predominantemente bacteriostático y a dosis altas puede ser bactericida.

41.- En cuanto a los grosores necesarios para que cada tipo de restauración pueda aportar la máxima estética y resistencia, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Metalcerámica con aleación noble: 1,5 mm (1 mm para porcelana y 0,5 mm para el metal).
- B) Metalcerámica con aleación no noble: 1,3 mm (1mm para porcelana y 0,3mm para el metal).
- C) Disilicato de Litio: 2 mm en cada pared dentaria para una corona con porcelana feldespática de recubrimiento.
- D) Óxido de Zirconio: 1,2 mm en cara vestibular y proximales, pero 1,5 mm en cara palatina.

- 42.- ¿Cuál de los siguientes síndromes NO está asociado a agenesia dental?
- A) Síndrome de Down
 - B) Displasia cleido-craneal
 - C) Síndrome de Kallmann
 - D) Síndrome de Wolf-Hirschhorn
- 43.- En el síndrome de Sjögren primario, es correcto:
- A) La zona más utilizada para hacer una biopsia es la glándula submaxilar.
 - B) Es frecuente la hipergammaglobulinemia.
 - C) Es más frecuente en varones.
 - D) En la biopsia hay infiltrados de polimorfonucleares en los acini.
- 44.- Paciente que presenta anemia, disfagia para sólidos y glositis atrófica, ¿cuál sería nuestra primera opción diagnóstica?
- A) Cáncer del tracto digestivo superior.
 - B) Síndrome de Plummer-Vinson.
 - C) Acalasia.
 - D) Esclerodermia.
- 45.- El Muguet es
- A) Una candidiasis eritematosa aguda
 - B) Una candidiasis eritematosa crónica
 - C) Una candidiasis comisural
 - D) Una candidiasis pseudomembranosa aguda
- 46.- Mujer de 60 años; que comenzó con lesiones erosivo ampollosas en la boca, de distinto tamaño, de rotura fácil dejando erosiones dolorosas e irregulares, presentando lesiones en diferentes estadios, con predilección en zonas de roce, actualmente sin lesiones en piel. La inmunoprecipitación demuestra IgG antidesmogleína 3 (Dsg3). El diagnóstico es:
- A) Pénfigo foliáceo.
 - B) Pénfigo vulgar.
 - C) Penfigoide cicatrizal o de la mucosa.
 - D) Eritema multiforme.
- 47.- En referencia a la termoterapia en dolor-disfunción de la ATM, señale la opción correcta:
- A) El calor se utiliza antes de los masajes musculares en los procesos crónicos.
 - B) El calor se utiliza en procesos agudos para disminuir la inflamación.
 - C) El frío se utiliza antes de los masajes musculares en los procesos crónicos.
 - D) El frío aumenta la excitabilidad muscular.
- 48.- ¿Cómo se define el "miedo dental"?:
- A) Es una leve aprensión que causa tensión antes y durante el tratamiento.
 - B) Es una moderada aprensión que causa tensión antes y durante el tratamiento no es incapacitante.
 - C) Es una profunda aprensión que interfiere en el tratamiento requiriendo una actuación especial para poder llevarlo a cabo.
 - D) Es una intensa aprensión que causa incluso la evitación del cuidado dental.
- 49.- Señale lo INCORRECTO respecto al anticoagulante de acción directa davigatrán:
- A) Es inhibidor del factor Xa.
 - B) El citocromo P450 no está involucrado en su metabolismo.
 - C) Su máxima concentración plasmática se alcanza entre 30 minutos y 2 horas tras su administración.
 - D) No es necesario medición de INR.

50.- La anestesia que anula reversiblemente la función de conducción de los troncos nerviosos, se denomina:

- A) Regional o troncular
- B) Infiltrativa
- C) Tópica
- D) General

51.- En cuanto al manejo odontológico del paciente con trastorno cardiovascular señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Procuraremos colocar al paciente en posición algo más elevada (45-60 grados con el plano del suelo) para facilitar su respiración.
- B) La anestesia conseguida ha de ser tan profunda como se pueda para evitar desencadenar una taquicardia por estímulos dolorosos.
- C) En cuanto a la elección del vasoconstrictor, lo más prudente es usar adrenalina a la concentración más alta posible: 1: 100000.
- D) Un paciente que ha sufrido un IAM dentro de los últimos 6 meses se incluye en la categoría ASA IV y, si lo podemos evitar, no realizaremos ningún tratamiento odontológico.

52.- Sobre la apicoformación es FALSO:

- A) Está indicada en dientes con rizogénesis incompleta, pérdida de vitalidad pulpar, con reacción crónica periapical.
- B) Está contraindicada en dientes con rizogénesis incompleta, pérdida de vitalidad pulpar, sin reacción crónica periapical.
- C) A los meses se forma en la zona apical un puente de sustancia cementoide.
- D) El objetivo de la apicoformación con hidróxido cálcico es eliminar la inflamación y permitir el cierre apical.

53. En el síndrome de hiperventilación, ¿Qué alteraciones fisiológicas se producen?

- A) Aumento de los niveles de calcio iónico
- B) Acidosis respiratoria
- C) Aumento de los niveles de catecolaminas
- D) Vasodilatación de los vasos cerebrales

54.- En qué grupo de alto riesgo recomendarías la profilaxis antibiótica para la prevención de la endocarditis infecciosa:

- A) Cardiopatía congénita cianógena
- B) Comunicación Inter Auricular tipo ostium secundum
- C) Prolapso valvular mitral sin insuficiencia mitral
- D) Portador de marcapasos

55.- De la radioterapia en el tratamiento oncológico, es FALSO que:

- A) Su acción biológica es desarrollar radicales libres en el agua intracelular.
- B) La amifostina no está indicada para la reducción de la xerostomía provocada por la radioterapia.
- C) La rapidez de la muerte celular depende del tiempo de duplicación celular.
- D) La braquiterapia da mejores resultados que la teleradioterapia.

56 - La lesión iatrogénica del nervio dentario inferior, puede producir:

- A) Parálisis motora y desviación de la comisura bucal del lado afectado.
- B) Anestesia de la hemilengua del lado afectado.
- C) Hiperestesia de la zona del labio del lado afectado.
- D) Hiperestesia de la hemilengua del lado afectado.

57.- ¿Cuál de las siguientes es la artropatía temporo-mandibular más frecuente?

- A) Aplanamiento discal
- B) Perforación discal
- C) Luxación disco condilar
- D) Luxación temporodiscal

58.- ¿Cuál es el factor etiológico de la gingivoestomatitis herpética?

- A) VHS-1
- B) VHH 8
- C) VHH6
- D) VHH4

59.- La función de barrera inmunológica de la Mucosa oral se atribuye a:

- A) El epitelio exterior
- B) La lámina propia subyacente
- C) Los macrófagos
- D) Ninguna de las anteriores

60.- En la gingivitis inducida por biofilm dental, ¿cuál NO es un factor modificante?

- A) Toma de moduladores inmunológicos.
- B) Hormonas sexuales esteroideas elevadas.
- C) Sequedad oral.
- D) Hiperglucemia.

61.- Con respecto a los tipos de estudios epidemiológicos, es FALSO:

- A) En los estudios ecológicos, tanto la variable dependiente y la independiente se basan en el estudio de poblaciones.
- B) Los estudios de casos y controles son: observacionales, analíticos y retrospectivos.
- C) Los estudios de prevalencia son útiles para determinar el nivel de salud bucodental y establecer sus necesidades de tratamiento.
- D) Los estudios de cohortes son muy eficientes en el estudio de enfermedades raras.

62.- El nervio dentario medio inerva:

- A) Premolares inferiores
- B) Raíz mesial del 16
- C) Incisivos superiores
- D) Incisivos inferiores

63.- Enfermedad hereditaria que provoca lesiones vesiculo-ampollosas y en la histopatología se aprecian ampollas subepiteliales. Pensaremos en:

- A) Pénfigo vulgar.
- B) Penfigoide.
- C) Epidermolisis ampollar.
- D) Eritema multiforme.

64.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a las radiografías periapicales con técnica de bisectriz:

- A) Son de gran utilidad para el diagnóstico periodontal.
- B) Producen acercamiento de la cresta ósea al límite amelocementario.
- C) Pueden provocar distorsión de acortamiento radicular.
- D) Otra posible distorsión es la pérdida de la proporción coronorradicular.

65.- En la exodoncia, es correcto que la ruptura del hueso alveolar:

- A) Es relativamente infrecuente.
- B) Es inevitable.
- C) Se extirpa siempre el fragmento fracturado.
- D) Ninguna de las anteriores.

66.- El cáncer oral que presenta un T1 N1 M0, ¿en qué estadio se encuentra?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

67.- En la forma supurada superficial de la Queilitis glandular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) El labio está tumefacto e indurado
- B) Existe salida de pus por los orificios de desembocadura glandular
- C) Se forman costras impetigoides
- D) Requiere tratamiento quirúrgico

68.- En relación a las principales bacterias que intervienen en la formación de la caries dental. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) El streptococcus mutans produce grandes cantidades de polisacáridos extracelulares
- B) Lactobacillus aparecen cuando existe una frecuente ingesta de carbohidratos
- C) Actinomyces produce lesiones de progresión más rápida que otros microorganismo
- D) Actinomyces están relacionados con lesiones cariosas radiculares

69.- Sobre los selladores de fisuras, es FALSO:

- A) Los selladores pueden ser de resina BIS-GMA.
- B) Los selladores pueden ser de vidrio ionómero.
- C) Los selladores interfieren en la maduración adamantina pero sin repercusión clínica.
- D) Los selladores se pueden combinar con las restauraciones mínimas preventivas.

70.- La xerostomía en edades avanzadas, indique la respuesta correcta:

- A) Es más frecuente por algunas medicaciones : antidepresivos, ansiolíticos.
- B) Está causada por aumento de actividad simpaticolítica.
- C) Puede estar causada por tratamiento con Pilocarpina.
- D) Es menos frecuente en tratamientos con anticolinérgicos.

71.- En cuanto a la exploración de furcas y movilidads señale la respuesta correcta:

- A) En la lesión de furca tipo I la sonda se introduce más de 3 mm.
- B) En la movilidad tipo I existe un desplazamiento mayor a 1 mm.
- C) En la lesión de furca tipo III la sonda atraviesa la furca entre 3 y 6 mm.
- D) En la movilidad tipo III existe desplazamiento intrusivo.

72.- Dentro de los índices para medir la caries dental, el índice de Clune explora:

- A) Los 4 segundos molares permanentes.
- B) Los incisivos deciduos careados.
- C) El cociente molares deciduos cariados/ incisivos deciduos cariados.
- D) Los 4 primeros molares permanentes.

73.- Cual de los siguientes productos NO se utiliza como antifúngico:

- A) Nistatina
- B) Fluconazol
- C) Sulfametoxazol
- D) Anfotericina B

74.- En la neuralgia del nervio glossofaríngeo, cuál de las siguientes respuestas es FALSA:

- A) Dolor intenso en el paladar y conducto auditivo externo
- B) El dolor se desencadena al tragar
- C) Se acompaña habitualmente de lagrimeo y fotofobia
- D) El dolor está descrito como quemazón

75.- En la protrusión mandibular asimétrica sin mordida abierta anterior; es FALSO:

- A) Hay prognatismo mandibular.
- B) Se debe a una hiperplasia condilar bilateral excéntrica.
- C) Hay desviación del mentón.
- D) No se asocia a Clase III dentaria ni a hipoplasia maxilar.

76.- Respecto a la gingivitis del embarazo señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Se produce un aumento de la vascularización y fenómenos proliferativos con gran cantidad de infiltrado de células inflamatorias.
- B) La encía aparece de color rojo oscuro y sangra fácilmente.
- C) Existe edema, engrosamiento del margen gingival y puede haber formación de pseudobolsas.
- D) A nivel gingival existen receptores para estrógenos y progesterona, lo que permite que estas hormonas puedan ejercer alteraciones vasculares, celulares, microbiológicas e inmunológicas dando lugar a un aumento del grado de gingivitis.

77.- Qué pauta de profilaxis antibiótica se le daría a un niño alérgico a la penicilina para la prevención de la endocarditis bacteriana según AHA:

- A) Amoxicilina 50 mg/kg de 30 a 60 minutos antes del procedimiento
- B) Azitromicina 50mg/kg de 30 a 60 minutos antes del procedimiento
- C) Clindamicina 20 mg/kg de 30 a 60 minutos antes del procedimiento
- D) Claritromicina 500 mg/kg de 30 a 60 minutos antes del procedimiento

78.- Respecto al Flúor señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Un adulto puede ingerir alrededor de 0,5 mg diarios a partir de alimentos sin tener en cuenta el aporte del agua.
- B) El té contiene 175 ppm de Flúor sobre su peso neto en materia seca, lo que ha motivado su posible utilización como elemento preventivo de la caries dental.
- C) La absorción de Flúor es un proceso especialmente pasivo, en el que no participa ningún mecanismo activo de transporte.
- D) La concentración máxima de Flúor en el plasma es proporcional a la dosis ingerida y al ritmo de absorción, influida por el peso corporal. La concentración máxima se produce a las dos horas.

79 - Referente a agentes hemostáticos en cavidad oral, cuál es la respuesta correcta:

- A) El copolímero de óxido de alquileo afecta a la osteogénesis y a la cicatrización de la herida y no es biocompatible.
- B) La celulosa oxidada regenerada es absorbible y de pH bajo.
- C) La esponja de gelatina no es reabsorbible ni se puede usar con agentes biológicos (trombina).
- D) Las ceras óseas son reabsorbibles.

80.- Los dientes supernumerarios son más frecuentes en :

- A) Línea media de la región anterior del maxilar superior
- B) Línea media de la región anterior del maxilar inferior
- C) En la región posterior del maxilar superior
- D) En la región posterior del maxilar inferior

81.- ¿A qué tipo de pulpitis corresponde la pulpitis hiperplásica o pólipo pulpar?

- A) A una pulpitis irreversible sintomática
- B) A una necrosis pulpar parcial aséptica
- C) A una pulpitis reversible
- D) A una pulpitis irreversible asintomática

82.- Todas las células siguientes pertenecen a la población celular extrínseca permanente del epitelio de la mucosa oral, EXCEPTO:

- A) Células de Langerhans.
- B) Granulocitos.
- C) Melanocitos.
- D) Células de Merkel.

83.- Son requisitos generales de un mantenedor de espacio todos, EXCEPTO:

- A) Diseño sencillo que permita una higiene correcta.
- B) No interferir en el desarrollo de las bases óseas.
- C) Impedir la intrusión del diente antagonista.
- D) No interferir en la erupción normal de los dientes permanentes.

84.- La ganancia mecánica obtenida utilizando un botador como palanca de primer género es mayor si:

- A) Aumenta el brazo de potencia y el de resistencia.
- B) Aumenta el brazo de potencia y disminuye el de resistencia.
- C) Disminuye el brazo de potencia y aumenta el de resistencia.
- D) Disminuyen el brazo de potencia y el de resistencia.

85.- Dentro de las lesiones elementales de los epitelios, es CIERTO que:

- A) Lo que distingue una erosión de una fisura es el tamaño.
- B) Son lesiones elementales primarias el esfacelo y la úlcera.
- C) Lo que diferencia la erosión de la úlcera es la profundidad de la lesión.
- D) El esfacelo es tejido desvitalizado de color grisáceo o amarillento.

86 - En una fístula buco-sinusal de 5 mm. para tratarla ¿cuál de estos colgajos se hacen por palatino?

- A) Colgajo con bolsa adiposa de Bichat.
- B) La técnica de Lautenschlagen.
- C) El colgajo de la técnica de Pichler.
- D) El colgajo yugal de base anterior.

87.- Sobre el quiste óseo solitario, es FALSO:

- A) Mayoritariamente son asintomáticos.
- B) Cursa con dientes vitales.
- C) Afecta mayoritariamente a la mandíbula y en la zona de la sínfisis mandibular.
- D) El quiste está rodeado por un epitelio de recubrimiento.

88.- Hoy en día, el MIDAZOLAM es una benzodiacepina para efectuar sedación consciente por vía oral. Indique la respuesta FALSA:

- A) Produce amnesia retrógrada.
- B) El pico plasmático se consigue a los 20 minutos después de la ingesta oral.
- C) El efecto sedante desaparece después de 45 minutos.
- D) La dosis máxima en niños menores de 25 kilos es de 12 mg.

89 - El nivel de hemoglobina glicosilada (HbA1) en personas sanas, la cifra más aproximada es:

- A) 4,6 – 5,8 %
- B) 7,1 – 8,3 %
- C) 8,3 – 9,4 %
- D) 2,5 – 3,7 %

90- ¿Desde cuándo no se puede usar la amalgama de plata según el Acuerdo provisional emitido por la Unión Europea como material de obturación en menores de 15 años?:

- A) Desde el 1 de enero de 2017
- B) Desde el 1 de julio de 2018
- C) Desde el 1 de enero de 2016
- D) Desde el 18 de julio de 2019

91.- Sobre el quiste del conducto nasopalatino. Es cierto:

- A) Es un quiste inflamatorio y el más frecuente porcentualmente.
- B) Es un quiste inflamatorio y el tercero más frecuente porcentualmente.
- C) Es un quiste de desarrollo no odontogénico.
- D) Es un quiste de desarrollo odontogénico.

92.- El colgajo triangular-rectangular con incisión horizontal mucogingival en cirugía periapical está indicada en:

- A) Presencia de poca encía adherida.
- B) Raíces cortas.
- C) Lesiones periapicales de gran tamaño.
- D) La encía marginal y el aparato de inserción están alterados.

93.- Referente a la extracción de dientes permanentes señale la respuesta INCORRECTA:

- A) En la sindesmotomía se desinserta el diente del ligamento circular del periodonto.
- B) La luxación se ejecuta con el botador o elevador, realizando movimientos de palanca.
- C) La prensión se realiza con el fórceps idóneo. El eje longitudinal de la parte activa del fórceps debe colocarse paralelo al eje longitudinal del diente.
- D) La tracción realizada con el fórceps debe evitar los movimientosápico-coronales.

94.- En las complicaciones intraoperatorias de las estructuras óseas de una exodoncia, es cierto que:

- A) La fractura de la tabla externa alveolar es más frecuente en molares superiores.
- B) La perforación sinusal es más frecuente en la extracción de dientes con raíces cercanas al seno maxilar con infección periapical crónica.
- C) El fragmento óseo vestibular fracturado debe ser siempre retirado.
- D) La fractura de la tuberosidad siempre está relacionada con la exodoncia de un cordal superior.

95.- Los criterios diagnósticos del líquen plano oral son todos los siguientes EXCEPTO:

- A) Presencia de lesiones reticulares erosivas, ampollas o placas.
- B) Presencia de banda definida de infiltrado linfocitario en el tejido conectivo.
- C) Signos de degeneración hidrópica en la capa basal.
- D) Presencia de signos de metaplasia epitelial.

96.- ¿Cuál es el trastorno estomatológico más frecuente en un paciente tratado con hidantoínas?

- A) Labios resecos
- B) Caries
- C) Hiperplasia gingival
- D) Reabsorciones radiculares

97.- Marcar la respuesta correcta en cuanto a la prestación de colocar coronas protésicas reflejada en la ORDEN de 28 de marzo de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prestación de la atención sanitaria bucodental a la población infantil y juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón

- A) Son tratamientos que siempre están excluidos
- B) Es un tratamiento incluido en la asistencia dental especial
- C) Es un tratamiento incluido en la asistencia dental básica
- D) No se incluyen en los tratamientos por malformación o traumatismo

98.- ¿En qué pieza dentaria localizaría el tubérculo de Zuckerkandl?

- A) Canino superior temporal
- B) Primer molar permanente
- C) Segundo molar permanente
- D) Primer molar temporal

99 - En la disfunción cráneomandibular qué NO es cierto:

- A) En la co-contracción muscular protectora no hay dolor en reposo.
- B) En el dolor muscular local, duele a la palpación y aumenta con la función.
- C) En el dolor miofascial por puntos gatillo, el tacto aumenta el dolor.
- D) En la miositis o mialgia inflamatoria no hay dolor en reposo.

100.- ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte de la matriz orgánica de los composites?

- A) Sistema de monómeros BIS-GMA
- B) Indicadores de polimerización: canforoquinona
- C) Dióxido de silicio
- D) Agente reductor

101.- En referencia a la sutura en cirugía oral y maxilofacial, señale la respuesta correcta:

- A) El ácido poliglicólico es sintético y reabsorbible.
- B) El catgut crómico permanece menos tiempo que el catgut simple.
- C) El ácido poliglicólico se reabsorbe antes que el catgut simple.
- D) Los puntos en la zona de la piel se ponen perpendiculares a la incisión, quedando paralelos a las líneas de Langer.

102.- La fractura central vertical de maxilar superior o disyunción intermaxilar se llama:

- A) Fractura de Lannelongue.
- B) Fractura de Colles.
- C) Fractura de Ludwig.
- D) Fractura de Perthes.

103.- En algunas lesiones endo-periodontales el MTA (agregado trióxido mineral) se utiliza por:

- A) Propiedades hidrofílicas.
- B) Su pH de 9.
- C) Radiolucidez en Rx.
- D) Bajo coste y fácil manejo.

104.- Cuando en la exodoncia de un cordal inferior se produce una interrupción temporal de la transmisión nerviosa debido a una compresión ligera, se denomina:

- A) Axonometsis
- B) Neuroapraxia
- C) Neurometesis
- D) Neuralgia

105.- En cuanto a la técnica radiológica de Clark señale la respuesta correcta:

- A) Se realizan dos radiografías de aleta de mordida.
- B) La imagen que estudiamos se desplaza en el sentido del foco si está situada a lingual.
- C) Se realizan 2 radiografías oclusales.
- D) La imagen que estudiamos se desplaza en el sentido del foco si está situada a vestibular.

106.- En el mecanismo de acción de los bifosfonatos, es ERRÓNEO que:

- A) Tienen efecto angiogénico.
- B) Inducen la apoptosis de los osteoclastos.
- C) Inducen alteración de los macrófagos.
- D) Presentan propiedades antitumorales.

107.-Respecto al nevus intramucoso,¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) Es el más frecuente de los que se localizan en la mucosa oral
- B) Aparecen a cualquier edad
- C) Es más frecuente en mujeres
- D) La localización más frecuente es en encías y labios

108.- Sobre el Tratamiento de la intrusión, es FALSO:

- A) Intrusión de 7mm en diente con ápice abierto. El tratamiento de elección es la ortodoncia.
- B) Intrusión de 3mm en diente con ápice cerrado. El tratamiento de elección es la erupción espontánea.
- C) Intrusión de 5mm en diente con ápice cerrado. El tratamiento de elección es la ortodoncia o la cirugía.
- D) Intrusión de 8mm en diente con ápice cerrado. El tratamiento de elección es la cirugía.

109.- Respecto a la Angina de Ludwig, indique la respuesta FALSA:

- A) Es una celulitis grave
- B) Por lo regular empieza en el espacio submaxilar y luego se extiende a otros espacios
- C) La principal fuente de infección es un molar del maxilar superior
- D) El paciente manifiesta una hinchazón amplia del suelo de la boca con elevación de la lengua

110.-Cuál de las siguientes respuestas es una contraindicación de la biopsia oral:

- A) Diagnóstico de lesiones potencialmente malignas
- B) Realizarla a pacientes con un estado general grave cuya enfermedad de base podría empeorar
- C) Para el diagnóstico de difícil justificación
- D) Algunas enfermedades bacterianas crónicas que cursan con lesiones orales no abscesificadas, ni periodontales

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

[illegible]