



## Recomendaciones de utilización de la vacuna diTeBooster

**Elaboración:** Aurora Limia Sánchez, Elena Cantero Gudino, Agustín Portela Moreira, José Antonio Navarro Alonso, Luis C. Urbiztondo Perdices, Manuel Méndez Díaz, María Luisa García Gestoso, Inmaculada Vera Gil, Eliseo Pastor Villalba y José Antonio Lluch Rodrigo.

**Revisión y aprobación:** Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 26 octubre 2017.  
Comisión de Salud Pública, 16 noviembre 2017.

### 1- Antecedentes

Desde febrero de 2017 se han presentado problemas de suministro de las dos vacunas Td comercializadas en España, Diftavax (Sanofi) y Ditanrix (GSK).

El 9 de febrero de 2017, la Comisión de Salud Pública acordó priorizar la vacunación con Td en la profilaxis postexposición ante heridas tetanígenas y suspender temporalmente la dosis de recuerdo con Td a los adolescentes y las dosis de recuerdo a los adultos. El 10 de marzo de 2017, se reestableció la vacunación de la dosis de recuerdo a adolescentes y adultos, tras acordar la asignación de dosis procedentes de EEUU y comercializadas por Grifols.

La vacuna diTeBooster está autorizada desde 2007 en España para su uso como dosis de recuerdo. En los últimos años se había discontinuado su comercialización por problemas de producción. La compañía AJ Vaccines, actual titular del registro de la vacuna, ha reanudado la comercialización de esta vacuna y, tras realizar las gestiones oportunas, habrá disponibilidad de dosis a partir de finales de octubre de 2017 y en 2018.

### 2- Recomendaciones de utilización de la vacuna diTeBooster

La vacuna diTeBooster se utilizará como cualquier otra vacuna Td, tal y como se describe brevemente a continuación:

- **Utilización como dosis de recuerdo.** La vacuna diTeBooster puede utilizarse como dosis de recuerdo a partir de los 5 años de edad, tal y como figura en su ficha técnica<sup>1</sup>. Además, la vacuna diTeBooster puede utilizarse en sustitución de las vacunas con DTPa en aquellos lactantes y niños menores de 5 años en los que el componente frente a tosferina esté contraindicado<sup>2</sup>.
- **Utilización en primovacunación.** La vacuna diTeBooster puede utilizarse en la primovacunación en niños (>7 años) y en adultos.
- **Utilización en embarazadas.** La vacunación de refuerzo en embarazadas se realizará con vacuna dTpa. Solamente se utilizará vacuna diTeBooster en caso de ser necesario iniciar o completar la primovacunación. Además, todas las embarazadas recibirán una dosis de vacuna dTpa en el último trimestre de gestación<sup>3,4</sup>.
- **Utilización como profilaxis ante heridas potencialmente tetanígenas.** Se utilizará diTeBooster siguiendo las pautas recomendadas en función de las características de la herida y de los antecedentes de vacunación<sup>4</sup>.

Esta vacuna se administrará por vía intramuscular, utilizando una aguja de tamaño adecuado a las dimensiones de la persona a vacunar, preferentemente de 25 mm.



### 3- Bibliografía

---

<sup>1</sup> Ficha técnica de DITEBOOSTER SUSPENSION INYECTABLE. Disponible en:

<https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar&numDefinitivo=68579> [consultado el 10 de octubre de 2017].

<sup>2</sup> Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacunación de niños en los que no está indicada la vacuna frente a tosferina. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 3 de abril de 2009. Disponible en:

<http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/docs/recomenTd2009.pdf> [consultado el 10 de octubre de 2017].

<sup>3</sup> Grupo de Trabajo tos ferina 2015 de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Adenda al programa de vacunación frente a tos ferina en España: vacunación en el embarazo. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015. Disponible en:

[http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Adenda\\_TosFerinaEmbarazo.pdf](http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Adenda_TosFerinaEmbarazo.pdf) [consultado el 10 de octubre de 2017].

<sup>4</sup> Grupo de trabajo recomendaciones Td 2017. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Recomendaciones de utilización de vacunas Td. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017. Disponible en:

[http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/TetanosDifteria\\_2017.pdf](http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/TetanosDifteria_2017.pdf) [consultado el 10 de octubre de 2017].