

TABLA RESUMEN ARAGÓN 2014.

CAMBIOS CALENDARIO VACUNACIONES Y ESTRATEGIAS TEMPORALES

Este calendario entrará en vigor a partir del 1/04/2014

Edad	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	11 a	12 a	14 a
Cambios 2014	HB	VPI DTPa Hib HB	VPI DTPa Hib MC	VPI DTPa Hib HB	MC SRP	MC	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa SRP	Var	MC Var	dT VPH
Nota		a	b		c	d		e	f	g	h	i

a. Se suspenderá la administración de la vacuna de meningococo C a los 2 meses de edad, para todos los niños que acudan al centro de vacunación a partir del 1/04/14.

b. A aquellos niños que ya no hayan recibido la dosis de los 2 meses, es decir los nacidos a partir del 1/02/14, se les administrará exclusivamente la vacuna NeisVac-C -la primovacuna con una única dosis a los 4 meses no deberá ser con Menjugate-. Los niños que ya hayan recibido la dosis de los 2 meses de edad recibirán una dosis de vacuna a los 4 meses -en este caso podrá administrarse Menjugate o NeisVac-C-.

c. Se comenzará la administración de meningococo C a los 12 meses de edad a partir del 1/04/14. No es necesaria la captación activa de los niños entre 12 y 15 meses. El intervalo entre la primovacuna y la dosis de recuerdo será al menos de 6 meses -si excepcionalmente un niño recibió la vacuna por encima de los 6 meses de edad se demorará la dosis de recuerdo de los 12 meses hasta alcanzar este plazo mínimo-.

La administración de la dosis de triple vírica a los 12 meses está implementada en la práctica desde finales de 2011.

d. Se seguirá vacunando a los 15 meses, hasta que los vacunados a los 12 meses alcancen esa edad, garantizando que todos los niños reciben una dosis por encima del año de vida. Los niños que reciban la dosis de vacuna de meningococo C a los 12 meses no necesitarán repetirla a los 15 meses.

e. Se comenzará la administración de Triple Vírica a los 3 años a partir del 1/04/14.

Se realizará captación activa* a los niños de esa cohorte que ya hayan cumplido los 3 años -nacidos en enero-marzo de 2011-. Los que reciban la dosis de Triple Vírica a los 3 años no necesitarán repetirla a los 6 años.

No se adelantará la 2ª dosis de triple vírica -esperarán a cumplir los 6 años- de los nacidos en 2009 y 2010.

f. El cambio de la vacuna DTPa -alta carga antigénica- por la vacuna dTpa -baja carga- ya está realizado en la práctica. Durante 3 años se seguirá administrando la 2ª dosis de vacuna triple vírica a los 6 años -hasta que las cohortes de vacunados a los 3 años alcancen los 6 años de edad-.

g. Se suspenderá la administración de la vacuna frente a la varicela a los 11 años a partir del 1/04/14. Únicamente se administrarán las segundas dosis de las pautas ya iniciadas en niños nacidos en enero, febrero o marzo de 2003.

h. Se comenzará la administración de la dosis de la adolescencia de vacuna frente a meningococo C a los 12 años a partir del 1/04/14. Los niños que hayan recibido una dosis de vacuna antimeningocócica conjugada administrada con 10 o más años de edad no precisarán la dosis de los 12 años.

Se realizará captación activa* a niños de esas cohortes que ya hayan cumplido los 12 años -nacidos en enero-marzo de 2002-.

Salvo nuevas instrucciones no se emplearán dosis de vacuna frente a meningococo C suministradas por el Gobierno de Aragón para vacunados nacidos antes de 2002, excepto en aquellas personas nacidas después del 01/01/1985 y que nunca hayan recibido una dosis previa; en estas situaciones se aplicará una dosis única.

Se comenzará la administración de la vacunación de varicela a los 12 años a partir del 1/04/14, con dos dosis -o solo una si ya se les ha administrado una dosis previamente-, únicamente para aquellos que no hayan pasado la enfermedad ni estén vacunados previamente.

i. Vacuna frente a VPH únicamente para las chicas, 2 o 3 dosis dependiendo de la vacuna. La pauta de Cervarix pasa a ser de dos dosis -0-6 meses- para chicas hasta 14 años inclusive; la pauta para aquellas que inicien la vacunación con 15 o más años sigue siendo de 3 dosis. La pauta de Gardasil sigue siendo de 3 dosis.

* La D.G. de Salud Pública enviará cartas informativas a las familias de los niños a los que se realizará captación activa: triple vírica, nacidos enero-marzo de 2011 y meningococo c, nacidos enero-marzo de 2002.