

VACUNAS A ADMINISTRAR EN FUNCIÓN DE LA EDAD Y AÑO DE NACIMIENTO

ARAGÓN 2018

Orden SAN/1844/2016 del Consejero de Sanidad, de 13 de diciembre – [Circular DGSP 04/2016](#)

Fecha nacimiento	Edad administración	Vacunas correspondientes según calendario oficial
2003	15 años	Completar VPH, solo chicas ¹
2004	14 años	Td / <i>Suspendida VPH</i> ¹
2005	13 años	
2006	12 años	Meningococo C / VPH, 2 dosis, solo chicas ¹ / Varicela, 2 dosis ²
2007	11 años	
2008	10 años	
2009	9 años	Revisar DTPa / dTpa ³
2010	8 años	Revisar dTpa ³
2011	7 años	Revisar dTpa ⁴
2012	6 años	dTpa ⁴ / <i>Suspendida SRP</i> ⁵
2013	5 años	
2014	4 años	
2015	3 años	SRP / Varicela ⁶
Enero-Junio 2016	2 años	
	18 meses	Pentavalente solo hasta que los vacunados pauta 2+1 alcancen esta edad ⁷
Julio-Diciembre 2016	2 años	
	18 meses	<i>Suspendida Pentavalente si ya recibieron Hexavalente a los 11 meses</i> ⁷
	15 meses	Varicela ²
	12 meses	SRP / Meningococo C / Neumococo
2017	18 meses	<i>Suspendida Pentavalente</i> ⁷
	15 meses	Varicela ²
	12 meses	SRP / Meningococo C
	11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	6 meses	<i>Suspendida Hexa</i> ⁷ / Neumococo -solo si Factor de Riesgo- ⁸
	4 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo / Meningococo C
	2 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
2018	11 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	6 meses	Neumococo -solo si Factor de Riesgo- ⁸
	4 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo / Meningococo C
	2 meses	Hexavalente (DTPaVPI-Hib-Hep B) / Neumococo
	0 meses	<i>Se suspende vacunación universal al nacer frente a Hepatitis B.</i> ⁷ Solo a hijos de madres portadoras -junto con gammaglobulina- y de madres sin control serológico previo al parto -serología de urgencia-. ⁹
Embarazadas último trimestre		dTpa en cada embarazo entre semana 28 y 32 de gestación. ¹⁰

1. VPH, solo chicas, dos dosis si pauta iniciada a los 14 años; tres dosis si se inicia con 15 años. [Circular DGSP 07/2015](#). En 2017 última cohorte a los 14 años, nacidas en 2003.
 2. Varicela, 12 años: dos dosis, separadas entre sí, al menos un mes, e idealmente 2 meses; solo aquellos sin antecedentes de enfermedad ni vacunación previa. [Circular DGSP 09/2017](#).
 3. Únicamente a aquellos nacidos en 2009 y 2010 que NO hayan recibido aún dTpa o DTPa a partir de los 6 años, repesca de 2017. [Circular DGSP 08/2017](#).
 4. Restablecida vacuna dTpa para nacidos en 2011 y siguientes. [Circular DGSP 02/2017](#).
 5. Se suspende 2ª dosis de triple vírica a los 6 años -ya vacunados a los 3 años, nacidos en 2011 y siguientes-.
 6. Varicela primera infancia: 15 meses, primera dosis.
- Segunda dosis vacuna varicela a los 3 años de edad, nacidos en 2015** y posteriormente. Empleo de **vacunas tetravíricas** (sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) cuando estén disponibles; hasta entonces, administración de una dosis de vacuna frente a varicela y otra de triple vírica, el mismo día, en zonas anatómicas diferentes (en principio, una en cada zona deltoidea). [Circular DGSP 02/2016](#).
7. Nuevo calendario 2+1. [Circular DGSP 04/2016](#).
 8. Neumococo. Dosis adicional, únicamente para aquellos factores de riesgo incluidos en [Circular DGSP 01/2016](#).
 9. Profilaxis perinatal hepatitis B. [Circular DGSP 03/2016](#).
 10. Vacuna dTpa en embarazadas. [Circular DGSP 06/2015](#).

HB: Hepatitis B; VPI: Vacuna Polio Inactivada; Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b;
 DTPa: Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular de alta carga;
 dTpa: Difteria, Tétanos, Pertussis acelular carga reducida;
 Td: Tétanos, Difteria tipo adulto;
 SRP: Sarampión, Rubeola, Parotiditis -triple vírica-;
 VPH: Virus del Papiloma Humano.

Es importante **no demorar la fecha de administración de las dosis de los 2 y 4 meses de edad** para reducir el riesgo de tosferina.

Hitos cambio calendario:

Enero 2018	Suspensión dosis Pentavalente a 18 meses a nacidos en julio 2016. Inicio administración 2ª dosis vacuna frente a varicela a los 3 años de edad, nacidos en 2015.
-------------------	---