

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

RESOLUCION DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE 4 DE ABRIL DE 2017, (MODIFICADA POR RESOLUCION DE 19 DE MAYO) Y DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOA Nº 80 DE 28 DE ABRIL DE 2017, Nº 99 DE 26 DE MAYO Y Nº 183 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Categoría:

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE PSIQUIATRÍA EN CENTROS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 110.

Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.

- El tiempo de realización de este ejercicio es de: 2:15 HORAS.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA DE PSIQUIATRIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

- 1 De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al fin de la vía administrativa, señale cual es la opción CORRECTA:
 - A: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.
 - B: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de dos meses, si el acto fuera expreso.
 - C: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
 - D: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso.

- 2 Según el estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados la Hospitalización), la incidencia de Efectos Adversos relacionados con la hospitalización está:
 - A: En torno al 90% de los pacientes.
 - B: Aproximadamente un 10% de los pacientes.
 - C: Nunca es más del 0,5%.
 - D: Al menos el 50 % de los pacientes.

- 3 El modelo de Gestión de Calidad total EFQM (European Foundation for Quality Management) señale la respuesta FALSA:
 - A: Es un marco de trabajo prescriptivo.
 - B: Esta formado por 9 criterios que se detallan en 32 subcriterios.
 - C: En el centro de la representación gráfica del modelo, y sirviendo de enlace entre los criterios agente y los resultados, el criterio 5 "Procesos" tiene un gran peso específico (14%), siendo la gestión por procesos uno de los ejes fundamentales del modelo.
 - D: El modelo reconoce que la excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante distintos enfoques.

- 4 Según la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ¿a quién corresponde el establecimiento de los títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud, así como supresión o cambio de denominación?:
 - A: Al Ministerio de Educación y Cultura.
 - B: Al Ministerio de Sanidad y Consumo.
 - C: Al Gobierno.
 - D: Al Consejo Nacional de Especialidades en la Salud.

- 5 En el contexto de los ensayos clínicos señale la respuesta FALSA respecto al Número Necesario de pacientes a tratar (NNT).
- A: El Número necesario de casos a tratar (NNT) indica cuantos pacientes sería necesario tratar para evitar una enfermedad, fallecimiento o efecto secundario.
 - B: El NNT es el inverso de la Reducción Absoluta del Riesgo.
 - C: Cuanto mayor es el NNT mayor es el efecto del fármaco y su impacto coste-efectivo.
 - D: Cuanto menor es el NNT mayor es la eficacia del fármaco probado en un ensayo clínico.
- 6 De acuerdo con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, ¿cuál de los siguientes derechos NO se corresponde como un derecho colectivo del personal estatutario?:
- A: A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional.
 - B: A la huelga.
 - C: A la libre sindicación.
 - D: A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral.
- 7 En el modelo de excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management) ¿cuál es el criterio de autoevaluación que aporta un mayor número de puntos o más peso?
- A: Liderazgo.
 - B: Resultados clave.
 - C: Resultados en los clientes.
 - D: Resultados en las personas.
- 8 En las fases de la planificación de una investigación, ¿cuál de los siguientes componentes NO pertenece a la fase de planificación operativa de la población a estudio?
- A: Definir la población diana y población accesible.
 - B: Detallar la estrategia de análisis para el proceso de los datos.
 - C: Describir los criterios de selección.
 - D: Determinar el tipo de muestreo y el tamaño muestral.
- 9 ¿En cuál de estos diseños de estudios epidemiológicos se mide la incidencia de la enfermedad?
- A: Casos y controles.
 - B: Cohortes.
 - C: Serie de casos.
 - D: Estudio transversal.
- 10 En los Consejos de Salud de Área, la representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones Locales comprendidas en su demarcación supondrá:
- A: El 35% de sus miembros
 - B: El 25% de sus miembros
 - C: El 30% de sus miembros
 - D: El 50% de sus miembros
- 11 En la distinción entre delirium y demencia, cada una de las siguientes características del delirium pueden darse en la demencia, EXCEPTO:
- A: Un inicio agudo o subagudo.
 - B: Alucinaciones.
 - C: Fallos de atención.
 - D: Una alteración del nivel de conciencia.

- 12** Las escalas de Barratt y Plutchik son utilizadas para medir:
- A: Ansiedad
 - B: Suicidio
 - C: Impulsividad
 - D: Demencia
- 13** Violencia de género. En relación al maltratador, señale la respuesta CORRECTA:
- A: Se recogen tasas de enfermedad mental (excluyendo alcoholismo) que oscilan entre el 25 y 35% según los estudios.
 - B: La mayoría (más del 70% según estudios) de los maltratadores son violentos con más personas además de con sus parejas.
 - C: Es característico en el maltratador un sistema rígido de creencias y actitudes respecto al género y el uso de la violencia como forma de resolver conflictos.
 - D: Según diversos estudios, más del 80% de los maltratadores habían sufrido malos tratos en la infancia.
- 14** A la falta de sentimiento asociado con un tema de ordinario cargado emocionalmente se le denomina:
- A: Acatexis.
 - B: Acenestesia.
 - C: Alexitimia.
 - D: Denegación.
- 15** ¿Qué es FALSO en la terapia cognitiva?
- A: Es estructurada.
 - B: De corta duración, habitualmente menos de 6 meses.
 - C: Precisa de actitud activa por parte del paciente.
 - D: Pretende la resolución de los conflictos inconscientes.
- 16** Acude a consulta un paciente varón de 59 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que presenta dificultades progresivas en el equilibrio y la marcha, que le conduce a caídas frecuentes; además presenta una progresiva pérdida del control voluntario del movimiento de los ojos, disartria y disfagia; así como dificultades cognitivas y conductuales. Exponga cuál es el diagnóstico MÁS PROBABLE de entre los que se exponen:
- A: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
 - B: Parálisis supranuclear progresiva.
 - C: Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
 - D: Enfermedad por cuerpos de Lewy.
- 17** ¿Quién es el autor principal de la terapia centrada en esquemas para los trastornos de personalidad?
- A: Beck.
 - B: Kernberg.
 - C: Young.
 - D: Ryle.
- 18** En las técnicas de entrevista psiquiátrica: ¿qué intervención NO se considera facilitadora?
- A: Humor.
 - B: Tanteo.
 - C: Silencio.
 - D: Resumen.

- 19 ¿Cuál de estos NO es un criterio para evaluar la capacidad testamentaria de un paciente?
- A: Los pacientes deben conocer la naturaleza y cuantía de sus bienes.
 - B: Los pacientes deben conocer la identidad de sus familiares.
 - C: Los pacientes deben conocer que están haciendo un legado.
 - D: Los pacientes no deben tener esquizofrenia.
- 20 Señale el cambio biológico que NO se asocia a envejecimiento:
- A: Disminución del transporte en la barrera hematoencefálica.
 - B: Se tarda más tiempo en aprender nuevos contenidos, pero todavía se produce el aprendizaje completo.
 - C: Descenso en el anabolismo y catabolismo de los transmisores celulares.
 - D: Disminución de la velocidad psicomotora y mantenimiento de cociente de inteligencia hasta los 80 años.
- 21 Uno de los siguientes autores NO es considerado terapeuta grupal:
- A: Bion.
 - B: Foulkes.
 - C: Pichon-Rivière.
 - D: K. Abraham.
- 22 ¿Cuál de las siguientes es CIERTA respecto a las psicosis autoscópicas?
- A: Está incluida como nueva categoría en el DSM-5.
 - B: Es más frecuente en mujeres de edad avanzada.
 - C: No suele ser progresiva ni incapacitante.
 - D: Se considera ligado a un cociente intelectual limitado.
- 23 Respecto los déficits cognitivos en la esquizofrenia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: Puede presentarse en pacientes con un primer episodio psicótico.
 - B: Puede presentarse en familiares de primer rango sanos de pacientes con esquizofrenia.
 - C: Este deterioro cognitivo progresa con el curso de la enfermedad en menores de 65 años, aunque no estén institucionalizados.
 - D: La Matrics Consensus Cognitive Battery esta compuesta por diez pruebas agrupadas en siete dominios cognitivos.
- 24 Han mostrado eficacia timo estabilizadora en manía:
- A: Litio, gabapentina, topiramato y pregabalina.
 - B: Litio, valproato, carbamazepina y oxcarbacepina.
 - C: Litio valproato, oxcarbacepina y aripiprazol.
 - D: Litio, topiramato, quetiapina y pregabalina.
- 25 El uso de la neuroimagen en psiquiatría está indicado en:
- A: Demencia, retrasos del neurodesarrollo y psicosis.
 - B: Demencia, trastorno bipolar y esquizofrenia.
 - C: Demencia, déficits neurológicos y en investigación.
 - D: Demencia, autismo y estrés postraumático.

- 26 La estancia media ajustada por la casuística (EMAC), ¿para qué se utiliza?
- A: Se utiliza cuando se quiere saber si la estancia media propia de un hospital ha sido mayor (peor) o menor (mejor) que la de otros hospitales, si hubiera atendido los mismos pacientes que ellos.
 - B: Para conocer la complejidad que atiende (si es mayor o menor que la del estándar).
 - C: Para conocer la adecuación de la estancia media del hospital (si es realmente mayor o menor que la del estándar).
 - D: Para conocer si el funcionamiento del hospital es mejor o peor que el del estándar, entendiendo mejor como estancia media menor que el estándar y peor como estancia media mayor que el estándar.
- 27 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto a la Porfiria aguda intermitente?
- A: Se hereda mediante un gen autosómico dominante de penetración incompleta.
 - B: Se debe a un exceso de porfobilinogeno desaminasa.
 - C: Generalmente afecta al Sistema Nervioso Central.
 - D: En muchos pacientes es frecuente observar labilidad emocional con comportamiento histriónico.
- 28 Indique la respuesta FALSA:
- A: En terapia de pareja se trabaja con distorsiones cognitivas y esquemas mentales.
 - B: Por extraño que pueda parecer, el hogar, lugar de cariño, compañía y de satisfacción, puede ser sitio de riesgo para las conductas violentas y la familia que es una institución muchas veces cerrada, constituye un caldo de cultivo apropiado para las agresiones.
 - C: El hecho de proceder de una familia divorciada, en sí mismo, no nos dice mucho sobre su trayectoria y consecuencias en el desarrollo.
 - D: En las terapias de pareja deben participar siempre los hijos mayores.
- 29 ¿Qué antidepressivo induce MÁS frecuentemente crisis comiciales?
- A: Venlafaxina.
 - B: Bupropion.
 - C: Sertralina.
 - D: Fluoxetina.
- 30 En la patogenia de los Trastornos somatomorfos, señale la respuesta CORRECTA:
- A: Se ha descartado componente genético.
 - B: Se observa aumento del metabolismo en lóbulos frontales.
 - C: Intervienen las citocinas.
 - D: Se ha observado una agenesia parcial de la amígdala cerebral en hasta un 25% de las necropsias de estos pacientes.
- 31 El vandalismo, la delincuencia, las peleas y la confrontación. que aparecen después de un estresor grave son característicos de:
- A: Depresión.
 - B: Abuso de sustancias psicoactivas.
 - C: Falta de apoyo social, el verdugo realmente es víctima.
 - D: Trastorno adaptativo con alteración de conducta.
- 32 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al credo neokraepeliniano es FALSA?
- A: La psiquiatría es una rama de la medicina.
 - B: La psiquiatría debe utilizar el conocimiento científico.
 - C: Los criterios diagnósticos deben ser fiables y estar validados.
 - D: No existe una frontera entre lo normal y lo patológico.

- 33 La puesta en marcha de investigación y experiencia clínica en primeros episodios de psicosis ha descubierto:
- A: La teoría del neurodesarrollo.
 - B: La duración de periodo psicótico no tratado (DUP).
 - C: Los pródromos de psicosis.
 - D: La mejor respuesta al tratamiento en fases iniciales de la enfermedad.
- 34 Uno de los factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular es la personalidad tipo A. Respecto a ello ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?
- A: La terapia de modificación de conducta no es útil para reducir los episodios de isquemia.
 - B: La hostilidad incrementa la modulación parasimpática del ritmo cardíaco.
 - C: Los niveles de lípidos se incrementan con los conflictos interpersonales crónicos.
 - D: La hostilidad se asocia a descenso de catecolaminas circulantes.
- 35 En la confabulación es CIERTO que:
- A: El paciente a menudo es consciente de la existencia de un déficit de memoria.
 - B: Puede producirse de forma intencional para obtener una ganancia secundaria.
 - C: Existe un recuerdo recuperado verdadero a menudo acompañado de detalles biográficos falsos.
 - D: Existe una falsificación de la memoria en un estado de consciencia clara.
- 36 Señale la respuesta CORRECTA respecto a la clasificación de la discapacidad intelectual en el DSM-5:
- A: Es criterio necesario que el sujeto tenga un cociente intelectual (CI) por debajo de 2 desviaciones estándar respecto a la media.
 - B: Se ha determinado una categoría independiente para el funcionamiento intelectual límite, con criterios específicos.
 - C: Las especificaciones de gravedad son: leve, moderada y grave (que agrupa las categorías de grave y profundo de anteriores clasificaciones).
 - D: Se recomienda para la medición de las capacidades intelectuales el uso de pruebas neuropsicológicas en lugar de una única puntuación de CI.
- 37 ¿Cuál de estos fármacos sería a priori el MÁS indicado para el tratamiento de un niño diagnosticado de Trastorno Generalizado del Desarrollo con tics, insomnio, inquietud y problemas de atención?
- A: El metilfenidato.
 - B: La naltrexona.
 - C: La guanfacina.
 - D: La fenfluramina.
- 38 ¿Cuál de las siguientes aseveraciones respecto a la Terapia grupal interpersonal de Yalom es FALSA?
- A: Considera el grupo como un microcosmos social.
 - B: Lo que la distingue respecto a otros enfoques terapéuticos grupales es el aprendizaje interpersonal.
 - C: Se centra fundamentalmente en los hechos externos y los referidos al pasado del paciente.
 - D: Se basa en una teoría interpersonal de la psicopatología.

- 39 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la neurobiología de la esquizofrenia es FALSA?
- A: La disfunción de los movimientos del ojo (incapacidad para seguir con precisión un objeto móvil y la desinhibición de los movimientos oculares sacádicos) puede ser un marcador de estado para esta enfermedad.
 - B: Las técnicas de diagnóstico por imagen indican que la producción de los síntomas psicóticos positivos subyace en la disfunción del circuito talamocortical cingular anterior de los núcleos basales.
 - C: La disfunción del circuito prefrontal dorsolateral subyace en la producción de los síntomas negativos o deficitarios.
 - D: En los pacientes con esquizofrenia se ha comprobado que la respuesta en la onda P300 es estadísticamente inferior que en los grupos comparados.
- 40 La terapia de ambiente (Milieu Therapy) en los programas de rehabilitación incluye:
- A: Priorizar los derechos de los pacientes a definir sus objetivos terapéuticos en un clima de libertad y relaciones informales con el personal.
 - B: Priorizar equipos completos y pacientes con diagnósticos heterogéneos, que permitan conseguir una buena comunicación.
 - C: Priorizar las actividades físicas lo más parecidas a la vida diaria del paciente.
 - D: Priorizar el tratamiento bio psico social.
- 41 Señale la respuesta FALSA en relación a las diferencias entre Trastorno del espectro autista (TEA) y Esquizofrenia infantil (ESQZ-I):
- A: La incidencia del TEA es menor que la de la ESQZ-I.
 - B: Mayor preponderancia en varones en el TEA que en la ESQZ-I.
 - C: Complicaciones prenatales o perinatales aumentadas en los TEA respecto a la ESQZ-I.
 - D: Crisis de gran mal mayores en el TEA que en la ESQZ-I.
- 42 ¿Cuál de los siguientes elementos es MÁS importante para el diagnóstico de delirium?
- A: Electroencefalograma.
 - B: Presentación clínica.
 - C: Resonancia magnética.
 - D: Determinaciones analíticas
- 43 ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio de ingreso urgente en una adolescente con Anorexia Nerviosa (AN)?
- A: Sitiofobia manifiesta.
 - B: Índice de masa corporal por debajo de 14.
 - C: Riesgo de suicidio.
 - D: Niveles de potasio de 4,5 meq/l.
- 44 La coexistencia (comorbilidad) MÁS frecuente en el trastorno bipolar es:
- A: Accidentes, lesiones, mortalidad y morbilidad general
 - B: Somatizaciones, angustia, alcoholismo y estrés crónico
 - C: Ansiedad, enfermedades médicas y abuso de sustancias.
 - D: Paranoia, ansiedad, trastorno del sueño y alcoholismo

45 Respecto a la Clozapina ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A: Por su potente acción anticolinérgica y otros mecanismos fisiopatológicos como la disminución de la biodisponibilidad de acetil-colina en el lóbulo temporal, tienden a agravarse los déficit cognitivos en los pacientes con esquizofrenia a los que se les prescribe.
- B: Existen evidencias científicas de tener un efecto antisuicida.
- C: La aparición de síntomas obsesivo-compulsivos es uno de los efectos secundarios descritos.
- D: El litio ha sido de utilidad para tratar la neutropenia.

46 Señale, entre las siguientes, la proposición que considere FALSA sobre la ansiedad normal y patológica, según el modelo de Henri Ey:

- A: La angustia acompaña al hombre en el curso de su existencia.
- B: La angustia normal se explica cuantitativa y cualitativamente por el estímulo que la desencadena.
- C: La génesis de la angustia patológica es el mundo real.
- D: La angustia patológica es anacrónica, pues lleva a revivir situaciones pasadas.

47 ¿Cuáles son los trastornos cuyos mecanismos de defensa característicos son la escisión y la identificación proyectiva según la obra de Otto Kenberg?

- A: Trastornos obsesivo-compulsivos.
- B: Trastornos conversivos.
- C: Trastorno límite de la personalidad.
- D: Depresiones neuróticas.

48 ¿Que psicofármaco NO suele estar relacionado con las disfunciones sexuales?

- A: Fluoxetina.
- B: Clorimipramina.
- C: Valproato.
- D: Haloperidol.

49 ¿Qué es FALSO de lo siguiente sobre la sexualidad femenina?

- A: La anorgasmia es más frecuente en mujeres que en hombres.
- B: Entre las mujeres con disfunciones sexuales, más de un tercio de ellas han sido abusadas sexualmente de niñas.
- C: La falta de deseo sexual es la disfunción sexual más predominante en la mujer.
- D: La testosterona no juega ningún papel en la sexualidad femenina.

50 De los siguientes perfiles, señale el de MENOR riesgo de suicidio:

- A: Edad inferior a 45 años, casado, bebedor social, comunicación exteriorizada (ira), neurosis.
- B: Edad superior 45 años, contexto familiar conflictivo, abuso de sustancias, comunicación interiorizada (autoculpa).
- C: Edad inferior a 45 años, enfermedad crónica, múltiples tentativas, planificación, escasa sintonía social.
- D: Edad superior a 45 años, ideación suicida frecuente, intensa y prolongada, baja introspección.

51 En relación a las anomalías cromosómicas que pueden dar lugar al síndrome de Down, señale la respuesta INCORRECTA:

- A: La trisomía 21, a diferencia de las otras anomalías que producen el síndrome de Down, puede heredarse.
- B: El mosaicismo supone la presencia de células normales y células con trisomía en el mismo individuo.
- C: Otra forma de anomalía cromosómica es la fusión entre dos cromosomas, por lo general el 21 y el 15.
- D: El número resultante de cromosomas en pacientes que sufren este síndrome puede ser de 46 ó 47.

- 52 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA respecto a las alteraciones dermatológicas?
- A: No existen diferencias en cuanto a los niveles de ansiedad y depresión en pacientes con dermatitis atópica y controles.
 - B: La depresión comorbida aumenta el umbral para el prurito en los pacientes con psoriasis.
 - C: El estrés relacionado con la psoriasis tiene que ver más con las dificultades en las relaciones interpersonales que con la gravedad o cronicidad de la psoriasis.
 - D: Los varones con urticaria idiopática tienen mayores niveles de síntomas psiquiátricos que las mujeres con el mismo trastorno.
- 53 ¿Qué NO es importante para estar alerta ante el hecho de que un episodio depresivo se pueda convertir en el inicio de un trastorno bipolar?
- A: Que aparezca en el puerperio.
 - B: Que existan antecedentes familiares de trastorno bipolar.
 - C: Que curse con empeoramiento matutino del humor e insomnio de tercera fase.
 - D: Que la paciente sea multipara.
- 54 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es parte de la triada cognitiva de Beck de la depresión?
- A: Auto percepción negativa personal.
 - B: Percepción negativa del mundo.
 - C: Expectativa continua de dificultades futuras y pasadas.
 - D: Desesperanza.
- 55 En relación a los trastornos disociativos señale una característica INCORRECTA
- A: La disociación incluye la segregación de cualquier grupo de procesos mentales o comportamentales del resto de actividades psíquicas.
 - B: Pueden aparecer de manera repentina o gradual.
 - C: La evolución puede ser transitoria o tender a la cronicidad.
 - D: La autohipnosis se ha demostrado ineficaz en su abordaje terapéutico.
- 56 En relación a los efectos cardiológicos durante la aplicación de la terapia electroconvulsiva (TEC), señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El corazón está estresado fisiológicamente durante la TEC.
 - B: Al comienzo de la convulsión, predomina el tono parasimpático, causando a menudo bradicardia transitoria e hipotensión.
 - C: Las enfermedades cardiacas que pueden empeoran bajo el estímulo autonómico producido son la cardiopatía isquémica, al hipertensión, la insuficiencia cardiaca congestiva y las arritmias cardiacas.
 - D: La atropina, utilizada con frecuencia por los anestesiólogos en la TEC atraviesa la barrera hematoencefálica y puede exacerbar el delirio postictal.
- 57 Se entiende por ciclador rápido en el DSM 5 :
- A: Presencia de al menos cuatro episodios del estado de ánimo en los 12 meses anteriores que cumplen los criterios para episodio maníaco, hipomaníaco o de depresión mayor.
 - B: Presencia de al menos dos episodios del estado de ánimo en los 12 meses anteriores que cumplen los criterios para episodio maníaco, hipomaníaco o de depresión mayor.
 - C: Presencia de al menos dos episodios del estado de ánimo en los 6 meses anteriores que cumplen los criterios para episodio maníaco, hipomaníaco o de depresión mayor.
 - D: Presencia de al menos cuatro episodios del estado de ánimo en los 6 meses anteriores que cumplen los criterios para episodio maníaco, hipomaníaco o de depresión mayor.

- 58 Han mostrado eficacia como estabilizadora en depresión:
- A: Litio, gabapentina, topiramato y pregabalina.
 - B: Litio, valproato, carbamazepina y oxcarbacepina.
 - C: Litio valproato, oxcarbacepina y aripiprazol.
 - D: Litio, topiramato, quetiapina y pregabalina.
- 59 En un paciente con esquizofrenia, señale cual NO es un factor de riesgo para llevar a cabo acciones violentas:
- A: Antecedentes de actos violentos.
 - B: Sexo femenino.
 - C: Padecer delirios de carácter persecutorio.
 - D: Presentar déficits neurológicos.
- 60 ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA?
- A: La terapia de pareja frecuentemente es de tiempo limitado.
 - B: No se realiza terapia matrimonial de parejas en grupo.
 - C: La presencia de una dificultad relacional es una indicación clara para la terapia de pareja.
 - D: El deseo franco de uno de los dos conyuges de divorciarse es contraindicación para la terapia de pareja.
- 61 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: Los receptores GABA-A pueden unirse a alcohol.
 - B: Los receptores GABA-C son receptores ligados a proteína C.
 - C: Existen receptores GABA-A insensibles a las Benzodiazepinas.
 - D: Fármacos no benzodiazepínicos se pueden unir al receptor benzodiazepínico.
- 62 ¿En la clasificación DSM-5 qué dos trastornos de personalidad están también codificados en otros capítulos de la sección II?
- A: Antisocial y narcisista.
 - B: Esquizotípico y antisocial.
 - C: Narcisista y esquizotípico.
 - D: Esquizoide y antisocial.
- 63 Respecto a las Psicosis Cicloides ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?
- A: Las fases en las que dominan los sentimientos de felicidad cursan con ideas delirantes de tipo religioso sin alucinaciones.
 - B: Las fases de la psicosis de angustia/felicidad remiten con mas dificultad que las psicosis afectivas.
 - C: La psicosis confusional cursa con acinesia / hipercinesia.
 - D: En las fases de hipercinesia no existe casi expresión verbal.
- 64 El suicidio anómico descrito por Émile Durkheim se aplica a personas:
- A: Cuya integración en la sociedad está alterada hasta el punto de no poder seguir las normas de conducta.
 - B: Que son rechazadas por la sociedad.
 - C: Que no están bien integradas en ningún grupo social.
 - D: Que están excesivamente integradas en un grupo social.

- 65 Un paciente le comenta que ha comenzado un tratamiento psicológico, para ayudarlo a resolver una serie de problemas personales que han ocasionado un estado de ánimo depresivo. Dice que el psicólogo lo primero que hizo fue un análisis funcional. Parece claro que va a iniciar un tratamiento psicoterapéutico. ¿Con qué modelo?
- A: Terapia sistémica.
 - B: Terapia psicodinámica.
 - C: Terapia de conducta.
 - D: Terapia motivacional de Miller.
- 66 Se han descrito formas patológicas de amnesia y formas no patológicas de amnesia. De las siguientes señale una forma PATOLÓGICA:
- A: Amnesia disociativa selectiva.
 - B: Amnesia de la infancia y de la niñez.
 - C: Amnesia producida por el sueño.
 - D: Amnesia hipnótica.
- 67 Los pacientes con esquizofrenia y consumo concomitante de cocaína u otro estimulante presentan particularidades clínicas que es necesario conocer antes de elegir un tratamiento adecuado. De las siguientes respuestas señale la FALSA.
- A: En pacientes con consumo de cocaína o en tratamiento con metadona debe prestarse mayor atención al uso de antipsicóticos de primera generación por las alteraciones en intervalo QT y Torsade de Pointes que ambas situaciones provocan.
 - B: El disulfiram a dosis supratrapéutica podría desencadenar la aparición de síntomas psicóticos pero en las dosis habitualmente recomendadas parece un fármaco seguro en pacientes psicóticos duales.
 - C: Las benzodiazepinas son fármacos que por su perfil ansiolítico resultan de primera elección en los pacientes con esquizofrenia al inicio de su etapa de abstinencia de cocaína.
 - D: Estudios preclínicos con animales asocian el uso de antipsicóticos de primera generación con aumento de la autoadministración de psicoestimulantes como la cocaína y las anfetaminas.
- 68 ¿Quién es el autor de la importante obra de crítica epistemológica a la psiquiatría: "Historia de la locura en la época clásica"?
- A: Basaglia.
 - B: Goffman.
 - C: Foucault.
 - D: Laing.
- 69 ¿Cómo se llama la etapa evolutivamente MÁS avanzada de separación-individuación propuesta por Margaret Mahler?
- A: Diferenciación.
 - B: Práctica.
 - C: Acercamiento.
 - D: Constancia de objetos.
- 70 ¿Cuál de los siguientes factores estudiados en el desarrollo de trastorno conducta alimentaria (TCA) en varones es el MENOS frecuente de los encontrados en nuestro medio?
- A: Sobrepeso-obesidad.
 - B: Práctica deportiva.
 - C: Homosexualidad.
 - D: Comorbilidad psiquiátrica.

- 71 ¿En el tratamiento psicológico del insomnio la técnica de "intentar permanecer despierto tanto como sea posible en lugar de intentar conciliar el sueño, con el objetivo de disminuir la ansiedad por conciliarlo y mejorar la latencia del mismo" SE DENOMINA?
- A: Control de estímulos.
 - B: Técnicas de atribución y autotratamiento.
 - C: Terapia de restricción de sueño.
 - D: Intención paradójica.
- 72 Señale la respuesta INCORRECTA en relación a las reacciones fisiológicas que genera el estrés en el organismo:
- A: Los factores estresantes activan los sistemas noradrenérgicos centrales.
 - B: Los factores estresantes disminuyen la neurotransmisión dopaminérgica en vías mesofrontales.
 - C: El hipotálamo secreta factor liberador de corticotropina (CRF) generando liberación de hormona adrenocorticotropa (ACTH).
 - D: La activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS) puede generar una respuesta tanto de inhibición como de activación del sistema inmunitario.
- 73 Un varón de 38 años de edad, raza caucásica, soltero, sin actividad laboral en los últimos años, con antecedentes de 7 ingresos hospitalarios en los últimos 18 meses, alguno de ellos de larga duración, en 4 ciudades distintas con gran distancia kilométrica entre ellas y por causas médico quirúrgicas poco claras; ingresa nuevamente por cuadro de aparentes convulsiones. Al tercer día de ingreso, tras múltiples exploraciones y pruebas complementarias, se concluye que el paciente probablemente esté simulando el cuadro y se confronta con él de manera intensa. A las pocas horas inicia clínica psicótica genuina con ideación delirante florida y fenómenos sensorio-perceptivos de tipo auditivo. ¿Ante qué entidad es más probable que nos encontremos?
- A: Psicosis reactiva breve.
 - B: Trastorno de adaptación.
 - C: Trastorno facticio.
 - D: Trastorno de conversión.
- 74 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a los fármacos ansiolíticos e hipnóticos?
- A: La primera benzodiazepina comercializada fue el diazepam introducido en 1959.
 - B: El clorazepato se convierte en el estómago en desmetildiazepam que es completamente absorbido.
 - C: La duración del efecto clínico de la benzodiazepina está influida por la liposolubilidad del fármaco.
 - D: Zolpidem no tiene metabolitos activos.
- 75 ¿Cuál fue el MÁS prevalente entre los trastornos psiquiátricos estudiados en el Estudio Comunitario Epidemiologic Catchment Area (ECA) de USA?
- A: Ataques de pánico.
 - B: Fobia.
 - C: Abuso de alcohol.
 - D: Depresión mayor.
- 76 Respecto la risperidona ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: Puede utilizarse en adolescentes.
 - B: Su vida media corta aconseja prescribirla en dos tomas al día.
 - C: Su afinidad por los receptores alfa-adrenérgicos y muscarínicos es baja.
 - D: Dentro de sus efectos secundarios se incluye el aumento de la pigmentación.

- 77 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA respecto a la genética de la esquizofrenia?
- A: Con un familiar de primer rango que tenga la enfermedad se tiene un 30% de riesgo de tener dicha enfermedad.
 - B: Los signos neurológicos menores se relacionan con cierta predisposición a la enfermedad.
 - C: La heredabilidad a la esquizofrenia tiene un patrón mendeliano recesivo.
 - D: La concordancia entre gemelos monocigóticos es superior al 80%.
- 78 De las siguientes afirmaciones, señale la que es FALSA:
- A: La psicopatología paterna es un factor de riesgo de sufrir ansiedad en los niños.
 - B: El mutismo selectivo afecta más a los varones.
 - C: La ansiedad de separación es un factor de riesgo de la agorafobia en la vida adulta.
 - D: La fobia escolar no se suele acompañar de comportamientos antisociales.
- 79 En el trastorno depresivo persistente (distimia), señale la respuesta CORRECTA:
- A: Los antecedentes familiares de trastornos depresivos y bipolares en pacientes con distimia apoyan su vinculación a los trastornos primarios del estado de ánimo.
 - B: No se ha demostrado en pacientes con distimia disminución de la latencia REM.
 - C: Los criterios diagnósticos de distimia del DSM-5 para adultos exigen la presencia de estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo al menos 1 año.
 - D: En la combinación denominada depresión doble (pacientes con trastorno depresivo mayor que cumplen criterios de trastorno depresivo persistente) no se ha demostrado un peor pronóstico que en el trastorno depresivo mayor.
- 80 En relación a la neurobiología de la enfermedad de Alzheimer (EA), indique la respuesta CORRECTA:
- A: No se ha encontrado correlación entre el número de placas seniles y la gravedad de la enfermedad.
 - B: Las placas seniles indican, con mayor solidez que los ovillos neurofibrilares, la presencia de EA.
 - C: Los ovillos neurofibrilares se localizan en el espacio interneuronal y están compuestos de proteína beta-amiloide.
 - D: El principal componente de las placas seniles es la proteína tau fosforilada.
- 81 Una estudiante de enfermería reconoce tener mucho miedo a las arañas desde que era niña, por este motivo se siente incomoda en el campo y ha llegado a rechazar viajes, ante la posibilidad de encontrar insectos. ¿Qué tratamiento resultaría más eficaz?
- A: Terapia interpersonal.
 - B: Inhibidor selectivo de recaptación de serotonina (ISRS).
 - C: Exposición.
 - D: Abordaje psicodinámico.
- 82 ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico psiquiátrico coexistente más común entre personas con antecedentes de exposición prenatal significativa al alcohol?
- A: Trastorno por consumo de sustancias.
 - B: Esquizofrenia.
 - C: Trastorno por déficit de atención/hiperactividad.
 - D: Trastorno depresivo recurrente.

- 83 Uno de los siguientes principios activos, NO es causa de ansiedad químicamente inducida:
- A: Metilendioximetanfetamina (MDMA).
 - B: Dietilamida del ácido lisérgico (LSD).
 - C: *Hipericum perforatum* (Yerba de San Juan).
 - D: *Valeriana officinalis*.
- 84 En relación a atomoxetina, señale la respuesta CORRECTA:
- A: Ejerce sus efectos terapéuticos a través de la inhibición selectiva del transportador presináptico de noradrenalina.
 - B: Es un fármaco estimulante con indicación en el trastorno por déficit de atención (TDAH) de niños, adolescentes y adultos.
 - C: La utilización junto a fármacos como fluoxetina que inhiben la isoenzima CYP2D6 no causa incremento en las concentraciones de atomoxetina.
 - D: Tiene potencial de abuso por lo que es inadecuado su uso en pacientes con TDAH y abuso de sustancias.
- 85 Bowen es un psicoterapeuta sistémico con un abordaje:
- A: Estratégico.
 - B: Psicoeducativo.
 - C: Estructural.
 - D: Intergeneracional.
- 86 El tratamiento farmacológico breve en trastorno adaptativos depende fundamentalmente de:
- A: Agregación de psicopatología en la familia.
 - B: Tipo de síntomas clínicos.
 - C: Respuestas previas a psicofármacos.
 - D: Autonomía del paciente, eligiendo lo que cree que le ira mejor.
- 87 Dentro de las indicaciones secundarias de la terapia electroconvulsiva (TEC), NO estaría:
- A: Epilepsia refractaria.
 - B: Síndrome neuroléptico maligno.
 - C: TOC refractario.
 - D: Enfermedad de Parkinson.
- 88 En las escalas de evaluación psiquiátrica, la propiedad psicométrica que hace referencia a la consistencia o reproducibilidad de las valoraciones se le denomina:
- A: Consistencia interna.
 - B: Fiabilidad.
 - C: Validez aparente.
 - D: Validez de constructo.

- 89 Un paciente relata con lujo de detalles la parasitación de cada persona por un animal (que denomina "intermitario") que le une a un astro. Cuando una persona no está parasitada por el "intermitario" que le corresponde o su unión astral no es la adecuada, da en la locura. El habla dos idiomas, lo que achaca al hecho de estar parasitado (y consecuentemente loco) por un "intermitario" extranjero. De este paciente definiríamos específicamente su contenido delirante como:
- A: Nihilista.
 - B: Transítivista.
 - C: Mesjánico.
 - D: Fantástico.
- 90 En relación a estudios epidemiológicos amplios realizados a nivel internacional, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El proyecto NIMH-ECA (Encuesta del National Institute of Mental Health Epidemiologic Catchment Area) es un amplio estudio de base poblacional, desarrollado en EEUU en los años 80, que aportó datos sobre la prevalencia de los distintos trastornos mentales.
 - B: El NCS (National Comorbidity Survey) se realizó en los años 90, y las entrevistas fueron administradas por personal no médico a una muestra representativa de personas que residían en 34 estados de EEUU.
 - C: El NCS-Replication Survey se llevó a cabo entre 2001-2003 con el mismo diseño que su predecesor.
 - D: El ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) es un estudio epidemiológico europeo de tipo longitudinal, auspiciado por la OMS, para valorar la presencia de trastornos mentales, su gravedad y la discapacidad debida a enfermedad mental.
- 91 ¿Cuál de los siguientes no es un trastorno relacionado con el alcohol en el DSM-5?
- A: Dependencia del alcohol.
 - B: Disfunción sexual inducida por alcohol.
 - C: Trastorno por consumo de alcohol.
 - D: Intoxicación por alcohol.
- 92 En relación a la psicoterapia de apoyo es CIERTO que:
- A: Dirige su mayor énfasis etiológico hacia acontecimientos externos más que a cuestiones intrapsíquicas.
 - B: Sólo se aplica como tratamiento auxiliar.
 - C: Está contraindicada en individuos en crisis agudas.
 - D: No genera experiencias emocionales correctoras.
- 93 Diferentes autores describen diferentes procesos según su perspectiva en las teorías del desarrollo humano. Una de las siguientes interrelaciones autor-teoría es FALSA:
- A: Margaret Mahler — separación individuación.
 - B: Jean Piaget — permanencia objetal.
 - C: Erik Erikson — confianza frente a desconfianza básicas.
 - D: Donald Winnicot — situación extraña.
- 94 Las alucinosis son esencialmente típicas
- A: De la esquizofrenia hebefrénica.
 - B: De los cuadros afectivos bipolares.
 - C: Del alcoholismo.
 - D: De la infancia.

- 95 Respecto el diagnóstico etiológico de las demencias y las pruebas de neuroimagen ¿qué afirmación de las siguientes es FALSA?
- A: La enfermedad de Alzheimer tiene una apariencia característica en la neuroimagen estática.
 - B: Se requiere técnicas de neuroimagen para el diagnóstico de la hidrocefalia normotensiva.
 - C: La Resonancia Magnética es más sensible para captar lesiones vasculares de sustancia blanca que la Tomografía Axial Computerizada.
 - D: En la Corea de Huntington suele observarse atrofia del núcleo caudado.
- 96 Respecto a la cleptomanía, señale la respuesta FALSA:
- A: Se produce en cerca del 4-24% de los individuos detenidos por robar en tiendas.
 - B: Misma proporción por sexos.
 - C: Se han descrito tres cursos: esporádico, episódico y crónico.
 - D: El paciente presenta fracaso recurrente para resistir el impulso de robar.
- 97 La rehabilitación en psiquiatría pretende específicamente:
- A: Mantener al paciente con el mínimo tratamiento y libre de síntomas.
 - B: Ayudar a las familias en los problemas de la vida diaria.
 - C: Dar soporte ocupacional y ayuda continuada ante las dificultades y discapacidad funcional propia de la enfermedad.
 - D: Vivir independiente, completar escolaridad, conseguir trabajo normalizado, elegir amigos y familia.
- 98 Entre los componentes de la acatisia NO figura:
- A: Tirones o sensaciones parestésicas y desagradables en los músculos de las piernas.
 - B: Agitación o disforia.
 - C: Sensación de inquietud interior.
 - D: Discinesia tardía.
- 99 Señale la respuesta CORRECTA en relación a la actividad del eje tiroideo en la depresión:
- A: El 50% de los casos evaluados por depresión tiene una disfunción tiroidea no detectada previamente.
 - B: La presencia de concentraciones elevadas de TSH basales o el aumento de TSH en respuesta a estimulación con TRH no tiene implicaciones sobre la necesidad de terapia hormonal sustitutiva.
 - C: La respuesta truncada de la TSH a la provocación con TRH implica el aumento del riesgo de recidiva a pesar del tratamiento antidepresivo preventivo.
 - D: La respuesta truncada de la TSH a la TRH se normaliza con el tratamiento antidepresivo.
- 100 En el tratamiento de la depresión moderada-grave, según la Guía de Práctica Clínica de GuíaSalud sobre el manejo de la depresión en el adulto, las psicoterapias de elección por alcanzar mayores niveles de evidencia en los estudios al respecto son:
- A: Solución de problemas y cognitivo conductual.
 - B: Psicodinámica breve y cognitivo conductual.
 - C: Cognitivo conductual e interpersonal.
 - D: Interpersonal y solución de problemas.
- 101 Respecto a los planteamientos éticos es CIERTO:
- A: Los aspectos ideológicos pueden ofuscar el propio juicio y conducir a falta de ética.
 - B: La confidencialidad está por encima del riesgo de dejar a un médico trabajar cuando esta situación entraña riesgo a terceros.
 - C: Se puede negar la atención a un paciente por motivos de credo, raza, u origen de nacimiento.
 - D: Las relaciones de negocios con antiguos pacientes no son problemáticas.

- 102 La etiología de la hipersomnia idiopática es desconocida; no obstante se han desarrollado las siguientes categorías diagnósticas. Son todas las siguientes MENOS UNA; ¿a cuál nos referimos?
- A: Individuos que son HLA-Cw2 positivos y otros miembros de la familia afectados.
 - B: Individuos que tienen anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado (Anti-CCP) y otros miembros de la familia afectados,
 - C: Individuos con infección vírica previa (p.ej. síndrome de Guillain-Barre; mononucleosis; neumonía atípica).
 - D: Hipersomnia idiopática sin antecedentes familiares, ni víricos, es decir, la forma verdaderamente idiopática.
- 103 A Donald Winnicott se le atribuye la descripción de:
- A: Objeto transicional.
 - B: Permanencia objetal.
 - C: Sonrisa social.
 - D: Constancia objetal.
- 104 Madre de adolescente de 17 años que acude a consulta sola porque su hijo no ha querido venir. Se muestra preocupada por su hijo porque, aunque nunca fue un buen estudiante, desde hace 3 años ha dejado casi por completo de estudiar. Además cada vez sale más días de fiesta con los amigos y ha decidido acudir a consulta porque desde hace un tiempo cree que puede estar tomando drogas. Lo ha notado porque su hijo presenta un sueño muy irregular. Los fines de semana apenas pasa por casa y sabe que no duerme, como mucho un par de horas por las tardes. Pero entre semana, sobre todo lunes, martes y miércoles duerme todo el día siéndole difícil, a ella, despertarle para que tan siquiera coma ¿Qué tipo de droga explica mejor la sintomatología?
- A: Cannabis
 - B: Alcohol
 - C: Opiáceos
 - D: Anfetaminas
- 105 En el tratamiento del síndrome de fatiga crónica, ¿cuál de los siguientes NO ha demostrado utilidad?
- A: Bupropion.
 - B: Terapia cognitivo conductual.
 - C: Metilfenidato.
 - D: Aripiprazol.
- 106 La capacidad de almacenar información durante varios segundos, mientras se llevan a cabo otras operaciones cognitivas relacionadas con esta información se denomina:
- A: Memoria semántica
 - B: Memoria procedimental
 - C: Memoria episódica
 - D: Memoria de trabajo
- 107 En relación al uso de disulfiram señale la respuesta CORRECTA:
- A: La reacción disulfiram-alcohol se debe al incremento de la concentración sanguínea de acetaldehído.
 - B: La reacción disulfiram-alcohol suele aparecer transcurridas 6-8 horas de la última ingesta de alcohol.
 - C: En la reacción disulfiram-alcohol aparecen reacciones adversas como rubefacción, sudoración, cefalea y síntomas gastrointestinales transitorios, por lo que su uso no está contraindicado en personas con cardiopatías graves.
 - D: No se ha descrito exacerbación de psicosis en pacientes psicóticos en tratamiento con disulfiram en ausencia de consumo de alcohol.

- 108** El diagnóstico diferencial entre el Trastorno facticio y el Trastorno de personalidad antisocial es en ocasiones complejo. Señale la CORRECTA:
- A: El trastorno antisocial tiende a presentar mentiras patológicas, el trastorno facticio no.
 - B: El trastorno antisocial no suele someterse voluntariamente a procedimientos cruentos, el trastorno facticio sí.
 - C: El trastorno antisocial suele tener falta de relaciones estrechas con otras personas, el trastorno facticio no.
 - D: El trastorno facticio asocia con frecuencia consumo perjudicial de tóxicos, el trastorno antisocial no.
- 109** ¿Cuál de los siguientes NO pertenece a los principios generales de la Psiquiatría Comunitaria planteados por Bachrach y Hanson?
- A: La prevención de las admisiones inapropiadas en los hospitales exclusivamente de enfermos mentales.
 - B: La integración en la comunidad de todos los pacientes institucionalizados contando con la debida preparación para este cambio (p. ej., recursos familiares, sociales, sanitarios, etc.).
 - C: Disminuir el gasto derivado de los Hospitales Psiquiátricos.
 - D: El diseño y el mantenimiento de sistemas de apoyo comunitario que reduzcan la tendencia a la institucionalización.
- 110** Las etapas del ciclo vital familiar en terapia sistémica son:
- A: Nacimiento, juventud, adulto y final de la vida.
 - B: Adolescencia, pareja, abandono de la familia de los hijos, vejez.
 - C: Adultos jóvenes solteros, pareja sin hijos, pareja con hijos pequeños, familias con adolescentes, abandono de los hijos y seguir adelante, familias al final de su vida.
 - D: Adolescentes, adultos jóvenes solteros, unión de familias a través del matrimonio, familias con hijos pequeños, familias con adolescentes, los hijos se independizan, vejez.

**FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA DE PSIQUIATRIA DEL
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
RESPUESTAS VÁLIDAS DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN**

Pregunta:	Respuesta:	Pregunta:	Respuesta:	Pregunta:	Respuesta:	Pregunta:	Respuesta:
1	A	38	C	75	B		
2	B	39	A	76	B		
3	A	40	A	77	B		
4	C	41	A	78	B		
5	C	42	B	79	A		
6	A	43	D	80	B		
7	C	44	C	81	C		
8	B	45	A	82	C		
9	B	46	C	83	D		
10	D	47	C	84	A		
11	D	48	C	85	D		
12	C	49	D	86	B		
13	C	50	A	87	C		
14	A	51	A	88	B		
15	D	52	C	89	D		
16	B	53	D	90	D		
17	C	54	D	91	A		
18	B	55	D	92	A		
19	D	56	B	93	D		
20	A	57	A	94	C		
21	D	58	B	95	A		
22	C	59	B	96	B		
23	C	60	B	97	D		
24	B	61	B	98	D		
25	C	62	B	99	C		
26	A	63	D	100	C		
27	B	64	A	101	A		
28	D	65	C	102	B		
29	B	66	A	103	A		
30	C	67	C	104	D		
31	D	68	C	105	D		
32	D	69	D	106	D		
33	D	70	C	107	A		
34	C	71	D	108	B		
35	D	72	B	109	C		
36	D	73	C	110	C		
37	C	74	A				

PRESIDENTE

MVVILLAVERDE

SECRETARIO

MAQUINTANA

Plazo de impugnación: tres días hábiles a partir de la publicación
viernes, 16 / marzo / 2018

