

# **Indicador Admisiones a Tratamiento por Consumo de Sustancias Psicoactivas Resumen Datos Aragón 2012**

Dirección General de Salud Pública  
Servicio de Drogodependencia  
y Vigilancia en Salud Pública

## ÍNDICE GRÁFICOS AÑO 2012

DISTRIBUCIÓN POR EDAD.....	4
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	4
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA .....	5
DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA.....	6
DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS .....	7
DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE .....	8
DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y POR PROVINCIA DE ASISTENCIA .....	9
DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO.....	9
SITUACIÓN DE CONVIVENCIA.....	10
DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA .....	10
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA .....	11
DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA. 2011.....	12
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA.....	13
VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL .....	14
SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA.....	15

Los inicios de tratamiento notificados durante 2012 en la Comunidad Autónoma de Aragón han sido 1.586, el 82,3 % de las admisiones a tratamiento corresponde a hombres y el 17,7 % a mujeres.

## DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Aragón, 2012

GRUPO EDAD	Total	%
14 y <	165	10,41
15 a 20 años	205	12,93
21 a 30 años	370	23,34
31 a 40 años	427	26,94
41 a 50 años	292	18,42
51 a 60 años	107	6,75
61 y >	19	1,20
NC	0	0,00

## DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Aragón, 2012

GRUPO EDAD	Hombre	%	MUJERES	%
14 y <	132	10,11	41	11,83
15 a 20 años	180	13,78	38	8,96
21 a 30 años	310	23,74	79	21,51
31 a 40 años	347	26,57	103	28,67
41 a 50 años	229	17,53	64	22,58
51 a 60 años	91	6,97	24	5,73
61 y >	17	1,30	4	0,72
TOTAL	1306	100%	279	100%

Los inicios de tratamiento entre los jóvenes de 14 a 20 constituyeron el 23,4 %. El grupo de edad de 21 a 40 años representó el mayor porcentaje de inicios de tratamiento con un 50,3 %.

## DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2012

Grupo edad	Total	Alcohol	Anfetaminas	Benzodiac.	Cannabis	Cocaína	Heroína	Otros opioides
14 y <	165	10	2		151	2		
15 a 20 años	205	17	14		142	27	4	1
21 a 30 años	370	98	45		57	129	38	3
31 a 40 años	427	207	12	1	31	90	78	7
41 a 50 años	292	210	4	2	9	20	35	12
51 a 60 años	107	102		1	1	2	1	
61 y >	19	19						
NC	0							

Si analizamos los datos en relación con las sustancias consumidas, observamos que los jóvenes de 14 a 20 años iniciaron tratamiento en un 79,2% por consumo de cannabis (66,9% en 2011 y 73% en 2010), seguido por consumo de cocaína 7,8 % (14,17% en 2011 y 10,18% en 2010), consumo de alcohol 7,3 % (4,7% en 2011) y por consumo de anfetaminas 4,3 % (9,9% en 2011 y 5,75% en 2010).

Entre los jóvenes de 21 a 30 años la droga por la que se iniciaron más tratamientos fue la cocaína con un 34,9 % (38,6% en 2011 y 39,5% en 2010), seguido de alcohol con un 26,5% (21,2% en 2011 y 23,6% en 2010) y cannabis 15,4% junto con anfetaminas (12,2%) y heroína (10,3%).

Entre los 31-40 años el mayor porcentaje de tratamientos iniciados fue por abuso de alcohol 48,5% (41,9% en 2011 y 42,86% en 2010) seguido por consumo de cocaína 21 % (28% en 2011 y 26,85% en 2010), heroína más otros opiáceos 19,9% (22,7% en 2011 y 25,56% en 2010).


El grupo de edad entre 41-50 años, inició tratamiento en el 71,9% de los casos por alcohol (61,35% en 2011 y 73,23% en 2010), seguido de heroína y otros opiáceos con un 16,1% (22,4% en 2011 y 14,70% en 2010) y de cocaína con un 6,8% (12,6% en 2011 y 9,45% en 2010).

El 95,3% de los inicios de tratamiento para el grupo de edad comprendido entre los 51 a 60 años se produce por consumo de alcohol (87,8% en 2011 y 89,5% en 2010), el resto de sustancias (benzodiazepinas, cannabis, cocaína y heroína) sólo suman un 4,7%.

Los inicios de tratamiento para el grupo de edad de 61 y más que suponen un 1 % del total de tratamientos iniciados, el 100 % de los casos fue por consumo de alcohol, como ya sucedió en 2011.

## DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2012




Sustancia	Total	Hombre	%	Mujer	%
Alcohol	664	515	32,47	149	9,39
Anfetaminas	77	61	3,85	16	1,01
Benzodiacepinas	4	2	0,13	2	0,13
Cannabis	392	335	21,12	57	3,59
Cocaína	270	241	15,20	29	1,83
Heroína	156	131	8,26	25	1,58
Otros opioides	23	21	1,32	2	0,13
	1586	1306	82,35	280	17,65

Los hombres iniciaron tratamiento durante 2012 en primer lugar por alcohol con 39,4%, seguido por cannabis con un 25,65 %, por cocaína con un 18,45% y opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 11,64 %.

Con respecto a las mujeres, iniciaron tratamiento un 53,21% por alcohol, seguido por cannabis con un 20,36%, cocaína con un 10,36 % y los opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 9,64%.

## DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS

Aragón, 2012



Grupo sustancia	Total	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alcohol	664	123	115	426
Anfetaminas	77	16	1	60
Benzodiacepinas	4	0	0	4
Cannabis	392	50	63	279
Cocaína	270	39	54	177
Heroína	156	14	19	123
Otros opioides	23	5	5	13
	<b>1586</b>	<b>247</b>	<b>257</b>	<b>1082</b>


Del total de Admisiones a Tratamiento, las correspondientes a Huesca representan un 15,57%, las de Teruel un 16,20% y las de Zaragoza un 68,22%, del total de Aragón.

Los tratamientos por alcohol han supuesto el mayor porcentaje en el conjunto de Aragón con un 41,86%, seguidos de cannabis con un 24,71%, de estimulantes (cocaína, anfetaminas) con un 14,9% y opiáceos (heroína más otros opiáceos) 8,57%.

Si observamos los datos por provincias, las diferencias fundamentales las encontramos en los inicios de tratamiento por alcohol (Huesca: 49,8%; Teruel: 44,75% y Zaragoza: 39,37%), por cocaína (Huesca 15,8%; Teruel 21% y Zaragoza 16,36%) y por heroína (Huesca: 5,67%; Teruel: 7,39%; Zaragoza: 11,37%).


## DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE

Aragón, 2012



## DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y POR PROVINCIA DE ASISTENCIA

Aragón, 2012



En cuanto al número de extranjeros que han iniciado tratamiento, no se han producido modificaciones reseñables, Zaragoza sigue siendo la provincia en la que se atiende el mayor número de estos pacientes.

## DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO

Aragón, 2012

PROCEDENCIA	TOTAL	%
Desconocido	11	0,69
Familiares/Amigos	296	18,65
Iniciativa propia	446	28,10
Otro servicio drogas	100	6,30
Otros	58	3,65
Prisión/Judicial	152	9,58
Servicios sanitarios	451	28,42
Servicios sociales	73	4,60

Como viene ocurriendo en años anteriores, los pacientes que inician tratamiento, llegan a los centros en la mayoría de las ocasiones a través de familiares y amigos o por iniciativa propia (18,65 % y 28,10 %) en un total del 46,75 % de los casos. En el 28,42% de los casos,



los pacientes llegan a los centros a través de Servicios sanitarios. El 4,6% procede de Servicios sociales y el 6,3 % procede de Otros servicios de drogas.

## SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

Aragón, 2012

Convivencia	Total	%
Solo/a	207	13,04
Únicamente con pareja	183	11,53
Únicamente con hijos/as	39	2,46
Con la pareja e hijos/as	315	19,85
Con padres o familia de origen	651	41,02
Con amigos/as	26	1,64
Otras	100	6,30

El 41% de pacientes vivían con padres o familia de origen en los treinta días anteriores al inicio de tratamiento. El 19,85% de los pacientes vivían con la pareja e hijos/as y el 13,04 % vivían solos/as.

## DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA


Aragón, 2012

Nombre	Total	%
Alojamiento inestable/precario	16	1,01
Casas, pisos, apartamento	1480	93,26
Desconocida	14	0,88
Otras instituciones	22	1,39
Otro lugar	36	2,27
Pensiones, hoteles, hostales	9	0,57
Prisión, centro de reforma o de internamiento cerrado para menores	10	0,63

En 2012 el 93,26% de los pacientes declaran haber vivido en casas, pisos o apartamentos en los treinta días antes de iniciar tratamiento. El porcentaje de personas que procedían de prisión o de centro de reforma para menores es de 2,02%.

## DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2012




Sustancia	Total	Descon.	No lee/escr	Otros	Primarios	Secundarios	Univ. Medio	Univ. Sup.
Alcohol	664	24	4	2	231	346	34	23
Anfetaminas	77				28	44	4	1
Benzodiacepinas	4				1	3		
Cannabis	392	13	1		146	217	6	9
Cocaína	270	13	2		84	157	12	2
Heroína	156	7	1	1	75	66	4	2
Otros opioides	23	5			9	7		2

El 35% de pacientes tienen estudios primarios y el 52 % secundarios, en torno al 8% tienen estudios universitarios.

## DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2012




Sustancia	Total	Trabajando	Parado	Otras	Incap. P	Estudiante	Descon.
Alcohol	664	258	234	43	99	9	21
Anfetaminas	77	33	34	2	2	5	1
Benzodiazepinas	4		2	1	1		
Cannabis	392	51	113	3	16	192	17
Cocaína	270	132	104	9	5	7	13
Heroína	156	35	77	22	15		7
Otros opioides	23	5	11	3	2		2

Del total de los pacientes que iniciaron tratamiento en 2012, el 40 % se encontraba trabajando, el 35% parado, el 1% estudiando. El 15% se encontraba en situación de incapacidad o pensionista.

## REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA

Aragón, 2012




Grupo sustancia	Sí	%	No	%	Descon.	%	Total
Alcohol	306	46,08	313	47,14	45	6,78	664
Anfetaminas	26	33,77	47	61,04	4	5,19	77
Benzodiazepinas	2	50,00	2	50,00		0,00	4
Cannabis	94	23,98	221	56,38	77	19,64	392
Cocaína	125	46,30	129	47,78	16	5,93	270
Heroína	132	84,62	20	12,82	4	2,56	156
Otros opioides	21	91,30	2	8,70		0,00	23

Para los que consumían alcohol era el primer tratamiento en un 46,08% de los casos (47,14% habían recibido previamente y en un 6,78% se desconoce el dato). Para los que iniciaron tratamiento por consumo de cocaína era el primero en un 46,30% y por consumo de cannabis realizaban el primer tratamiento el 56,38 % de los casos notificados.

## VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL

Aragón, 2012



Grupo sustancia	Total	Desconocida	Esnifada	Oral	Parenteral	Pulmonar o fumada
Alcohol	664	2		659	1	2
Anfetaminas	77	2	67	8		
Benzodiacepinas	4			4		
Cannabis	392	22	10	13		347
Cocaína	270	2	249	5	3	11
Heroína	156	2	15	1	47	91
Otros opioides	23	6	1	10	2	4

Un 3% del total de los inicios realizados en 2012 continúa usando la vía parenteral. El 88,50 % de los consumidores de cannabis toman la sustancia por vía pulmonar o fumada.

## SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2012

Sustancia	Total	Sin prueba	Positivo	Negativo	Desconocido
Alcohol	664	438	3	113	110
Anfetaminas	77	48		11	18
Benzodiacepinas	4	3	1		
Cannabis	392	333		14	45
Cocaína	270	154	4	61	51
Heroína	156	45	24	74	13
Otros opioides	23	6	5	8	4

El 79,95 % no tiene prueba para determinación de anticuerpos VIH (64,75%) o es desconocida (15,20%). El 78,38 % de los resultados positivos corresponde a personas que iniciaron tratamiento por consumo de opiáceos (heroína más otros opiáceos).

De la serología conocida (318 inicios de tratamiento), un 88,36 % es negativo y un 11,64 % positivo.

