

Observatorio español sobre drogas
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS
(ESTUDES)
DEL AÑO 2010

ESTUDES 2010

INFORME DE RESULTADOS
ALUMNOS

Aragón

Septiembre de 2011

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. OBJETIVOS DE ESTUDES	6
1.2. METODOLOGÍA	7
2. RESUMEN	11
3. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS	22
3.1. TABACO	22
3.2. ALCOHOL.....	31
3.3. CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES.....	40
3.4. TRANQUILIZANTES.....	43
3.5. CANNABIS	48
3.6. COCAÍNA.....	53
3.7. HEROÍNA.....	60
3.8. SPEED/ANFETAMINAS	62
3.9. ALUCINÓGENOS.....	65
3.10. INHALABLES VOLÁTILES.....	68
3.11. ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO.....	71
3.12. GHB.....	74
3.13. POLICONSUMO	76
3.14. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS	79
3.15. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA	81
3.16. CANNABIS: PATRONES DE CONSUMO RELEVANTES	83
4. OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS	86
4.1. RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO	86
4.2. DISPONIBILIDAD PERCIBIDA	90
5. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS.....	91
6. ENTORNO SOCIAL.....	94
7. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES	102
8. NUEVAS SUSTANCIAS.....	112
8.1. KETAMINA	114
8.2. SPICE	117
8.3. PIPERAZINAS	120

8.4. MEFEDRONA.....	123
8.5. NEXUS	126
8.6. METANFETAMINAS.....	129
8.7. SETAS MÁGICAS.....	132
8.8. RESEARCH CHEMICALS	135
8.9. LEGAL HIGHS.....	138

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha promovido la ejecución de la Encuesta ESTUDES correspondiente al año 2010.

ESTUDES es una de las operaciones estadísticas de referencia a la hora de conocer determinados aspectos del consumo de drogas entre los jóvenes españoles escolarizados. Se enmarca en la serie de encuestas que han venido realizándose en España de forma bienal desde 1994 con el objetivo de conocer la prevalencia de consumo, las tendencias y actitudes hacia el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan enseñanzas secundarias. Esta larga trayectoria permite contar con información de relevancia acerca de la evolución del consumo en España. En la medida en que su metodología y cuestionario son similares a los de otros países de la Unión Europea y de Estados Unidos, permite igualmente realizar comparaciones internacionales.

Estudes 2010 y sus ediciones precedentes son financiadas y promovidas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y han contado con la colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas (Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación) y del Ministerio de Educación y Ciencia.

Estudes recoge la información sobre los alumnos de Enseñanza Secundaria que cursan:

- ❖ 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
- ❖ 1º y 2º de Bachillerato
- ❖ 1º y 2º de Ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional Específica.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas promovió la realización y ejecución de ESTUDES 2010 a nivel nacional. La Comunidad de Aragón, por su parte, ha respaldado la obtención de una muestra mayor en su territorio, que le permitiese la

consideración de los resultados con un mayor nivel de fiabilidad estadística, respondiendo a idénticos parámetros técnicos y metodológicos que la recogida a nivel nacional.

Los casos relativos a esta ampliación muestral se añaden a las entrevistas realizadas en Aragón para la Encuesta Nacional ESTUDES 2010. De este modo, la muestra que respalda la información vertida en el presente informe totaliza 2.609 casos.

1.1. OBJETIVOS DE ESTUDES

El objetivo general de Estudes es conocer de forma periódica la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio a nivel estatal, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados.

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

- a) Estimar la prevalencia de consumo de las distintas sustancias.
- b) Estimar los patrones de consumo y las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas: oferta y accesibilidad (especialmente disponibilidad percibida) y consumo (especialmente riesgo percibido ante diversas conductas de consumo).
- d) Conocer el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

En el cuestionario de Estudes 2010 se han introducido objetivos orientados a determinar la incidencia del consumo de las denominadas “nuevas sustancias” y a escalas internacionales comparativas de consumo de cannabis.

1.2. METODOLOGÍA

La Encuesta Estudes se aplicó a los estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años que cursan sus estudios en una selección de centros educativos públicos y privados de toda España. La distribución de la muestra atiende a criterios de proporcionalidad entre el número de alumnos que cursan estudios de Secundaria en cada Comunidad Autónoma y la titularidad del centro. Partiendo de una estratificación previa de las unidades de primera etapa según Comunidad Autónoma (incluyendo Ceuta y Melilla) y según titularidad del centro educativo (pública-privada), la asignación de la muestra según Comunidad Autónoma ha sido proporcional a la raíz cuadrada del universo de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años del curso 2009/2010 de cada una de las comunidades. Por su parte, dentro de cada Comunidad Autónoma la asignación muestral por titularidad de centro ha sido proporcional al número de estudiantes en cada titularidad.

**DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTAS SEGÚN SEXO, TITULARIDAD Y TIPO DE ESTUDIOS.
TOTAL NACIONAL Y CCAA DE ARAGÓN.**

CURSO ESCOLAR 2009-2010	TOTAL UNIVERSO (estudiantes 14-18 años)	NÚMERO REAL DE ENTREVISTAS POR SEXO			ENTREVISTAS EN MUESTRA (1) POR SEXO		
		H	M	T	H	M	T
ARAGÓN	39.317	1.284	1.325	2.609	1.286	1.324	2.610
TOTAL NACIONAL	1.485.883	15.646	16.572	32.218	15.594	16.376	31.967

CURSO ESCOLAR 2009-2010	TOTAL UNIVERSO (estudiantes 14-18 años)	NÚMERO REAL DE ENTREVISTAS POR TITULARIDAD			ENTREVISTAS EN MUESTRA (1) POR TITULARIDAD		
		Público	Privado	TOTAL	Público	Privado	TOTAL
ARAGÓN	39.317	1.616	993	2.609	1.699	911	2.610
TOTAL NACIONAL	1.485.883	21.444	10.774	32.218	22.081	9.886	31.967

CURSO ESCOLAR 2009-2010	TOTAL UNIVERSO (estudiantes 14-18 años)	NÚMERO DE ENTREVISTAS REAL POR TIPO DE ESTUDIOS				ENTREVISTAS EN MUESTRA (1) POR TIPO DE ESTUDIOS			
		ESO	BACH	CICLOS FORMATIVOS	TOTAL	ESO	BACH	CICLOS FORMATIVOS	TOTAL
ARAGÓN	39.317	1.903	582	124	2.609	1.404	921	285	2.610
TOTAL NACIONAL	1.485.883	21.697	8.908	1.613	32.218	17.811	11.677	2.462	31.967

(1) Aplicando los coeficientes de ponderación que devolviesen la representatividad a la muestra

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS Y GRUPOS ENTREVISTADOS. TOTAL NACIONAL Y CCAA DE ARAGÓN			
	RECuento		
	ALUMNOS	CENTROS	GRUPOS
ARAGÓN	2.609	63	128
TOTAL NACIONAL	31.967	857	1.730

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

ÁMBITO: Comunidad de Aragón

UNIVERSO: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en centros educativos de la Comunidad.

MUESTRA: 2.609 individuos.

AFIJACIÓN: Bietápica por conglomerados. Estratificada proporcional al número de alumnos según la titularidad pública o privada del centro. En segunda etapa, selección aleatoria de centros educativos y de pares de aulas en cada centro. En cada aula, se aplicaron los cuestionarios a la totalidad de los alumnos que asistían a clase el día de la Encuesta.

MARGEN DE ERROR: $\pm 1.89\%$ a nivel global para variables de proporción, siendo $p=q=0.5$.

TRABAJO DE CAMPO: Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2010 en la recogida de información de la muestra nacional; del 14 de febrero al 8 de marzo para la recogida de datos de la ampliación muestral de la Comunidad.

INSTITUTO RESPONSABLE: Instituto Sondaxe, S.L.

NOTA METODOLÓGICA: Con el fin de devolver a la muestra la representatividad del Universo de estudiantes, se han aplicado unos coeficientes de ponderación basados en la titularidad de los centros y el tipo de enseñanza.

Para la selección de los centros que compondrían la muestra se aplicó una selección aleatoria entre todos las instituciones educativas de cada Comunidad Autónoma que impartían los

niveles educativos determinados en el Universo (3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional). Una vez seleccionado el centro, siguiendo igualmente un proceso aleatorio, se seleccionaron pares de aulas a las que se aplicaría el cuestionario a la totalidad de sus alumnos, utilizando para ello la información suministrada por los responsables de los centros educativos.

El porcentaje de sustitución de centros titulares en Aragón fue del 9,3%, lo que supone un total 12 centros.

Para evitar sesgos en la recogida de información, los alumnos no fueron informados previamente de su condición de seleccionados para la aplicación de la Encuesta.

Una vez en el aula, un equipo de dos encuestadores específicamente formados, informaron a los alumnos acerca de los objetivos de Estudes, persiguiendo una óptima implicación en la Encuesta, y resolviendo durante su autocumplimentación todas aquellas dudas que surgiesen entre el alumnado. Estas indicaciones fueron ofrecidas por los equipos de campo de modo individualizado y privado para cada alumno que las planteaba.

El absentismo total en el momento de la encuesta se situó en un 7,5%. En la mayoría de los casos, la razón del absentismo fue por enfermedad.

Durante la experiencia, el profesor permanecía en un segundo plano a efectos de no introducir sesgos en las respuestas de los alumnos vertidas en los cuestionarios. Para ello, se solicitó expresamente al profesorado que permaneciese en un lugar neutral del aula.

El cuestionario aplicado a los estudiantes fue totalmente anónimo, aspecto que se aclaró con especial énfasis a los jóvenes, en pro de una mejor y mayor colaboración. Consta de un total de 91 preguntas, entre las que cabe destacar significativas novedades de esta edición de ESTUDES respecto a experiencias anteriores:

- De forma pionera se han introducido preguntas orientadas a conocer la prevalencia de consumo y la percepción del riesgo de sustancias emergentes. Las nueve sustancias incluidas en el módulo específico de drogas emergentes son: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, *research chemicals* y *legal highs*. No obstante, el reducido número de casos sobre los que se basa el análisis del consumo de estas sustancias aconsejan una interpretación de la información en términos cualitativos, dado el elevado margen de error que soportan.
- A efectos de que Estudes permitiese dar cabida a objetivos comunes a otras encuestas internacionales, el cuestionario de la edición de 2010 incluyó preguntas relacionadas con los efectos del consumo de cannabis.


Finalmente indicar que en el cálculo de algunas variables a nivel nacional se han introducido variaciones metodológicas que pueden provocar ligeras diferencias en la comparación de los resultados de la CCAA con los obtenidos en la Encuesta a nivel nacional.

2.RESUMEN

El 86,8% del alumnado encuestado ha nacido en España. Los países de nacimiento mayoritarios de quienes nacieron fuera de España son Rumania (21,2%), Ecuador (20,7%), Colombia (14,6%) y Marruecos (5,4%).


El siguiente gráfico presenta los 10 países principales de nacimiento del alumnado que no ha nacido en España, y que suponen el 80% del total de países de origen mencionados.

GRÁFICO 2.1: PAÍSES MAYORITARIOS DE NACIMIENTO DE LOS ALUMNOS QUE NO HAN NACIDO EN ESPAÑA



Las y los estudiantes encuestados conviven mayoritariamente en una familia nuclear compuesta por padres y/o hermanos o hermanas, tal y como refleja el gráfico 2.2. En el 86,4% de los casos los padres del menor han nacido en España, porcentaje este que se reduce ligeramente (85,3%) si nos detenemos en la procedencia de sus madres.


GRÁFICO 2.2: PERSONAS CON LAS QUE ACTUALMENTE CONVIVE O COMPARTIEN CASA



En el gráfico 2.3 podemos comprobar que en el 84% de los casos, los padres de las y los estudiantes que respondieron a la Encuesta estaban ocupados en el momento de realizarse la misma, frente a un 69,6% de las madres. Por su parte, la tasa de paro es ligeramente superior en el caso de los padres, con un 6% que se encuentran en situación de desempleo, frente al 5,3% de las madres.

Por otro lado, la tasa de madres que se dedican en exclusiva al trabajo dentro del hogar es del 22,8%, mientras que los padres apenas obtienen representatividad en lo que a trabajo exclusivamente doméstico se refiere (1%).

GRÁFICO 2.3: SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES



Analizando el nivel de estudios más elevado completado por los padres, encontramos los más altos porcentajes en los estudios universitarios, en los de Graduado escolar, bachillerato o FP de primer grado y en los de BUP, Bachillerato Superior o FP de segundo grado, tanto para el padre o la madre, y tal y como se aprecia en la tabla 2.1.

TABLA 2.1 NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS COMPLETADO POR LOS PADRES

	PADRE	MADRE
Sin estudios o primarios sin terminar	2,9	2,3
Primarios completos, 6º EGB completo, certificado escolar	14,5	16,2
8º EGB, Graduado escolar, Bachillerato, FP 1º grado	20,7	22,7
BUP, Bachillerato Superior, COU, Preu, FP de segundo grado	20,7	20,6
Estudios universitario	24,8	25,2
No sabes	16,4	12,9

El análisis del consumo de las diferentes sustancias en función del sexo, y teniendo en cuenta las prevalencias del consumo alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, revela significativas diferencias de género en los patrones de consumo. Así, los chicos consumen en mayor medida sustancias ilegales, mientras que las chicas presentan mayores

proporciones de consumo de tabaco, alcohol y tranquilizantes con o sin receta, siguiendo la tendencia observada en la Encuesta ESTUDES del presente año a nivel estatal.


TABLA 2.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN SEXO

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
· Tabaco	43,1	52,1	37,6	44,8	30,1	36,0
· Alcohol	80,3	85,1	79,9	84,7	68,9	73,6
· Tranquilizantes con / sin receta	12,5	17,3	6,6	10,0	3,4	4,7
· Tranquilizantes sin receta	7,4	9,1	3,4	4,9	1,7	2,3
· Cannabis	43,0	40,4	35,4	33,2	24,7	18,7
· Cocaína (base o polvo)	7,2	3,9	5,8	2,7	3,0	1,4
· Cocaína (base)	3,2	2,6	2,4	1,7	1,6	0,8
· Cocaína (polvo)	6,5	2,9	5,1	2,0	2,6	1,1
· GHB	2,0	1,0	1,6	0,7	0,8	0,3
· Éxtasis	5,2	2,7	3,9	1,7	2,1	0,8
· Speed y anfetaminas	7,5	4,0	5,9	2,3	2,5	1,5
· Alucinógenos	7,5	2,4	4,4	1,4	2,1	0,9
· Heroína	1,2	0,5	0,7	0,3	0,5	0,3
· Sustancias volátiles	3,0	1,1	1,2	0,8	0,5	0,4

Si observamos los resultados concluimos también que el alcohol es la sustancia de consumo más extendida entre las y los estudiantes de entre 14 y 18 años, seguido del tabaco como sustancia más consumida.


En general, la proporción de consumidores y consumidoras aumenta con la edad, entre los 14 y los 18 años, para prácticamente todas las sustancias, aunque con excepciones. Así, el consumo de heroína y de sustancias volátiles disminuye entre los 14 y los 18 años. Por su parte, el cannabis es la sustancia cuyo consumo experimenta el mayor incremento entre los 14 y los 16 años, y el tabaco entre los 16 y los 18. El gráfico 2.5 presenta estos resultados.

GRÁFICO 2.5: PREVALENCIA DE CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD




Con respecto a la percepción del riesgo que el alumnado tiene sobre el consumo habitual de drogas, observamos que el valor máximo, a juicio de las y los estudiantes entrevistados, está en el consumo habitual de heroína, y así, un 96,8% asocia bastantes o muchos problemas al consumo de dicha sustancia, pero también la cocaína, el éxtasis y el speed son drogas a las que se asocian riesgos elevados para la salud. En el extremo opuesto, el alcohol es la sustancia sobre la que se percibe un riesgo menor.

GRÁFICO 2.6: PROBLEMAS DE SALUD PERCIBIDOS POR EL CONSUMO HABITUAL DE DIFERENTES SUSTANCIAS.



El tabaco y el alcohol son las sustancias consideradas más accesibles por el alumnado encuestado, seguidas a distancia por el cannabis y los tranquilizantes. La heroína, el éxtasis, la cocaína y el speed son, por ese orden, las drogas que se perciben como más difíciles de conseguir, y también las que presentan mayores porcentajes de estudiantes que no saben valorar esta cuestión.

GRÁFICO 2.7: DIFICULTADES PERCIBIDAS PARA CONSEGUIR DIVERSAS SUSTANCIAS.



En la siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos en nuestra CCAA en lo que a las prevalencias del consumo de diferentes sustancias se refiere.

TABLA 2.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS

	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Aragón 2010	Aragón 2010	Aragón 2010
Tabaco	47,7	41,3	33,1
Alcohol	82,7	82,3	71,3
Tranquilizantes sin receta	8,3	4,2	2,0
Cannabis	41,7	34,2	21,7
Cocaína	5,5	4,2	2,2
Heroína	0,9	0,5	0,4
Speed y anfetaminas	5,7	4,1	2,0
Alucinógenos	4,9	2,9	1,5
Sustancias volátiles	2,0	1,0	0,5
Éxtasis	3,9	2,8	1,4

A la vista de los datos, y para los tres períodos analizados (alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días), podemos afirmar que, en general, el alcohol, el tabaco y el cannabis son las sustancias que presentan las prevalencias más altas.


TABLA 2.4 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE LAS DISTINTAS DROGAS

Aragón 2010	
· Tabaco	13,29
· Alcohol	13,52
· Tranquilizantes sin receta	14,23
· Cannabis	14,56
· Cocaína	15,24
· Heroína	12,31
· Speed y anfetaminas	15,62
· Alucinógenos	15,65
· Sustancias volátiles	13,18
· Éxtasis	15,61

La edad media de inicio al consumo de las distintas drogas oscila entre un mínimo de 12,3 años en el caso de la heroína, y un máximo de 15,6 años en el caso del speed / alucinógenos y del éxtasis.


Cuatro de cada diez estudiantes aragoneses (40,4%) reconoció haber faltado algún día completo a clase durante los 30 días previos a la realización de la Encuesta. La mayoría (77,4%) justificó su ausencia por enfermedad o necesidad de ir al médico, mientras que el 27,7% mencionó otros motivos, el 16,3% afirmó haber faltado por no haber tenido ganas de ir y un 10,3% se ausentó para asistir a un funeral o atender a familiares enfermos.

GRÁFICO 2.8: MOTIVOS PARA NO ASISTIR, DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, ALGÚN DÍA COMPLETO A CLASE.



Un 33,7% declaró haber repetido curso alguna vez, el 24,2% sólo un curso y el 9,5% dos o más.

GRÁFICO 2.9: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN HAYAN REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ.



La hora de regreso a casa durante las salidas nocturnas se ha retrasado sustancialmente, de manera que el tramo horario más frecuente durante la última salida en fin de semana es el que transcurre entre las 4 y las 8 de la mañana, opción escogida por un 24,1% de las y los jóvenes entrevistados. Existen sin embargo diferencias en función de la edad: mientras las y los estudiantes de 14 y 15 años regresan mayoritariamente a horas tempranas, a partir de los 16 años son mayoritarios los regresos posteriores a las 4 de la madrugada. La tabla 2.5 describe esta situación:

TABLA 2.5 HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN FIN DE SEMANA POR EDAD

	14	15	16	17	18	Total
Antes de las 12	39,9	23,4	13,8	3,3	1,0	16,3
Entre las 12 y la 1	23,5	18,9	14,2	7,6	6,3	14,5
Entre la 1 y las 2	12,7	13,5	14,4	6,8	1,9	11,2
Entre las 2 y las 3	10,5	14,0	13,5	13,4	11,5	13,0
Entre las 3 y las 4	5,9	11,9	19,8	17,8	18,8	15,4
Entre las 4 y las 8	5,0	15,6	21,0	41,9	44,7	24,1
Después de las 8	2,5	2,7	3,4	9,0	15,9	5,4

En cuanto a la frecuencia de salidas nocturnas, un 10,6% del alumnado aragonés que respondió a la Encuesta reconoció no haber salido nunca en los últimos 12 meses, mientras que un 42,5% señaló haberlo hecho entre 1 y 3 noches cada mes. Por edades, la frecuencia de salidas nocturnas aumenta con la edad.

TABLA 2.6 FRECUENCIA DE SALIDAS NOCTURNAS EN EL ÚLTIMO AÑO

	14	15	16	17	18	Total
Nunca	21,8	14,9	7,8	4,4	1,0	10,6
De 1 a 3 noches al mes	47,2	41,5	50,2	32,9	30,8	42,5
4 noches al mes	15,8	20,4	21,1	30,8	22,1	22,1
Más de 4 noches al mes	15,1	23,2	20,9	31,9	46,2	24,8

El cruce de la frecuencia de las salidas nocturnas con la edad revela que ambas variables guardan relación directa con el consumo de drogas ilegales, de manera que encontramos la mayores tasas de consumo entre quienes han salido 4 noches al mes o más, sobre todo entre el alumnado de mayor edad.

TABLA 2.7 CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN FRECUENCIA DE SALIDAS NOCTURNAS

	14	15	16	17	18
Nunca	9,2	16,7	18,4	18,5	0,0
De 1 a 3 noches al mes	20,4	25,8	37,7	31,4	48,7
4 noches al mes	27,5	45,9	48,1	52,7	57,2
Más de 4 noches al mes	30,8	57,9	52,1	60,7	69,6

Del mismo modo, la hora de regreso a casa en la última salida en fin de semana parece influir en el consumo de drogas ilegales, de manera también proporcional a la edad, y tal y como refleja la tabla 2.8.

TABLA 2.8 CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN FIN DE SEMANA

	14	15	16	17	18
Antes de las 12	20,0	25,0	15,3	4,0	100,0
Entre las 12 y la 1	18,9	29,3	31,1	19,2	11,9
Entre la 1 y las 2	18,3	31,3	34,0	29,9	57,4
Entre las 2 y las 3	22,9	41,1	45,4	39,3	41,0
Entre las 3 y las 4	39,2	58,4	57,9	55,9	40,7
Entre las 4 y las 8	56,4	60,1	55,6	54,3	73,7
Después de las 8	53,4	58,4	82,8	69,7	76,8

3. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

3.1.TABACO

Un 47,7% de las y los estudiantes de entre 14 y 18 años reconoció haber consumido tabaco en alguna ocasión. El consumo de tabaco es superior en las mujeres que en los hombres. Los datos de la tabla 3.1.1 confirman las citadas diferencias en función del sexo. Atendiendo a la edad de la persona encuestada, la misma tabla pone de manifiesto que el consumo es superior al obtenido para el conjunto del Estado entre el alumnado de todas las edades estudiadas.

TABLA 3.1.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD

	Alguna vez	Últimos 30 días
	Aragón 2010	Aragón 2010
Total	47,7	33,1
Sexo		
Hombre	43,1	30,2
Mujer	52,1	36,0
Edad		
14 años	36,2	21,0
15 años	44,8	31,9
16 años	47,8	33,4
17 años	54,5	36,9
18 años	62,2	50,2

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco en los 12 meses previos a la realización de la Encuesta, encontramos que la tasa de fumadoras supera a la de fumadores, y que ésta aumenta conforme lo hace la edad.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	41,3
Sexo	
Hombre	37,6
Mujer	44,8
Edad	
14 años	29,2
15 años	38,3
16 años	41,7
17 años	47,3
18 años	58,0

Se recogen a continuación las prevalencias de consumo en función del sexo y la edad simultáneamente, y así se observa que el consumo de tabaco se incrementa con la edad, con la única excepción del paso de los 15 a los 16 años en el caso de los hombres para el período temporal que comprende los últimos 30 días, y que es superior en las mujeres para todos los grupos de edad y para todos los períodos.

TABLA 3.1.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	35,8	39,5	40,9	47,4	61,9	36,7	49,7	54,2	61,3	62,6
Consumo últimos 12 meses	27,9	34,5	36,6	41,6	56,2	30,4	41,7	46,5	52,8	60,2
Consumo últimos 30 días	19,0	29,5	28,0	33,8	48,3	22,9	34,1	38,4	39,9	52,8

La tabla 3.1.4 muestra los incrementos porcentuales de consumo al pasar de un grupo de edad al siguiente. El mayor incremento (48,9%) se encuentra entre las chicas que pasan de 14 a 15 años, y el menor (-5,1%), en los chicos, en el paso de los 15 a los 16 años.

TABLA 3.1.4 INCREMENTOS PORCENTUALES EN CONSUMO DE TABACO AL PASAR DE UNA EDAD A LA SIGUIENTE SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES				MUJERES			
	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18
Consumo alguna vez	10,3	3,5	15,9	30,6	35,4	9,1	13,1	2,1
Consumo últimos 12 meses	23,7	6,1	13,7	35,1	37,2	11,5	13,5	14,0
Consumo últimos 30 días	55,3	-5,1	20,7	42,9	48,9	12,6	3,9	32,3

En la tabla 3.1.5 se muestra la relación entre el consumo de tabaco y el tipo de enseñanza:

TABLA 3.1.5 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA				
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS	EDAD MEDIA INICIO
ESO	45,7	39,1	32,3	12,82
Bachillerato	45,6	39,7	30,1	13,90
Ciclos Formativos de Grado Medio	64,7	57,1	47,2	13,53
Ciclos Formativos de Grado Superior	57,1	57,1	42,9	14,00

El alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio es el que presenta una mayor prevalencia de consumo en los tres indicadores, y el de Bachillerato es el que muestra una prevalencia menor. Son las y los alumnos de la ESO quienes presentan una menor edad media de inicio al consumo (12,82 años). La mayor edad media de inicio al consumo de tabaco la encontramos entre el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior (14 años).

En la siguiente tabla se observa que, tanto para hombres como para mujeres, la cantidad más habitual de cigarrillos consumidos diariamente es entre 1 y 5. Además, se observa que la prevalencia de consumo no va necesariamente asociada a la cantidad consumida, puesto que aunque la prevalencia es mayor en las mujeres, la cantidad de cigarrillos diarios es superior en los hombres: un 17,1% reconoce fumar más de 10 cigarrillos al día, frente a un 8,6% de mujeres que señala esa misma cantidad.

TABLA 3.1.6 FRECUENCIAS DE CONSUMO DE TABACO Y CANTIDAD DIARIA CONSUMIDA ENTRE LOS CONSUMIDORES DE TABACO LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

	Hombres	Mujeres	Total
De 1 a 5 cigarrillos	61,0	61,4	61,3
De 6 a 10 cigarrillos	21,7	30,0	26,3
Más de 10 cigarrillos	17,1	8,6	12,4

Un 53,8% de las y los estudiantes que han fumado los últimos 30 días consumen tabaco a diario, un porcentaje que es superior entre las mujeres y que aumenta además conforme lo hace la edad, aunque alcanza el mayor porcentaje a los 17 años.

Por tipo de enseñanza, es el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio el que presenta un mayor consumo diario, principalmente el que estudia en centros de titularidad pública.

TABLA 3.1.7.1		PREVALENCIA EN EL CONSUMO DIARIO DE TABACO SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
Total		53,8
Sexo		
Hombre		52,2
Mujer		55,1
Edad		
14 años		25,9
15 años		45,7
16 años		51,5
17 años		73,4
18 años		63,8
Titularidad		
Pública		54,7
Privada		51,9
Tipo de Enseñanza		
ESO		48,7
Bachillerato		56,4
CFGM		69,3
CFGS		-

En la tabla 3.1.8 aparecen las frecuencias de consumo de tabaco en los últimos 30 días, desagregadas por sexo y edad. La mayoría (67,2%) nunca ha fumado, una situación que es más habitual entre los hombres (70%) que entre las mujeres (64,4%). Con respecto a la edad, se observa que a medida que ésta aumenta, lo hace también el consumo diario de tabaco, y así, es el alumnado de 18 años el que con mayor frecuencia reconoce fumar diariamente (32,1%).

TABLA 3.1.8 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE TABACO EN LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS POR SEXO Y EDAD

	Nunca	Menos de un día a la semana	Algún día a la semana, pero no diariamente	Diariamente
Total	67,2	4,9	10,3	17,7
Sexo				
Hombre	70,0	4,6	9,7	15,6
Mujer	64,4	5,1	10,9	19,6
Edad				
14 años	79,6	5,8	9,4	5,3
15 años	68,3	5,3	11,9	14,5
16 años	66,9	4,5	11,5	17,0
17 años	63,3	3,3	6,5	27,0
18 años	49,8	7,2	11,0	32,1

El número medio de cigarrillos consumidos al día (5,87) aumenta conforme lo hace la edad. En general, el nivel de consumo de las mujeres (5,2) es inferior al de los hombres (6,72), y alcanza su máximo valor entre el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio (7,16), sobre todo el de centros públicos (6,09).

TABLA 3.1.9.1 NÚMERO MEDIO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA, SEGÚN SEXO, EDAD, TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
Total	5,87
Sexo	
Hombre	6,72
Mujer	5,20
Edad	
14 años	4,21
15 años	6,38
16 años	5,04
17 años	7,01
18 años	6,25
Titularidad	
Pública	6,09
Privada	5,39
Tipo de Enseñanza	
ESO	6,11
Bachillerato	5,03
CFGM	7,16
CFGS	0,33

La edad media de inicio al consumo de tabaco es de 13,3 años, un valor que aumenta ligeramente conforme lo hace la edad, y que es muy similar en varones y mujeres. En cuanto a la edad media de comienzo de consumo diario, se sitúa en 14,2 años y sigue la tendencia de la edad de inicio, tanto en lo que se refiere al cruce por sexo como al cruce por edad. Estos resultados pueden verse en la tabla 3.1.10.

TABLA 3.1.10 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD (Fumadores actuales)								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		HOMBRE	MUJER	14	15	16	17	18
Aragón 2010								
Edad media de consumo por primera vez	13,3	13,2	13,4	12,4	12,9	13,4	14,0	13,9
Edad media de comienzo de consumo diario	14,2	14,3	14,2	13,0	13,6	14,3	14,6	15,2

Las tablas que siguen a continuación presentan las frecuencias con las que las y los estudiantes han visto fumar, dentro del centro educativo, al profesorado (tabla 3.1.10.1), a estudiantes (tabla 3.1.10.2) y a otras personas (tabla 3.1.10.3), según la titularidad del centro y la edad.

La situación más habitual es que el alumnado no haya visto fumar a profesores o profesoras dentro del centro educativo ningún día (52,4%), sobre todo las y los estudiantes más jóvenes, encontrándose la frecuencia más elevada para esta opción en los 14 años. La titularidad del centro resulta también muy significativa en este aspecto, siendo más común el haber visto fumar al profesorado en centros públicos que en centros privados.

TABLA 3.1.11.1 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A PROFESORES DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD Y EDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	52,4	16,4	7,0	5,4	15,8
Titularidad					
Pública	45,9	20,0	8,4	6,9	15,8
Privada	64,5	9,7	4,3	2,7	15,9
Edad					
14 años	61,5	10,0	6,2	6,0	13,4
15 años	55,3	14,2	6,3	5,3	15,4
16 años	50,9	17,0	6,9	5,1	16,6
17 años	47,6	19,5	7,8	6,5	15,5
18 años	42,6	25,4	8,6	3,8	19,6

Respecto a la frecuencia con la que han visto fumar a estudiantes dentro del centro educativo, un 50,0% reconoce que todos o casi todos los días que ha ido a clase presencié esta situación. La frecuencia para esta opción aumenta a medida que lo hace la edad, y es asimismo más elevada en los centros públicos que en los privados.

TABLA 3.1.11.2 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A ESTUDIANTES DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD Y EDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	21,3	50,0	8,1	6,4	13,0
Titularidad					
Pública	17,4	53,8	8,1	6,9	12,4
Privada	28,6	42,7	8,2	5,5	14,1
Edad					
14 años	23,6	36,8	9,4	10,6	18,5
15 años	20,0	51,5	7,7	7,5	11,4
16 años	18,8	51,7	9,3	5,0	14,3
17 años	25,6	51,5	7,3	5,7	8,8
18 años	19,6	60,3	5,3	1,9	12,0

Por último, un 46% declaró no haber visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, encontrándose el porcentaje más elevado para esta opción en las y los estudiantes de 14 años y en los centros privados.

TABLA 3.1.11.3 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A OTRAS PERSONAS DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD Y EDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	46,0	24,1	8,1	6,3	10,0
Titularidad					
Pública	42,3	26,9	8,5	6,0	10,4
Privada	53,0	18,8	7,3	6,9	9,2
Edad					
14 años	53,6	15,6	5,3	8,2	11,1
15 años	45,0	22,0	10,1	6,3	10,4
16 años	45,1	25,8	8,3	5,3	10,4
17 años	47,8	25,2	6,5	5,7	9,8
18 años	33,0	37,3	11,0	8,1	6,2

Las tablas que siguen a continuación presentan las frecuencias de diferentes planteamientos sobre el tabaco (planteamiento de dejarlo, intentos efectivos de hacerlo, molestia de que se fume en lugares cerrados y personas con las que se convive y que fumen). En primer lugar un 38,4% de las y los jóvenes fumadores encuestados se han planteado en algún momento dejar de fumar y lo han intentado realmente; un 38,5% se lo han planteado pero no lo han intentado y un 23,1% ni siquiera se lo han planteado.

TABLA 3.1.12 SE HA PLANTEADO DEJAR DE FUMAR SEGÚN SEXO Y EDAD			
	Sí y lo ha intentado	Sí pero no lo ha intentado	No se lo ha planteado
Total	38,4	38,5	23,1
Sexo			
Hombre	33,8	39,9	26,3
Mujer	42,1	37,4	20,5
Edad			
14 años	48,1	30,4	21,5
15 años	39,4	40,9	19,7
16 años	38,7	38,7	22,6
17 años	31,4	39,8	28,8
18 años	38,4	37,1	21,9

Respecto a los que piensan actualmente en dejar de fumar, un 24,3% ha decidido que dejará de fumar en los próximos 30 días, un 34,2% lo intentará en los próximos 6 meses y un 41,5% no piensa dejar de fumar, al menos en los próximos 6 meses. En función del sexo, las mujeres tienen menos intención de dejar de fumar a corto o medio plazo que los hombres.

TABLA 3.1.13 PIENSA ACTUALMENTE EN DEJAR DE FUMAR SEGÚN SEXO Y EDAD			
	Sí, ha decidido que dejará de fumar en los próximos 30 días	Sí, le gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses	No piensa dejar de fumar, al menos en los próximos 6 meses
Total	24,3	34,2	41,5
Sexo			
Hombre	21,9	39,6	38,5
Mujer	26,2	29,9	43,9
Edad			
14 años	41,6	26,0	32,5
15 años	28,1	36,0	36,0
16 años	23,4	37,9	38,7
17 años	17,6	27,8	54,5
18 años	18,0	39,0	43,0

Respecto a las opiniones del alumnado entrevistado acerca de la molestia que les causa que otras personas fumen en lugares cerrados en su presencia, observamos que al 61,2% les molesta poco o nada mientras que al 38,8% les incomoda mucho o bastante.

LE MOLESTA QUE OTRAS PERSONAS FUMEN EN LUGAR CERRADO SEGÚN SEXO Y EDAD				
TABLA 3.1.14	Nada	Mucho	Bastante	Poco
Total	30,1	19,2	19,6	31,1
Sexo				
Hombre	28,1	21,4	20,5	30,1
Mujer	32,0	17,1	18,7	32,1
Edad				
14 años	24,3	21,9	21,4	32,3
15 años	30,8	17,9	21,6	29,7
16 años	27,1	20,7	19,6	32,6
17 años	33,5	18,9	18,4	29,3
18 años	42,1	12,4	12,9	32,5

La convivencia con personas que fuman diariamente alcanza al 49,4% de estudiantes encuestados, sin que existan diferencias significativas en función del sexo o la edad.

PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE QUE FUMEN DIARIAMENTE SEGÚN SEXO Y EDAD				
TABLA 3.1.15	No	Sí	Vive en un centro educativo o institución	Vive solo/a
Total	50,2	49,4	0,2	0,2
Sexo				
Hombre	50,7	48,6	0,4	0,3
Mujer	49,8	50,1	0,1	0,1
Edad				
14 años	49,6	49,6	0	0,7
15 años	51,3	48,4	0,2	0,2
16 años	53,2	46,7	0,1	0
17 años	48,6	51,4	0	0
18 años	39,9	57,2	1,9	1,0

3.2. ALCOHOL

El consumo de bebidas alcohólicas sigue estando muy extendido entre las y los estudiantes de 14 a 18 años. En términos globales, un 82,7% de jóvenes de Aragón han consumido alcohol alguna vez en su vida. Por sexos, el consumo de alcohol es sensiblemente superior entre las mujeres que entre los varones para los tres indicadores. Si atendemos a la edad, la prevalencia del consumo de alcohol aumenta con los años, un aumento que es especialmente significativo en el paso de los 14 a los 15.

TABLA 3.2.1. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD

Alguna vez	
Aragón	
Total	82,7
Sexo	
Hombre	80,3
Mujer	85,1
Edad	
14 años	69,1
15 años	80,3
16 años	82,1
17 años	90,6
18 años	96,6

TABLA 3.2.2. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD

Últimos 12 meses	
Aragón	
Total	82,3
Sexo	
Hombre	79,9
Mujer	84,7
Edad	
14 años	67,9
15 años	80,0
16 años	81,6
17 años	90,6
18 años	96,6

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Aragón	
Total	71,3
Sexo	
Hombre	68,9
Mujer	73,6
Edad	
14 años	57,0
15 años	68,0
16 años	70,0
17 años	80,3
18 años	88,7

En la siguiente tabla se muestra la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días en función del consumo de tabaco.

Si, como veíamos en la tabla anterior, la prevalencia del consumo de alcohol en los últimos 30 días era del 71,3%, al cruzar este indicador con el consumo de tabaco obtenemos una distribución muy diferente. Así, mientras que un 60,3% reconocen consumir alcohol pero no tabaco, el porcentaje se eleva hasta a un 91,4% para las y los consumidores de ambas sustancias.

PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS			
		ALCOHOL	
		Consumo	No consume
TABACO	Consumo	91,4	8,6
	No consume	60,3	39,7

En la tabla 3.2.5 se presentan los datos referentes a la edad media de consumo de bebidas alcohólicas por primera vez, y que sitúa en esta ocasión en 13,5 años. Por otra parte, el dato referente a la edad media de comienzo de consumo semanal, es de 14,7 años en esta edición.

Por sexos, chicos y chicas se inician en el consumo de alcohol a la misma edad, pero ellas comienzan ligeramente antes que sus compañeros varones a consumir alcohol

semanalmente. En cuanto a la edad, observamos que a medida que ésta aumenta, lo hacen también las edades medias de inicio al consumo, tanto por primera vez como semanalmente.

TABLA 3.2.5 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		HOMBRE	MUJER	14	15	16	17	18
Aragón 2010								
Edad media de consumo por primera vez	13,5	13,5	13,5	12,7	13,2	13,7	14,0	14,1
Edad media de comienzo de consumo semanal	14,7	14,9	14,6	13,3	14,0	14,6	15,4	15,7

Atendiendo a la intensidad en el consumo de alcohol, un 68,4% de las y los jóvenes aragoneses reconocieron haberse emborrachado alguna vez en su vida. Por su parte, un 62,3% se emborrachó en los últimos 12 meses y un 40% lo hizo en los últimos 30 días.

TABLA 3.2.6 PREVALENCIAS DE BORRACHERAS SEGÚN SEXO Y EDAD			
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
Total	68,4	62,3	40,0
Sexo			
· Hombres	66,3	60,8	39,6
· Mujeres	70,4	63,8	40,4
Edad			
· 14 años	45,7	42,1	25,1
· 15 años	61,9	56,8	34,8
· 16 años	70,4	63,8	41,8
· 17 años	79,6	72,7	45,5
· 18 años	90,4	83,7	61,1

Estos resultados aparecen distribuidos conjuntamente por sexo y edad en la tabla 3.2.7, que pone de manifiesto como, a medida que aumenta la edad, aumenta también la prevalencia de borracheras, excepto en el paso de las mujeres de los 16 a los 17 años en los últimos 30 días.


TABLA 3.2.7 PREVALENCIAS DE BORRACHERAS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	45,4	58,3	63,1	80,5	94,2	46,3	65,5	77,1	79,0	84,9
Consumo últimos 12 meses	40,9	54,0	57,1	74,9	85,7	43,1	59,5	68,8	71,0	80,8
Consumo últimos 30 días	23,0	33,2	37,1	50,7	61,1	26,8	36,3	45,8	40,8	60,9

El mayor incremento en el porcentaje de jóvenes que reconoce haberse emborrachado en alguno de los períodos se produce entre los 16 y los 17 años en el caso de los chicos, y entre los 14 y los 15 en el caso de las chicas. Además, los incrementos son siempre en sentido positivo, salvo en el caso de las mujeres, en la edad y período temporal ya descritos.

La prevalencia de atracones de alcohol o *“binge drinking”* (5 ó más copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado de Aragón de entre 14 y 18 años fue de un 73,9% (76,1% en hombres y 71,9% en las mujeres). Por edad las mayores prevalencias se encuentran entre las y los jóvenes estudiantes de 18 años (86,8%) (Gráfico 3.2.1).

GRÁFICO 3.2.1: PREVALENCIA DE ATRACONES DE ALCOHOL (BINGE DRINKINGS) EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS



La tabla 3.2.9 presenta los datos obtenidos con relación a la cantidad de alcohol ingerida, y en función del sexo y la edad del alumnado.

En general, la toma de 5 vasos o más de alcohol en una misma ocasión en los últimos 30 días aumenta a medida que lo hace la edad, y es más frecuente en los hombres que en las mujeres.

TABLA 3.2.9 FRECUENCIA EN LA TOMA DE 5 Ó MÁS VASOS DE ALCOHOL EN UNA MISMA OCASIÓN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	22,9	18,1	14,6	11,4	11,5	5,8	1,7	1,9
Sexo								
· Hombres	21,0	16,3	13,0	9,5	14,8	7,8	2,6	3,0
· Mujeres	24,6	19,7	16,0	13,1	8,6	4,0	0,9	0,9
Edad								
· 14 años	30,7	14,2	11,5	10,0	6,5	2,3	0,8	0,8
· 15 años	22,1	20,2	15,5	10,7	8,2	4,5	2,1	2,1
· 16 años	25,1	19,7	13,3	9,0	12,1	6,1	1,0	2,1
· 17 años	20,6	17,1	15,9	15,2	15,9	6,4	0,9	2,4
· 18 años	12,4	16,1	17,2	14,0	15,1	12,4	5,9	1,1

Un 7,3% del alumnado aragonés ha viajado en cuatro ocasiones o más como pasajero/a en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses, un dato que aumenta con la edad, y que alcanza el 13,4% para las y los jóvenes de 18 años. El sexo no influye significativamente en el comportamiento aquí analizado.

FRECUENCIA CON LA QUE VIAJAN DE PASAJEROS EN UN VEHÍCULO DE MOTOR CONDUCIDO POR ALGUIEN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	81,4	5,5	3,1	2,1	2,1	1,3	0,9	3,0
Sexo								
· Hombres	81,6	5,1	2,6	1,9	1,7	1,6	0,6	4,0
· Mujeres	81,2	5,8	3,5	2,4	2,4	0,9	1,1	2,0
Edad								
· 14 años	89,2	2,9	1,9	2,1	0,5	0,2	0	1,9
· 15 años	82,8	5,6	3,0	1,8	1,5	0,8	0,9	3,0
· 16 años	82,1	4,9	4,3	1,9	2,0	1,1	1,0	2,1
· 17 años	75,3	7,6	2,9	2,5	3,1	2,5	1,3	4,4
· 18 años	74,2	7,2	1,0	3,3	4,8	1,9	1,0	5,7

Los valores se reducen al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol, tal y como muestra la tabla 3.2.11, mientras que las tendencias observadas para la tabla 3.2.10.1 en relación con el sexo y a la edad varían: la conducción de vehículos a motor bajo los efectos del alcohol es más frecuente en los chicos que en las chicas, y aumenta entre los 16 y los 18 años.

FRECUENCIA CON LA QUE HAS CONDUCIDO UN VEHÍCULO A MOTOR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	84,3	1,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,2	1,0
Sexo								
· Hombres	80,1	3,2	1,0	0,9	0,9	0,7	0,4	1,8
· Mujeres	88,2	0,5	0,4	0,1	0	0,1	0	0,3
Edad								
· 14 años	76,1	0,7	0,7	0,3	0,3	0	0,3	1,0
· 15 años	84,2	1,7	0,2	0,4	0,4	0,6	0,2	0,9
· 16 años	83,4	1,5	0,9	0,4	0,1	0,3	0,4	0,6
· 17 años	88,8	2,7	0,4	0,8	0,8	0,4	0	1,1
· 18 años	89,2	3,0	2,0	0	1,0	0	0	2,0

La tabla 3.2.12 refleja diferentes situaciones que pudieron haber vivido las y los estudiantes encuestados en los últimos 12 meses y el porcentaje de quienes habían consumido alcohol en las dos horas previas a plantearse la situación, en relación con el sexo, la edad y la titularidad del centro. Las peleas o agresiones físicas son las situaciones más habituales (15,9%), más en

el caso de los chicos (22,9%). Sin embargo, el porcentaje de consumo de alcohol en las dos horas previas a la pelea o agresión es superior en las mujeres.

En general, y salvo la asistencia sanitaria urgente, los chicos han experimentado en mayor medida que las chicas todas las situaciones propuestas (accidente con asistencia médica, pelea o agresión física y detención por la policía o guardia civil), y para ambos sexos, las frecuencias aumentan en general conforme lo hace la edad.

PROBLEMAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO Y PORCENTAJE DE TABLA 3.2.12 JÓVENES QUE CONSUMIERON ALCOHOL EN LAS 2 HORAS ANTERIORES

	ACCIDENTE CON ASISTENCIA MÉDICA	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS	PELEA O AGRESIÓN FÍSICA	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS	ASISTENCIA SANITARIA URGENTE	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS	DETENIDO POR POLICIA O GUARDIA CIVIL	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS
Total	2,8	16,4	15,9	42,6	7,5	14,1	5,2	36,8
Sexo								
· Hombres	4,5	20,6	22,9	41,3	7,1	14,3	7,8	37,6
· Mujeres	1,1	0	9,1	45,7	8,0	14,0	2,7	34,3
Edad								
· 14 años	1,2	25,9	11,6	22,2	7,1	14,1	3,1	41,1
· 15 años	2,8	11,7	15,8	37,6	9,0	17,4	5,0	41,6
· 16 años	2,7	20,3	15,0	43,0	6,4	18,7	5,0	36,8
· 17 años	3,0	0	17,5	45,9	7,8	3,7	5,5	28,0
· 18 años	5,7	34,0	24,8	64,5	7,4	13,1	10,1	38,6
Titularidad								
· Público	2,9	16,3	15,5	45,4	7,5	12,6	5,3	35,7
· Privado	2,7	16,7	16,7	37,7	7,6	16,9	5,0	38,9

El consumo de alcohol es más común durante el fin de semana (76,8%) que en días laborables (28,5%). Atendiendo al tipo de bebida alcohólica más consumida, destacan los combinados o cubatas en fin de semana (79,4%), seguidos de la cerveza (57,6%), aunque en este caso es significativa la diferencia entre mujeres y hombres que consumen esta bebida (47,2% frente a 68,9%). Durante la semana, la cerveza pasa a ocupar el primer puesto, con un 25,3%, y las diferencias en el consumo de hombres y mujeres vuelven a ser evidentes (35,2% frente a 16,3%). El vermut es la bebida menos consumida, tanto en días laborables como en fines de semana.

TABLA 3.2.13 PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN TIPO DE BEBIDA						
	ALGÚN FIN DE SEMANA			ALGÚN DÍA LABORABLE		
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Total	76,4	77,3	76,8	35,8	21,7	28,5
Tipo de bebida						
· Vino / Champán	36,7	32,6	34,5	11,5	7,7	9,5
· Cerveza	68,9	47,2	57,6	35,2	16,3	25,3
· Aperitivos / Vermut	17,2	11,7	14,3	8,6	3,7	6,1
· Combinados / Cubatas	77,6	81,0	79,4	14,9	8,6	11,6
· Licores de Frutas	36,2	43,0	39,7	9,3	7,0	8,1
· Licores Fuertes	48,7	39,0	43,6	11,0	5,0	7,9

Considerando el consumo distribuido en los días de semana, en la tabla 3.2.14 observamos que el consumo en los días de fin de semana se dispara muy por encima del consumo en días laborables.

TABLA 3.2.14 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL ALGÚN FIN DE SEMANA O ALGUN DÍA LABORABLE	
Consumidores en los últimos 30 días	
Aragón 2010	
Fin de Semana	76,8
Días Laborables	28,5

La continuidad en el consumo de alcohol, reflejada en la tabla 3.2.15, es ligeramente superior para las mujeres, y aumenta conforme lo hace la edad. Se observa que es, asimismo, mayor entre el alumnado de centros públicos, y el mayor porcentaje de continuidad se encuentra entre quienes cursan Ciclos Formativos de Grado Superior.

En términos generales, un 90,8% del alumnado aragonés de entre 14 y 18 años que consumió alcohol alguna vez en su vida, lo ha seguido haciendo en los últimos 12 meses, el 79,3% de quienes bebieron alcohol en los últimos 12 meses lo ha hecho también en los últimos 30 días, y el mismo porcentaje (79,3%) que reconoció haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida continuó haciéndolo durante el último mes.

TABLA 3.2.15 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ALCOHOL			
	VIDA / 12 MESES	12MESES / 30 DÍAS	VIDA / 30 DÍAS
Total	90,8	79,3	79,3
Sexo			
Hombres	90,5	78,7	78,7
Mujeres	91,1	79,8	79,8
Edad			
14 años	79,9	68,1	68,1
15 años	89,9	77,1	77,1
16 años	90,1	77,9	77,9
17 años	97,3	86,7	86,7
18 años	97,0	89,1	89,1
Titularidad			
Público	92,9	81,6	81,6
Privado	87,0	74,9	74,9
Tipo de Enseñanza			
ESO	88,2	75,8	75,8
Bachillerato	92,0	80,8	80,8
Ciclos Formativos G.M.	98,4	88,8	88,8
Ciclos Formativos G.S.	100,0	100,0	100,0

Por otro lado, el consumo de alcohol en el hogar es más común entre los padres que entre las madres. En este sentido, un 46,6% de las madres no ha bebido nunca, frente al 26% de los padres, y entre éstos, lo más común es el consumo aislado (36,1%). Estos datos se muestran en la tabla 3.2.16.

	CONSUMO DE ALCOHOL EN EL HOGAR	
	PADRE	MADRE
No ha bebido nunca	26,0	46,6
Ha bebido algún día aislado	36,1	33,3
Ha bebido sólo los fines de semana	15,2	9,4
Ha bebido casi todos los días moderadamente	13,3	6,1
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,8	0,1
No lo sé	8,6	4,6

3.3. CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

El 49,3 % de las y los estudiantes aragoneses de entre 14 y 18 años admitieron haber consumido alguna vez en su vida una o más de las sustancias antes mencionadas, incluidas en el grupo de drogas ilegales. Analizando los resultados según el sexo de las personas entrevistadas, observamos cómo esta variable apenas influye en la prevalencia de consumo. La prevalencia de consumo de sustancias ilegales aumenta conforme lo hace la edad, y alcanza un 74,2% entre el alumnado de 18 años.

TABLA 3.3.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
ALGUNA VEZ EN LA VIDA		
Total		49,3
Sexo		
Hombre		48,9
Mujer		49,6
Edad		
14 años		29,0
15 años		44,6
16 años		51,0
17 años		58,5
18 años		74,2
Titularidad		
Pública		50,6
Privada		46,8
Tipo de Enseñanza		
ESO		44,4
Bachillerato		51,6
CFGM		65,3
CFGS		71,4

De la misma manera, un 39,2% de las y los estudiantes aragoneses de entre 14 y 18 años admitieron haber consumido una o más de las drogas antes mencionadas alguna vez en los últimos 12 meses. La situación es bastante similar a la observada para el consumo alguna vez en la vida: por una parte las mujeres siguen presentando porcentajes de consumo superiores a los de los hombres, aunque con escasa diferencia; por otra, el consumo aumenta en función

de la edad, alcanzando el punto máximo entre las y los jóvenes de 18 años. En relación con el tipo de enseñanza, son las y los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior quienes presentan una mayor prevalencia de consumo.

TABLA 3.3.2		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
ÚLTIMOS 12 MESES		
Total		39,2
Sexo		
Hombre		38,9
Mujer		39,6
Edad		
14 años		20,7
15 años		36,0
16 años		41,4
17 años		46,8
18 años		59,8
Titularidad		
Pública		40,2
Privada		37,4
Tipo de Enseñanza		
ESO		34,8
Bachillerato		41,4
CFGM		53,1
CFGS		71,4

Finalmente, un 25,4 % de jóvenes aragoneses con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años admitieron haber consumido, alguna vez en el último mes, una o más de las drogas antes mencionadas. Para este período temporal, los hombres presentan mayores prevalencias del consumo que las mujeres, y la tendencia en función de la edad se mantiene.

TABLA 3.3.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
ÚLTIMOS 30 DÍAS		
Total		25,4
Sexo		
Hombre		27,8
Mujer		23,0
Edad		
14 años		13,4
15 años		24,0
16 años		24,7
17 años		30,0
18 años		45,0
Titularidad		
Pública		27,4
Privada		21,6
Tipo de Enseñanza		
ESO		24,1
Bachillerato		23,7
CFGM		36,9
CFGS		42,9

3.4. TRANQUILIZANTES

El 8,3% del alumnado de Aragón de entre 14 y 18 años ha tomado tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual en las mujeres y que aumenta a medida que lo hace la edad.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Tabla 3.4.1.	
Alguna vez	
Aragón 2010	
Total	8,3
Sexo	
Hombre	7,4
Mujer	9,1
Edad	
14 años	5,5
15 años	7,5
16 años	7,9
17 años	9,2
18 años	15,3

En los últimos 12 meses, consumieron tranquilizantes sin prescripción un 4,2% de las y los estudiantes aragoneses encuestados. Los comportamientos en función del sexo se repiten en este período, mientras que si atendemos a la edad, el consumo disminuye en el paso de los 15 a los 16 años.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Tabla 3.4.2.	
Últimos 12 meses	
Aragón 2010	
Total	4,2
Sexo	
Hombre	3,4
Mujer	4,9
Edad	
14 años	3,4
15 años	3,8
16 años	3,6
17 años	4,8
18 años	7,7

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de tranquilizantes sin receta se establece en el 2%. En este período temporal la prevalencia de consumo disminuye en el paso de los 14 a los 15 años, manteniéndose constante entre los 15 y los 16 y aumentando a partir de esta edad.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Aragón 2010	
Total	2,0
Sexo	
Hombre	1,7
Mujer	2,3
Edad	
14 años	1,2
15 años	1,8
16 años	1,8
17 años	2,1
18 años	4,8

El consumo de tranquilizantes con o sin receta tiene un comportamiento similar al consumo de tranquilizantes sin receta, mostrando mayor prevalencia de consumo las mujeres, y aumentando con la edad en todos los tramos de edad analizados, con la única excepción del paso de los 15 a los 16 años para el período que comprende los últimos 30 días.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON Y SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD						
TABLA 3.4.4	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN
Total	15,8	8,3	8,7	4,2	4,3	2,0
Sexo						
· Hombres	13,4	7,4	7,2	3,4	3,7	1,7
· Mujeres	18,2	9,1	10,2	4,9	4,8	2,3
Edad						
· 14 años	12,7	5,5	6,3	3,4	3,4	1,2
· 15 años	14,9	7,5	8,3	3,8	4,2	1,8
· 16 años	15,4	7,9	8,4	3,6	3,6	1,8
· 17 años	16,2	9,2	8,4	4,8	4,4	2,1
· 18 años	25,5	15,3	16,7	7,7	8,2	4,8

En las tablas 3.4.5.1 y 3.4.5.2 podemos observar la prevalencia en el consumo de tranquilizantes con o sin receta en el primer caso y sin receta en el segundo, por sexo y edad

simultáneamente. A la vista de los datos, podemos afirmar que las mujeres tienen, en general, mayor prevalencia de consumo, salvo en edades y períodos temporales concretos. Las diferencias son especialmente significativas entre el alumnado de 18 años.

TABLA 3.4.5.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES *CON O SIN* RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	11,4	13,9	14,1	12,3	15,5	13,8	16,0	16,6	20,2	40,1
Consumo últimos 12 meses	7	7,8	7,4	5,9	7,4	5,8	8,7	9,3	10,9	30,1
Consumo últimos 30 días	4,4	4,4	3,1	2,4	4,9	2,4	4,0	4,1	6,4	13,2

TABLA 3.4.5.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES *SIN* RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	7,0	7,3	7,3	6,8	10,0	4,4	7,9	8,3	11,5	23,2
Consumo últimos 12 meses	3,7	3,5	2,4	4,2	4,5	3,0	4,1	4,7	5,3	12,5
Consumo últimos 30 días	1,5	1,6	1,4	1,6	3,3	1,1	2,0	2,2	2,4	6,6

En cuanto a la titularidad del centro, la prevalencia de consumo de tranquilizantes es ligeramente superior entre el alumnado de centros privados, excepto en los últimos 30 días, cuando el consumo es superior en los centros públicos.

Por tipo de enseñanza, quienes cursan Ciclos Formativos de Grado Superior presentan las mayores prevalencias en los tres indicadores, excepto para el consumo de tranquilizantes con o sin receta alguna vez en la vida, cuando son superados por las y los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio.

TABLA 3.4.6 PREVALENCIAS DE TRANQUILIZANTES CON Y SIN RECETA MÉDICA SEGÚN TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN
Total	15,8	8,3	8,7	4,2	4,3	2,0
Titularidad						
· Pública	14,7	7,5	8,6	4,2	4,4	2,1
· Privada	18,0	9,8	8,9	4,2	4,1	1,9
Tipo de Enseñanza						
· E.S.O.	14,5	7,5	7,8	3,9	4,0	1,8
· Bachillerato	15,7	8,1	8,7	4,2	3,3	2,0
· Ciclo Formativo GM	23,6	12,6	12,9	4,8	8,5	2,6
· Ciclo Formativo GS	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

Respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes sin receta médica, el 12,3% de quienes los consumieron alguna vez en la vida continuaron haciéndolo en los últimos 30 días, más en el caso de las mujeres.

TABLA 3.4.7 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON Y SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO

	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN
Total	56,4	26,2	27,3	12,3	27,5	12,3
Sexo						
Hombre	54,0	24,8	27,5	11,8	27,5	11,8
Mujer	58,1	27,1	27,2	12,7	27,5	12,7

Finalmente, la edad media de inicio al consumo de tranquilizantes es de 14,16 años, (14,42 en el caso de tranquilizantes sin receta). La tabla 3.4.8. nos ofrece estos resultados e indica, asimismo, que los chicos se inician antes en el consumo que las chicas.

TABLA 3.4.8	EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES	
	CON	SIN
Total	14,16	14,42
Sexo		
Hombres	13,48	13,76
Mujeres	14,57	14,84

3.5.CANNABIS

El 41,7% del alumnado de Aragón ha consumido cannabis alguna vez en el vida, un consumo que aumenta con la edad (el 65,6% de las y los estudiantes aragoneses de 18 años reconoce haber consumido cannabis alguna vez). Por sexos, la distancia entre hombres y mujeres es de 2,6 puntos porcentuales a favor de los primeros.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.5.1	
Alguna vez	
Aragón 2010	
Total	41,7
Sexo	
Hombre	43,0
Mujer	40,4
Edad	
14 años	19,2
15 años	37,0
16 años	44,6
17 años	51,4
18 años	65,6

En los últimos 12 meses, consumió cannabis un 34,3% del alumnado aragonés encuestado, y un 21,7% lo hizo en los últimos 30 días. Para ambos indicadores, la prevalencia de consumo es superior en los hombres, y aumenta a medida que lo hace la edad de la persona que responde la Encuesta.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.5.2	
Últimos 12 meses	
Aragón 2010	
Total	34,3
Sexo	
Hombre	35,4
Mujer	33,2
Edad	
14 años	15,4
15 años	31,5
16 años	37,4
17 años	41,2
18 años	50,7

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Aragón 2010	
Total	21,7
Sexo	
Hombre	24,7
Mujer	18,7
Edad	
14 años	9,8
15 años	20,7
16 años	21,3
17 años	26,8
18 años	38,0

En la tabla 3.5.4 aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días en función de si han fumado tabaco o no en ese mismo período de tiempo.

PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS			
		CANNABIS	
		Consume	No consume
TABACO	Consume	53,2	46,8
	No consume	6,1	93,9

El contraste χ^2 es significativo, y el coeficiente de contingencia llega a 0,47, lo que supone asociación entre las dos variables. De ello se deduce que el consumo de tabaco lleva emparejado el consumo de cannabis, pues un 53,2% de las y los jóvenes aragoneses encuestados consumió ambas sustancias simultáneamente en los últimos 30 días.

TABLA 3.5.5
PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	24,0	38,4	41,9	52,8	68,4	15,0	35,8	47,0	50,2	61,5
Consumo últimos 12 meses	19,3	32,3	36,9	40,1	54,5	12,0	31,0	37,9	42,3	45,1
Consumo últimos 30 días	12,7	22,5	22,8	31,6	41,5	7,0	18,8	19,8	22,1	33,0

El consumo de cannabis es superior en hombres que en mujeres para cualquier grupo de edad, con la única excepción de los 16 años, edad en que la tasa de consumidoras de cannabis supera ligeramente a la de consumidores. Se observa además que a medida que aumenta la edad también lo hace el consumo de cannabis.

Las tablas 3.5.6.1, 3.5.6.2 y 3.5.6.3 muestran las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

TABLA 3.5.6.1
FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE CANNABIS ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	58,1	6,8	3,0	3,4	3,9	3,7	4,9	3,5	12,7
Sexo									
· Hombres	56,7	6,3	2,4	2,8	3,4	3,1	4,8	3,2	17,1
· Mujeres	59,3	7,2	3,6	4,0	4,3	4,3	5,1	3,7	8,4
Edad									
· 14 años	80,6	5,6	1,7	1,7	2,4	2,2	2,1	0,5	3,2
· 15 años	62,7	7,6	2,9	2,7	4,1	4,4	4,1	2,9	8,7
· 16 años	55,1	7,3	2,9	4,8	4,8	4,0	5,2	3,2	12,7
· 17 años	48,5	5,9	3,8	3,2	3,4	3,2	8,2	6,5	17,2
· 18 años	33,5	6,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	5,3	32,5

TABLA 3.5.6.2 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE CANNABIS LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	65,4	5,8	3,4	3,5	4,5	3,1	3,6	2,6	8,2
Sexo									
· Hombres	64,1	5,1	2,7	3,2	4,4	2,7	3,3	2,5	12,0
· Mujeres	66,6	6,4	4,2	3,8	4,5	3,5	3,9	2,6	4,5
Edad									
· 14 años	84,2	3,6	1,5	2,2	2,2	1,9	1,2	1,2	1,9
· 15 años	68,0	6,3	4,0	3,1	3,7	3,8	4,0	2,0	5,2
· 16 años	62,3	7,0	4,7	4,4	4,4	2,5	4,2	2,7	7,8
· 17 años	58,5	3,5	3,5	4,0	7,7	4,2	3,8	3,1	11,7
· 18 años	48,8	10,2	1,0	2,4	3,4	2,0	4,4	5,9	22,0

TABLA 3.5.6.3 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE CANNABIS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	78	5,7	2,9	1,8	2,2	1,8	3	4,6
Sexo								
· Hombres	74,7	5,7	2,7	1,9	2,2	2,1	3,5	7,1
· Mujeres	81,1	5,7	3,0	1,8	2,3	1,5	2,6	2,1
Edad								
· 14 años	90,3	2,9	2,4	1,0	1,0	0,7	0,7	1,0
· 15 años	79,1	6,6	3,4	1,5	2,3	2,4	2,8	2,0
· 16 años	78,5	6,3	2,5	2,3	1,9	1,8	2,7	4,1
· 17 años	73,1	6,5	2,9	2,1	3,3	1,0	3,7	7,5
· 18 años	60,8	3,9	2,9	2,0	2,9	3,9	8,8	14,7

A la vista de los datos, podemos concluir que los mayores consumidores de cannabis en Aragón son los hombres: un 20,3% han consumido dicha sustancia más de 20 días en su vida (frente al 12,1% de las mujeres), un 14,5% en los últimos 12 meses (frente al 7,1% de las mujeres), y un 7,1% en los últimos 30 días (frente al 2,1% de las mujeres).

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 14,59 años, sin que existan para esta sustancia diferencias significativas por razón de sexo en relación a este criterio, aunque el inicio de los hombres es ligeramente más temprano que el de las mujeres.

TABLA 3.5.7		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE CANNABIS	
Total		14,59	
Sexo			
Hombres		14,41	
Mujeres		14,77	

3.6.COCAÍNA

El consumo de cocaína alguna vez en la vida entre las y los jóvenes de entre 14 y 18 años de Aragón se sitúa en un 5,5%. Las mujeres reconocen consumir cocaína en menor medida que los hombres, alcanzando la brecha entre unas y otros los 3,3 puntos porcentuales. El análisis por edades refleja un incremento en las tasas de consumo a medida que aumenta la edad de la persona entrevistada, de manera que un 13,9% de jóvenes aragoneses de 18 años reconoce haber consumido cocaína alguna vez en su vida, frente al 2,4% de estudiantes de 14 años.

TABLA 3.6.1. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Alguna vez	
Aragón 2010	
Total	5,5
Sexo	
Hombre	7,2
Mujer	3,9
Edad	
14 años	2,4
15 años	3,9
16 años	5,4
17 años	6,5
18 años	13,9

Si nos centramos en los últimos 12 meses, un 4,2% dice haber consumido cocaína en este período, y si analizamos el consumo en los últimos 30 días, el porcentaje es de 2,2%. Tal y como sucedía con el consumo alguna vez en la vida, la prevalencia es mayor en los hombres, y aumenta con la edad, salvo en el paso de los 16 a los 17 años en los últimos 30 días.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 12 meses	
Aragón 2010	
Total	4,2
Sexo	
Hombre	5,8
Mujer	2,7
Edad	
14 años	2,2
15 años	3,0
16 años	4,3
17 años	5,2
18 años	9,6

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Aragón 2010	
Total	2,2
Sexo	
Hombre	3,0
Mujer	1,4
Edad	
14 años	1,4
15 años	1,8
16 años	2,6
17 años	1,9
18 años	3,4

La tabla 3.6.4.1 refleja los resultados obtenidos en cuanto a prevalencia del consumo de cocaína base por sexo y edad, mientras que la tabla 3.6.4.2 presenta los datos para la cocaína en polvo.

A la vista de ambas tablas se concluye que el consumo de cocaína en polvo es superior al de base en todos los períodos estudiados. Además, dicho consumo es más frecuente en los hombres y, en general, aumenta con la edad.

TABLA 3.6.4.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE BASE SEGÚN SEXO Y EDAD			
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Aragón 2010	Aragón 2010	Aragón 2010
Total	2,9	2,1	1,1
Sexo			
· Hombres	3,2	2,4	1,6
· Mujeres	2,6	1,7	0,8
Edad			
· 14 años	1,7	1,4	1,0
· 15 años	2,9	2,1	1,1
· 16 años	3,3	2,0	1,3
· 17 años	1,9	1,7	0,8
· 18 años	7,2	4,3	2,4

TABLA 3.6.4.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO SEGÚN SEXO Y EDAD			
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Aragón 2010	Aragón 2010	Aragón 2010
Total	4,7	3,5	1,8
Sexo			
· Hombres	6,5	5,1	2,6
· Mujeres	2,9	2,0	1,1
Edad			
· 14 años	1,9	1,2	1,0
· 15 años	2,6	2,0	1,5
· 16 años	4,8	3,6	2,1
· 17 años	6,1	4,8	1,7
· 18 años	13,0	9,6	3,4

Es interesante el análisis de la tabla 3.6.5, en el que se presenta la prevalencia en el consumo de esta sustancia tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjuntamente.

TABLA 3.6.5 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE BASE Y COCAÍNA EN POLVO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,8	3,5	3,0	1,4	9,2	1,5	2,3	3,5	2,4	4,1
Consumo últimos 12 meses	1,5	2,9	2,6	1,1	4,7	1,2	1,4	1,4	2,1	4,1
Consumo últimos 30 días	1,1	2,2	1,8	0	3,1	0,9	0	0,7	1,4	1,8

	COCAÍNA EN POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,9	4,0	6,5	7,6	18,1	1,9	1,3	3,1	4,8	5,9
Consumo últimos 12 meses	1,5	3,1	5,5	6,4	12,1	0,9	0,9	2,0	3,1	5,9
Consumo últimos 30 días	1,1	2,6	2,6	2,5	4,7	0,9	0,4	1,6	0,9	1,8

Salvo algunas excepciones, en general, tal y como se concluyó ya anteriormente, se observa que el consumo de cocaína en polvo es mayor que el consumo de cocaína base, tanto para hombres como para mujeres de cualquier edad, aunque en los hombres es mayor que en las mujeres, excepto entre el alumnado de 17 años en el caso de la base. Además, a medida que aumenta la edad, también aumenta la diferencia entre el consumo de ambos tipos de cocaína. En el caso de la cocaína en polvo, el mayor incremento en su consumo se encuentra en el paso de los 17 a los 18 para los hombres, y de los 15 a los 16 para las mujeres.

Las tablas que siguen a continuación muestran las frecuencias en el consumo de cocaína base, para alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días. Para todos los indicadores, encontramos que la mayoría de quienes han dicho haber consumido base lo han hecho un único día. El consumo es más frecuente en los hombres y, en general, aumenta con la edad.

TABLA 3.6.6.1 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA BASE ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	97,0	1,4	0,4	0,2	0,2	0	0,2	0,1	0,4
Sexo									
· Hombres	96,7	1,0	0,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,7
· Mujeres	97,3	1,7	0,2	0,1	0,2	0	0,2	0,2	0,2
Edad									
· 14 años	98,3	0,5	0,2	0	0	0,2	0,2	0	0,5
· 15 años	97,1	1,5	0,3	0,3	0	0	0,2	0,2	0,5
· 16 años	96,7	1,6	0,3	0,3	0,4	0	0,3	0	0,5
· 17 años	98,1	1,0	0,4	0	0,2	0	0	0,4	0
· 18 años	92,3	2,9	1,9	1,0	1,0	0	0	0	1,0

TABLA 3.6.6.2 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA BASE LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	97,9	0,8	0,3	0,2	0,3	0	0,1	0,2	0,2
Sexo									
· Hombres	97,7	0,7	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4
· Mujeres	98,2	0,8	0,2	0,1	0,3	0	0,1	0,2	0,1
Edad									
· 14 años	98,5	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,5	0
· 15 años	97,9	1,1	0,3	0,2	0	0,2	0,2	0	0,3
· 16 años	98,3	0,5	0,3	0,3	0,8	0	0	0,1	0,3
· 17 años	98,3	0,6	0,4	0	0,2	0	0,2	0,4	0
· 18 años	95,1	1,9	0	1,0	1,0	0	0	0	1,0

TABLA 3.6.6.3 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA BASE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	98,7	0,4	0,2	0,1	0,2	0	0,1	0,2
Sexo								
· Hombres	98,4	0,5	0,4	0,1	0,2	0	0,1	0,3
· Mujeres	99,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Edad								
· 14 años	98,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2
· 15 años	98,9	0,3	0,5	0	0	0	0,2	0,2
· 16 años	98,7	0,5	0,3	0,3	0	0	0	0,3
· 17 años	99,0	0,4	0	0	0	0,2	0,4	0
· 18 años	97,1	1,0	0	0	1,9	0	0	0

En cuanto a la cocaína en polvo, la frecuencia más habitual de consumo de esta sustancia es un único día en la vida y en los últimos 12 meses, y 2 días en los últimos 30. El análisis por sexo y edad refleja las mismas conclusiones que el de la cocaína base: consumo más frecuente en los varones, y aumento de éste conforme lo hace la edad. Los resultados se muestran en las tablas que siguen:

TABLA 3.6.6.4 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	95,3	1,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,2	0,4
Sexo									
· Hombres	93,4	1,5	0,9	0,7	1,1	0,9	0,8	0,2	0,5
· Mujeres	97,0	1,4	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Edad									
· 14 años	98,1	1,0	0	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2
· 15 años	97,4	0,8	0,5	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
· 16 años	95,3	1,4	0,8	0,9	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
· 17 años	93,7	2,1	0,4	0,2	1,7	0,6	0,4	0,4	0,6
· 18 años	86,4	3,4	1,9	1,9	0	1,9	3,4	0	1,0

TABLA 3.6.6.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	96,5	1,2	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	0,1	0,2
Sexo									
· Hombres	94,9	1,6	0,9	0,7	0,6	0,2	0,6	0,1	0,4
· Mujeres	98,1	0,8	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Edad									
· 14 años	99,0	0,2	0	0,2	0	0	0,2	0	0,2
· 15 años	97,9	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
· 16 años	96,3	1,0	0,9	0,5	0,5	0,1	0,4	0,1	0,1
· 17 años	95,0	1,9	0,4	0,6	1,0	0,2	0,2	0,4	0,4
· 18 años	90,3	3,4	1,0	1,0	0	1,5	1,9	0	1,0

TABLA 3.6.6.6 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	98,2	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Sexo								
· Hombres	97,5	0,6	1,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
· Mujeres	98,9	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1
Edad								
· 14 años	98,8	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2
· 15 años	98,5	0,6	0,5	0	0,2	0,2	0	0,2
· 16 años	97,9	0,8	0,5	0,1	0,3	0,1	0,4	0
· 17 años	98,1	0,2	0,8	0,4	0	0,2	0,4	0
· 18 años	96,1	0	1,9	0	1,0	1,0	0	0

La edad de inicio al consumo de cocaína es de 15,24 años; considerando la diferenciación entre cocaína base y cocaína en polvo, la edad de inicio al consumo de la primera variedad es de 15,15 años, y de 15,5 años para la segunda. En cualquier caso los chicos se inician al consumo de estas sustancias antes que las chicas.

TABLA 3.6.7 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE COCAINA			
	BASE	POLVO	BASE/POLVO
Total	15,15	15,50	15,24
Sexo			
Hombres	14,88	15,40	15,17
Mujeres	15,39	15,71	15,38

3.7.HEROÍNA

La prevalencia del consumo de heroína en Aragón oscila entre el 0,9% para el consumo alguna vez en la vida, y el 0,4% para el consumo en los últimos 30 días. Por sexos, el consumo es superior en los varones, y con respecto a la edad, encontramos las mayores prevalencias del consumo de heroína en los 16 años alguna vez en la vida y en los últimos 30 días, y en los 14 años para los últimos 12 meses.

TABLA 3.7.1		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Alguna vez	
		Aragón 2010	
Total		0,9	
Sexo			
Hombre		1,2	
Mujer		0,5	
Edad			
14 años		0,7	
15 años		0,9	
16 años		0,9	
17 años		0,8	
18 años		1,0	

TABLA 3.7.2		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Últimos 12 meses	
		Aragón 2010	
Total		0,5	
Sexo			
Hombre		0,7	
Mujer		0,3	
Edad			
14 años		0,7	
15 años		0,6	
16 años		0,6	
17 años		0	
18 años		1,0	

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Aragón 2010	
Total	0,4
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,3
Edad	
14 años	0,5
15 años	0,6
16 años	0,5
17 años	0
18 años	0

La edad media de inicio al consumo de heroína se sitúa en los 14,85 años, algo más en el caso de las mujeres, que se inician más tarde que los hombres en el consumo de esta sustancia.

EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE HEROÍNA	
Total	14,85
Sexo	
Hombres	14,76
Mujeres	15,06

3.8. SPEED / ANFETAMINAS

Un 5,7% del alumnado aragonés de entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez speed o anfetaminas, un consumo que es más común entre los chicos y que aumenta proporcionalmente a la edad de la persona encuestada, produciéndose el mayor incremento en el paso de los 17 a los 18 años.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.8.1	
Alguna vez	
Aragón 2010	
Total	5,7
Sexo	
Hombre	7,5
Mujer	4,0
Edad	
14 años	2,4
15 años	2,7
16 años	4,5
17 años	8,6
18 años	19,1

La prevalencia del consumo en los últimos 12 meses se sitúa en un 4,1%, y sigue el mismo patrón que el consumo alguna vez en la vida. Los datos se muestran en la tabla siguiente:

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.8.2	
Últimos 12 meses	
Aragón 2010	
Total	4,1
Sexo	
Hombre	5,9
Mujer	2,3
Edad	
14 años	2,2
15 años	2,3
16 años	3,1
17 años	6,1
18 años	12,9

En los últimos 30 días un 2% del alumnado aragonés consumió speed / anfetaminas. Por sexo y edad, se repiten los patrones anteriormente descritos, llegando al máximo de consumo durante los 18 años con un 6,3.

TABLA 3.8.3		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Últimos 30 días	
		Aragón 2010	
Total		2,0	
Sexo			
Hombre		2,5	
Mujer		1,5	
Edad			
14 años		1,4	
15 años		1,5	
16 años		1,6	
17 años		1,9	
18 años		6,3	

La edad media de inicio al consumo de speed y anfetaminas se sitúa en los 15,69 años. Las diferencias por razón de sexo son poco significativas.

TABLA 3.8.4		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS	
Total		15,69	
Sexo			
Hombres		15,66	
Mujeres		15,74	

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de speed / anfetaminas, en los últimos 30 días. La mayoría de quienes han dicho haber consumido estas sustancias alguna vez en este período lo han hecho 2 días o bien 4-5 días. El consumo es más frecuente en los hombres y aumenta con la edad.

TABLA 3.8.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE SPEED/ANFETAMINAS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	97,9	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,2	0,1
Sexo								
· Hombres	97,5	0,5	0,5	0,2	0,6	0,5	0,3	0,1
· Mujeres	98,3	0,1	0,5	0,4	0,5	0,1	0,1	0,2
Edad								
· 14 años	98,3	0,2	0,5	0,2	0,7	0	0	0
· 15 años	98,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0,2	0,2
· 16 años	98,2	0,1	0,4	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3
· 17 años	97,9	0,4	0	0	0,8	0,8	0,2	0
· 18 años	92,7	1,0	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0

3.9. ALUCINÓGENOS

Un 4,9% de las y los estudiantes aragoneses consumió alucinógenos alguna vez en la vida, un 2,9% lo hizo en los últimos 12 meses y un 1,5% en los últimos 30 días. También para esta sustancia se observan diferencias significativas en función del sexo, siendo superior la prevalencia del consumo entre los hombres. La edad resulta asimismo explicativa, puesto que el consumo aumenta proporcionalmente a ella. De esta forma, encontramos que el 17,7% del alumnado de 18 años consumió alguna vez alucinógenos, frente al 1,9% del de 14 años.

En relación a los últimos 30 días, la mayor prevalencia del consumo está también en los 18 años, con un 3,3% de jóvenes de esa edad que reconocen haber consumido alucinógenos en ese período.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.9.1	
Alguna vez	
Aragón 2010	
Total	4,9
Sexo	
Hombre	7,5
Mujer	2,4
Edad	
14 años	1,9
15 años	2,9
16 años	3,6
17 años	6,9
18 años	17,7

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.9.2	
Últimos 12 meses	
Aragón 2010	
Total	2,9
Sexo	
Hombre	4,4
Mujer	1,4
Edad	
14 años	1,4
15 años	1,8
16 años	2,8
17 años	4,2
18 años	6,7

TABLA 3.9.3		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Últimos 30 días	
		Aragón 2010	
Total			1,5
Sexo			
Hombre			2,1
Mujer			0,9
Edad			
14 años			1,0
15 años			1,1
16 años			1,3
17 años			1,9
18 años			3,3

La edad media de inicio al consumo de alucinógenos se muestra en la siguiente tabla (3.9.4.) y se sitúa en los 15,73 años. Considerando el dato por sexos, los chicos se inician al consumo de estas sustancias más tarde que las chicas.

TABLA 3.9.4		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS	
Total			15,73
Sexo			
Hombres			15,93
Mujeres			15,13

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de alucinógenos en los últimos 30 días. La mayoría de quienes han dicho haber consumido estas sustancias lo han hecho un único día. El consumo es más frecuente en los hombres y entre el alumnado de mayor edad.

TABLA 3.9.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	98,5	0,8	0,2	0,2	0,1	0,1	0	0,2
Sexo								
· Hombres	97,9	1,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0	0,3
· Mujeres	99,2	0,6	0,2	0,1	0	0	0	0
Edad								
· 14 años	98,8	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0,5
· 15 años	98,9	0,5	0	0,2	0	0,2	0	0,2
· 16 años	98,7	1,0	0,1	0,1	0	0	0	0
· 17 años	97,9	1,5	0,2	0	0,2	0	0	0,2
· 18 años	96,1	1,0	1,0	1,0	0	1,0	0	0

3.10. INHALABLES VOLÁTILES

En esta edición, un 2,0% de jóvenes estudiantes de enseñanzas secundarias de Aragón reconoció haber consumido inhalables volátiles alguna vez, un 1,0% en los últimos 12 meses y un 0,5% en los últimos 30 días.

La prevalencia del consumo es superior en los varones, aunque las diferencias con respecto a las mujeres se acortan cuanto más cercano es el período temporal analizado. En cuanto a la edad, el consumo de sustancias volátiles aumenta únicamente entre los 15 y los 16 años y en el paso de los 17 a los 18.

TABLA 3.10.1		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Alguna vez	
		Aragón 2010	
Total		2,0	
Sexo			
Hombre		3,0	
Mujer		1,1	
Edad			
14 años		2,4	
15 años		1,2	
16 años		2,1	
17 años		1,9	
18 años		2,9	

TABLA 3.10.2		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Últimos 12 meses	
		Aragón 2010	
Total		1,0	
Sexo			
Hombre		1,2	
Mujer		0,8	
Edad			
14 años		1,2	
15 años		0,6	
16 años		1,3	
17 años		1,1	
18 años		1,0	

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Aragón 2010	
Total	0,5
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,4
Edad	
14 años	0,5
15 años	0,5
16 años	0,5
17 años	0,2
18 años	1,0

La edad media de inicio al consumo de inhalables volátiles es de 13,76 años, sin que existan para esta sustancia diferencias significativas en función del sexo.

EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE INHALABLES VOLÁTILES	
Total	13,76
Sexo	
Hombres	13,73
Mujeres	13,85

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de inhalables volátiles en los últimos 30 días. La mayoría de quienes han dicho haber consumido estas sustancias lo han hecho un único día. El consumo es más frecuente en los hombres, sobre todo los que tienen 15 ó 16 años.

TABLA 3.10.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE INHALABLES VOLÁTILES LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,5	0,2	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1
Sexo								
· Hombres	99,4	0,2	0,1	0,1	0	0,1	0	0,2
· Mujeres	99,5	0,3	0,1	0,1	0	0	0	0
Edad								
· 14 años	99,5	0,5	0	0	0	0	0	0
· 15 años	99,5	0,2	0	0	0	0	0	0,3
· 16 años	99,5	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,1
· 17 años	99,6	0	0	0,2	0	0,2	0	0
· 18 años	99,0	1,0	0	0	0	0	0	0

3.11.ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El éxtasis y otras drogas de diseño han sido consumidas en alguna ocasión por un 3,9% del alumnado de Aragón, en los últimos 12 meses por un 2,8% y en los últimos 30 días por un 1,4%. Por sexos, los hombres presentan mayor prevalencia de consumo que las mujeres, mientras que si atendemos a la edad, el consumo de éxtasis y otras drogas de diseño aumenta proporcionalmente a la misma. El análisis de las prevalencias del consumo de estas sustancias en el último mes revela que el consumo de los hombres supera ampliamente al de las mujeres.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.11.1	
Alguna vez	
Aragón 2010	
Total	3,9
Sexo	
Hombre	5,2
Mujer	2,7
Edad	
14 años	2,2
15 años	2,7
16 años	3,4
17 años	5,9
18 años	8,6

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.11.2	
Últimos 12 meses	
Aragón 2010	
Total	2,8
Sexo	
Hombre	3,9
Mujer	1,7
Edad	
14 años	1,4
15 años	2,3
16 años	2,4
17 años	4,4
18 años	5,3

TABLA 3.11.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Aragón 2010	
Total	1,4
Sexo	
Hombre	2,1
Mujer	0,8
Edad	
14 años	1,0
15 años	1,1
16 años	1,4
17 años	1,9
18 años	2,9

La tabla 3.11.4. muestra la edad de inicio al consumo, total y por sexos. La edad de inicio global se sitúa en 15,72 años y, como ocurre con otras sustancias analizadas, los chicos se inician al consumo antes que sus compañeras.

TABLA 3.11.4 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE ÉXTASIS	
Total	15,72
Sexo	
Hombres	15,60
Mujeres	15,95

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de éxtasis en los últimos 30 días, un consumo que es más habitual entre los hombres que entre las mujeres, y que se limita mayoritariamente a un único día en el último mes.

TABLA 3.11.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE EXTASIS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	98,6	0,6	0,2	0,4	0	0,1	0,1	0,1
Sexo								
· Hombres	97,9	1,0	0,3	0,5	0	0,2	0	0,1
· Mujeres	99,3	0,2	0,2	0,3	0	0	0,1	0
Edad								
· 14 años	99,0	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2	0
· 15 años	98,9	0,6	0,2	0,2	0	0	0	0,2
· 16 años	98,6	0,8	0,1	0,4	0	0	0,1	0
· 17 años	98,1	0,8	0,4	0,6	0	0,2	0	0
· 18 años	97,1	0	1,0	1,0	0	1,0	0	0

3.12.GHB

En la tabla 3.12.1 se analizan las prevalencias del consumo por sexo y por edad para el GHB. Los datos indican que el consumo de GHB es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Además se aprecia una tendencia de consumo creciente según aumenta la edad, excepto en el paso de los 16 a los 17 años, cuando el consumo de esta sustancia disminuye.

TABLA 3.12.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD			
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Aragón 2010	Aragón 2010	Aragón 2010
Total	1,5	1,1	0,5
Sexo			
· Hombres	2,0	1,6	0,8
· Mujeres	1,0	0,7	0,3
Edad			
· 14 años	1,2	0,7	0,2
· 15 años	1,4	1,1	0,5
· 16 años	1,6	1,4	0,5
· 17 años	1,1	1,0	0,8
· 18 años	2,9	1,9	1,0

La tabla 3.12.2 presenta la prevalencia en el consumo de GHB por sexo y edad conjuntamente:

TABLA 3.12.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	GHB									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,5	2,0	2,2	1,4	3,3	1,0	0,9	1,1	0,9	1,8
Consumo últimos 12 meses	0,7	1,6	2,0	1,4	1,6	0,7	0,4	0,7	0,6	1,8
Consumo últimos 30 días	0,3	0,9	0,7	0,8	1,6	0,3	0,0	0,4	0,6	0,0

Los chicos de 18 años son los mayores consumidores de GHB en el indicador temporal de consumo alguna vez en la vida. El mayor incremento en el consumo de GHB se produce para ellos en el paso de los 17 a los 18 años en el consumo alguna vez y en los últimos 30 días, y entre los 14 y los 15 años en los últimos 12 meses. En el caso de las chicas, su mayor incremento lo encontramos en el paso de los 17 a los 18 años en el consumo alguna vez y en los últimos 12 meses, y de los 15 a los 16 en los últimos 30 días.

La edad de inicio al consumo de GHB, para esta edición de la encuesta ESTUDES entre las y los jóvenes aragoneses se sitúa en 15,04 años, y de nuevo es inferior en los hombres que en las mujeres.

TABLA 3.12.3		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE GHB
Total		15,04
Sexo		
Hombres		14,91
Mujeres		15,25

3.13. POLICONSUMO

En las tablas 3.13.1-3.13.3 se muestran las relaciones entre los consumos de las diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

La lectura de las tablas se realiza por filas. Es decir, y a modo de ejemplo, si queremos conocer el consumo conjunto de tabaco y alcohol alguna vez en la vida, tenemos que irnos a la casilla en la que se cruzan la fila del tabaco con la columna del alcohol, y así encontramos que el 98% de las y los jóvenes aragoneses que han consumido tabaco en ese período también han consumido alcohol.

En un análisis puramente descriptivo, hemos resaltado las relaciones de consumo que superan el 50% en color oro. Las casillas de la diagonal, con el porcentaje lógico del 100%, han sido marcadas en verde.

El consumo de cualquiera de las sustancias estudiadas está asociado al de alcohol, tabaco y cannabis como sustancias principales, sustancias éstas que presentan además una relación mutua entre ellas, de manera que el consumo de cualquiera de las tres lleva aparejado en gran medida el consumo de las dos restantes.

TABLA 3.13.1 RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA
 (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	98,0	74,2	7,7	8,7	10,6	5,5	9,3	10,6	1,1	3,3	2,5	18,9	11,6
Alcohol	59,7	100,0	53,0	5,0	6,3	7,3	3,8	6,0	7,1	1,0	2,4	1,8	16,2	9,3
Hachís	84,9	99,0	100,0	9,3	11,4	13,0	6,8	11,1	12,8	1,9	4,1	3,2	19,2	12,6
Éxtasis	92,6	99,2	97,8	100,0	57,5	62,9	33,6	59,2	63,5	13,6	18,7	29,3	29,9	22,3
Alucinógenos	83,8	98,8	96,1	45,9	100,0	51,3	26,9	45,3	49,2	10,8	16,4	24,9	29,0	20,9
Speed	88,5	98,9	95,5	43,6	44,5	100,0	23,0	56,9	58,8	9,0	17,6	12,9	27,2	19,8
Coca. Base	87,8	99,0	96,3	45,0	45,2	44,6	100,0	73,2	100,0	16,5	26,7	27,2	33,9	30,4
Coca. Polvo	93,6	99,4	98,8	49,6	47,6	68,8	45,8	100,0	100,0	12,2	16,7	22,4	22,2	21,8
Coca (B/P)	91,5	99,4	97,5	45,6	44,2	60,9	53,6	85,6	100,0	11,4	17,9	22,2	23,0	21,2
Heroína	60,5	96,2	93,5	62,8	62,3	60,1	56,7	66,9	72,9	100,0	38,7	41,8	48,0	44,4
S. Volátiles	81,8	97,0	87,7	37,7	41,4	51,1	40,0	40,1	50,0	16,9	100,0	21,3	36,2	29,0
Ghb	80,6	97,9	90,4	77,6	82,5	49,3	53,7	70,6	81,7	23,9	28,0	100,0	32,2	31,8
Tranq.	60,3	87,5	53,5	7,9	9,6	10,4	6,7	7,0	8,5	2,7	4,8	3,2	100,0	49,5
Tranq. Sin	66,6	91,0	63,4	10,6	12,4	13,6	10,8	12,4	14,0	4,6	6,8	5,7	89,0	100,0

RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ÚLTIMOS 12 MESES														
TABLA 3.13.2 (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])														
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	98,4	68,7	5,7	5,9	8,3	4,4	7,9	9,0	0,6	2,0	2,2	12,0	6,4
Alcohol	52,7	100,0	44,3	3,5	3,7	5,3	2,7	4,6	5,4	0,5	1,3	1,3	9,4	4,8
Hachís	82,9	99,4	100,0	7,7	8,0	11,2	5,8	10,0	11,7	1,2	2,3	3,1	11,3	6,3
Éxtasis	83,9	98,9	94,5	100,0	53,0	64,3	35,8	63,5	68,6	10,6	14,8	34,0	19,6	16,0
Alucinógenos	83,2	98,9	93,8	50,9	100,0	52,7	25,4	49,5	51,3	7,8	16,9	24,8	16,7	12,6
Speed	84,3	99,3	93,6	43,9	37,4	100,0	24,8	59,3	62,0	6,5	13,5	15,2	15,7	11,9
Coca. Base	87,8	98,5	97,5	48,8	36,1	49,4	100,0	67,9	100,0	14,5	21,2	27,2	26,7	24,3
Coca. Polvo	91,4	99,1	96,8	50,4	40,8	68,8	39,5	100,0	100,0	9,1	12,6	25,3	19,1	17,9
Coca (B/P)	88,2	99,3	96,1	45,8	35,6	60,7	49,0	84,3	100,0	8,4	12,5	22,0	17,3	16,9
Heroína	52,8	93,1	82,7	59,8	46,0	53,7	59,8	64,9	71,0	100,0	34,7	39,9	42,4	34,7
S. Volátiles	76,9	100,0	77,2	39,8	47,3	53,1	41,8	42,7	50,1	16,5	100,0	25,0	36,3	30,3
Ghb	81,3	97,1	94,5	85,9	65,1	56,3	50,4	80,4	83,2	17,8	23,5	100,0	18,3	30,3
Tranq.	58,8	88,4	46,1	6,5	5,8	7,7	6,5	8,1	8,7	2,5	4,5	2,4	100,0	45,5
Tranq. Sin	62,9	89,7	51,9	10,7	8,8	11,7	12,0	15,1	17,0	4,1	7,6	8,1	91,3	100,0

RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ÚLTIMOS 30 DÍAS														
TABLA 3.13.3 (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])														
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	91,4	53,2	3,3	3,5	5,2	2,8	4,7	5,4	0,7	1,0	1,2	6,2	3,3
Alcohol	45,3	100,0	30,5	1,9	2,1	2,7	1,5	2,4	2,9	0,4	0,6	0,7	4,1	2,4
Hachís	81,3	93,6	100,0	5,2	5,8	8,1	4,3	7,5	8,6	1,1	1,9	2,3	5,2	3,7
Éxtasis	75,2	90,9	79,8	100,0	41,3	43,3	39,2	49,8	58,6	16,6	17,3	25,6	16,9	17,6
Alucinógenos	76,9	93,9	84,9	39,6	100,0	39,2	33,4	45,7	47,4	11,3	18,3	21,9	13,7	13,7
Speed	86,5	91,1	88,1	30,7	29,0	100,0	30,9	51,5	57,7	11,8	13,5	11,4	13,5	11,6
Coca. Base	78,1	82,9	80,4	47,8	42,4	53,0	100,0	68,0	100,0	20,3	25,5	30,8	20,7	23,7
Coca. Polvo	86,4	90,3	90,8	39,3	37,5	57,2	44,0	100,0	100,0	10,7	15,0	29,7	14,6	18,9
Coca (B/P)	81,1	89,6	85,7	38,3	32,3	53,1	53,6	82,9	100,0	12,0	14,8	24,6	15,2	16,9
Heroína	61,3	75,3	60,3	62,5	44,3	62,5	62,5	51,1	69,2	100,0	45,5	44,3	47,7	37,5
S. Volátiles	68,7	86,2	88,1	52,3	57,8	57,8	63,3	57,8	68,7	36,7	100,0	31,3	18,4	30,3
Ghb	74,2	88,7	95,2	67,9	60,5	42,6	67,0	100,0	100,0	31,3	27,4	100,0	26,5	46,7
Tranq.	50,6	69,6	27,7	5,9	5,0	6,7	5,9	6,5	8,2	4,4	2,1	3,5	100,0	44,3
Tranq. Sin	55,4	78,9	40,3	12,6	10,2	11,7	13,8	17,1	18,4	7,1	7,1	12,6	90,3	100,0

Como hemos mencionado más arriba, alcohol, tabaco y cannabis, parecen presentar una relación mutua, en el sentido de que el consumo de cualquiera de ellas tres implica, en gran medida, el consumo de las otras dos, siendo el consumo conjunto de alcohol y hachís el que menor relación tiene.

La heroína, el GHB y el éxtasis son las sustancias que más relación de policonsumo tienen con las restantes sustancias analizadas, aunque también el consumo de cocaína y speed, y el de sustancias volátiles, especialmente en los últimos 30 días, guarda relación directa con los consumos de otras sustancias.

Por su parte, los tranquilizantes no parecen guardar ninguna relación de policonsumo con el resto de las sustancias analizadas, salvo con alcohol, tabaco y cannabis para alguna vez en la vida y para los últimos 12 meses, y únicamente con alcohol y tabaco para los últimos 30 días.

En los apartados que siguen a continuación se hace un análisis del consumo conjunto de alcohol y cannabis, y de alcohol y cocaína.

3.14. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

La tabla 3.14.1 presenta las prevalencias de consumo concomitante de alcohol y cannabis estimadas para Aragón por sexo y edad. En los últimos 12 meses, un 29,6% del alumnado aragonés encuestado consumió conjuntamente las dos sustancias en alguna ocasión.

Por sexos, se observa que el consumo conjunto de alcohol y cannabis es notablemente superior en los hombres, con 4,5 puntos porcentuales de diferencia con respecto a las mujeres. El consumo analizado está además muy ligado a la edad, de manera que aumenta conforme lo hace ésta, pasando de un 13,5% en las y los jóvenes de 14 años al 47,8% entre el alumnado de 18.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.14.1	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Aragón 2010	
Total	29,6
Sexo	
· Hombres	31,9
· Mujeres	27,4
Edad	
· 14 años	13,5
· 15 años	27,6
· 16 años	29,0
· 17 años	38,6
· 18 años	47,8

A continuación se analiza el consumo concomitante de estas dos sustancias por sexo y edad conjuntamente.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE	
TABLA 3.14.2	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Aragón 2010	
Hombres	
· 14 años	16,3
· 15 años	30,4
· 16 años	29,4
· 17 años	39,2
· 18 años	52,8
Mujeres	
· 14 años	11,0
· 15 años	25,1
· 16 años	28,6
· 17 años	37,9
· 18 años	40,7

Los 18 años son la edad en la que el consumo conjunto de alcohol y cannabis es más habitual, tanto en los hombres como en las mujeres. La mayor prevalencia del consumo concomitante de alcohol y cannabis se encuentra en los chicos de 18 años, con un 52,8% que reconocen haber consumido dichas sustancias de manera conjunta en los últimos 12 meses.

Atendiendo a la titularidad del centro, las prevalencias del consumo concomitante de estas dos sustancias son mayores en los centros públicos. En relación al tipo de enseñanza, encontramos las mayores prevalencias en el alumnado de FP de Grado Medio.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS SEGÚN TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 3.14.3	
Aragón 2010	
Total	29,6
Titularidad	
· Pública	30,4
· Privada	28,2
Tipo de Enseñanza	
· E.S.O.	26,3
· Bachillerato	29,6
· FP Grado Medio	46,1
· FP Grado Superior	42,9

3.15. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

En los 12 meses anteriores a la Encuesta, un 3,3% del alumnado de entre 14 y 18 años de Aragón consumió conjuntamente alcohol y cocaína. También en este caso, la prevalencia del consumo es superior entre los hombres. Con respecto a la edad, los datos de la tabla 3.15.1 muestran cómo el consumo simultáneo de alcohol y cocaína aumenta con los años, alcanzando su valor máximo entre el alumnado de 18 años.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.15.1	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Aragón 2010	
Total	3,3
Sexo	
· Hombres	4,5
· Mujeres	2,2
Edad	
· 14 años	1,4
· 15 años	2,6
· 16 años	2,8
· 17 años	4,6
· 18 años	8,6

Analizando el consumo concomitante de las dos sustancias por sexo y edad conjuntamente, encontramos que los chicos aragoneses presentan un consumo superior al de las chicas para todas las edades estudiadas.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE	
TABLA 3.15.2	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Aragón 2010	
Hombres	
· 14 años	1,9
· 15 años	3,6
· 16 años	3,7
· 17 años	6,1
· 18 años	10,5
Mujeres	
· 14 años	1,0
· 15 años	1,7
· 16 años	1,8
· 17 años	3,2
· 18 años	5,9

En cuanto a la titularidad del centro educativo, el consumo es superior entre el alumnado de centros públicos. Por su parte, los resultados por tipo de enseñanza indican que el mayor incremento en el consumo se produce en el paso de Bachillerato a FP de Grado Medio, y alcanza el valor máximo entre las y los estudiantes de FP de Grado Superior.


PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA SEGÚN TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 3.15.3	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Aragón 2010	
Total	3,3
Titularidad	
· Pública	3,7
· Privada	2,5
Tipo de Enseñanza	
· E.S.O.	2,9
· Bachillerato	2,7
· FP Grado Medio	6,7
· Fp Grado Superior	14,3

3.16. CANNABIS: PATRONES DE CONSUMO RELEVANTES

En la Encuesta de la presente edición figuraba un apartado específico sobre patrones relevantes de consumo de cannabis en los últimos 12 meses. En dicho apartado y a través de diferentes escalas, se dimensionan diversos comportamientos y conductas de consumo de cannabis.


En el gráfico 3.16.1. se recogen algunos de dichos patrones y comportamientos acontecidos en los últimos 12 meses. De acuerdo con esto, un 7,7% de las y los jóvenes aragoneses entrevistados fumaron cannabis antes del mediodía de manera muy o bastante frecuente. De la misma manera un 9,3% fumaron cannabis estando solos/as en los últimos 12 meses. También conviene destacar que un 7,1% de los y las estudiantes entre 14 y 18 años que han fumado cannabis en los últimos 12 meses, han tratado de reducir o dejar el consumo de cannabis sin conseguirlo de forma bastante o muy frecuente. Por último señalamos que un 3,1% del alumnado entrevistado ha tenido problemas (peleas, accidentes, malos resultados...) debido al consumo de cannabis de manera muy o bastante frecuente en los últimos 12 meses.

GRÁFICO 3.16.1. PATRONES RELEVANTES Y COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE CANNABIS




El gráfico 3.16.2 continúa en la misma línea, mostrando la frecuencia de ocurrencia de diversos hechos asociados al consumo de cannabis. Lo más destacado es que un 11,7% de las y los estudiantes aragoneses que han consumido cannabis en los últimos 12 meses han deseado poder dejarlo siempre o casi siempre; destacable es también el hecho de que un 7,1% de jóvenes que han consumido cannabis hayan pensado que no podían controlar su consumo.

GRÁFICO 3.16.2. FRECUENCIA DE DIVERSOS HECHOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE CANNABIS



Profundamente relacionado con esto, el gráfico de la página siguiente muestra las dificultades que han tenido las y los jóvenes aragoneses entrevistados para dejar o estar sin consumir cannabis en los últimos 12 meses. De acuerdo con los datos, a un 2,6% de jóvenes de entre 14 y 18 años que consumieron cannabis en el último año les resultó “imposible” dejar o estar sin consumir dicha droga en el último año; por el contrario, un 84,3% declaró que el hecho de dejar o de estar sin consumir cannabis en el último año les resultó “nada difícil”.

GRÁFICO 3.16.3. DIFICULTAD PARA DEJAR O ESTAR SIN CONSUMIR CANNABIS LOS ÚLTIMOS 12 MESES



4.OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

4.1. RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

Para medir la opinión del estudiantado acerca del riesgo del consumo de drogas de forma esporádica se les ha consultado acerca de la percepción que tienen sobre los problemas que puede acarrear, de salud, o de cualquier otro tipo, el consumo esporádico de drogas.

La tabla que figura a continuación recoge la proporción de estudiantes que considera que consumir determinadas sustancias puede acarrear **bastantes o muchos problemas** (de salud o de otro tipo).

RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO ESPORÁDICO DE DROGAS (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)	
Aragón 2010	
Cannabis	43,0
Tranquilizantes	34,0
Éxtasis	82,8
Cocaína (polvo)	79,7
Heroína	85,9

El alumnado aragonés de entre 14 y 18 años asocia al **consumo esporádico** de heroína (85,9%), éxtasis (82,8%) y cocaína en polvo (79,7%) los mayores riesgos, mientras que menos de la mitad (43%) considera que el consumo de cannabis les pueda causar problemas. Las opiniones de las y los jóvenes de entre 14 y 18 años sobre el consumo esporádico de estas drogas siguen siendo preocupantes, ya que se observa desde la pasada edición un alarmante descenso en la percepción de riesgo que tiene el estudiantado sobre los problemas que puede significar el consumo esporádico de este tipo de drogas.

Que sólo un poco más de la población entrevistada de 14 a 18 años considere que el consumo esporádico puede ser perjudicial (es decir suponer un riesgo para la salud o de otro tipo) puede indicarnos que se está “normalizando” el consumo, por lo menos en el imaginario colectivo de los estudiantes de secundaria y que, por otra parte, no hay mensajes que calen entre este colectivo en cuanto a los problemas que acarrea el consumo de estas sustancias.

En cuanto a las drogas socialmente más aceptadas, observamos que son las que, por ende, presentan menores índices de preocupación. Es el caso del cannabis, con un ya mencionado riesgo de preocupación del 43%.

En la siguiente tabla observamos la **percepción del riesgo**, esta vez ante el **consumo habitual** de diversas sustancias:

RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO HABITUAL DE DROGAS (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)	
Aragn 2010	
Tabaco (un paquete diario)	89,6
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	34,8
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	52,3
Cannabis	86,0
Tranquilizantes	84,6
Éxtasis	96,5
Cocaína (polvo)	96,8
Heroína	96,8

Si tenemos en cuenta las opiniones vertidas en cuanto al consumo habitual, el mayor riesgo percibido es para la heroína y la cocaína en polvo (96,8%), seguidas de cerca por el éxtasis (96,5%).

El alcohol, una de las drogas más aceptada socialmente, es la que obtiene menores valores para este indicador: 5 ó 6 copas de alcohol en un fin de semana (34,8%) y 1 ó 2 copas de alcohol cada día (52,3%).

La siguiente tabla nos muestra el porcentaje de riesgo percibido para el consumo habitual de sustancias desagregado por sexo y edad. En ella observamos, tal y como ocurría en otras ediciones de la Encuesta ESTUDES, que las mujeres perciben un mayor riesgo que los hombres para todas las sustancias.

TABLA 4.1.3 RIESGO PERCIBIDO EN CONSUMO HABITUAL POR SEXO Y EDAD								
	SEXO		EDAD					Total
	Hombre	Mujer	14	15	16	17	18	
Tabaco (un paquete diario)	88,2	91,0	86,8	87,7	91,9	89,1	93,3	89,3
Alcohol (5 ó 6 cañas fin de semana)	34,1	35,5	44,8	35,8	36,3	29,6	19,6	34,8
Alcohol (1 ó 2 cañas cada día)	47,5	56,7	54,3	52,7	53,9	48,6	50,0	52,3
Cannabis	81,2	90,6	91,7	86,3	87,3	83,0	77,0	86,0
Tranquilizantes	81,9	86,8	83,9	85,4	84,6	83,7	86,3	84,6
Éxtasis	94,5	98,4	95,7	95,5	97,2	98,0	94,7	96,5
Cocaína (polvo)	95,1	98,3	96,0	95,7	97,8	97,8	94,3	96,8
Heroína	94,7	98,8	96,2	96,0	97,2	98,7	94,9	96,8

Si tenemos en cuenta la edad, observamos que a pesar de que el riesgo percibido de fumar tabaco se mantiene casi constante en todas las edades, la percepción de riesgo que conlleva el consumo de cannabis, sustancia estrechamente relacionada con el tabaco, disminuye conforme aumenta la edad. La valoración más acusada la encontramos a los 14 años.

En las tablas siguientes, se observan las percepciones, por sexo y por edad, de las y los estudiantes aragoneses de entre 14 y 18 años que estiman que consumir las sustancias por las que se les ha consultado de forma puntual o habitual, pueden causar muchos problemas.

PREVALENCIA DE CONSUMO ESPORÁDICO SEGÚN SEXO Y EDAD (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)								
TABLA 4.1.4	SEXO		EDAD					Total
	Hombre	Mujer	14	15	16	17	18	
Tabaco	9,2	6,6	7,5	6,0	9,3	7,6	9,3	7,9
Tranquilizantes	19,8	13,9	15,8	15,4	15,4	18,5	21,7	16,7
Cannabis	17,5	20,1	29,0	20,1	16,6	18,5	6,3	18,9
Cocaína (base)	49,0	47,3	43,4	48,8	45,0	53,2	54,1	48,1
Cocaína (polvo)	45,2	40,4	38,8	42,6	39,7	47,6	48,7	42,7
Éxtasis	47,6	45,0	41,7	46,1	43,3	49,2	58,5	46,3
Heroína	54,9	47,5	45,6	50,2	50,0	52,6	62,4	51,1

PREVALENCIA DE CONSUMO HABITUAL SEGÚN SEXO Y EDAD
(prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)

TABLA 4.1.5

	SEXO		EDAD					Total
	Hombre	Mujer	14	15	16	17	18	
Tabaco	49,8	50,4	46,6	45,0	54,2	49,0	59,3	50,1
Alcohol (5 o 6 cañas fin de semana)	6,7	7,8	10,4	7,9	7,5	5,1	3,8	7,3
Alcohol (5 o 6 cañas cada día)	53,7	60,0	60,0	57,5	57,4	54,3	54,9	56,9
Tranquilizantes	45,7	43,1	42,1	42,6	43,9	46,3	50,9	44,3
Cannabis	53,1	60,2	71,3	59,3	54,5	52,5	42,5	56,8
Cocaína (base)	83,8	84,3	81,0	83,5	84,8	87,7	79,3	84,0
Cocaína (polvo)	81,8	84,4	79,8	81,7	86,8	82,2	81,0	83,1
Éxtasis	81,3	84,5	80,5	81,4	86,5	82,1	80,8	82,9
Heroína	84,0	86,4	81,4	84,1	87,6	85,6	85,9	85,2

El riesgo percibido en el consumo habitual es superior al percibido en el consumo esporádico. Y para ambos tipo de comportamientos, la percepción del consumo de drogas como la cocaína (base y polvo), el éxtasis y la heroína, es mucho mayor que la de las drogas legales como el tabaco o el alcohol.

Si tenemos en cuenta los resultados por sexo, en la percepción del riesgo por el consumo esporádico de estas sustancias, observamos que los chicos aragoneses perciben mayor riesgo que las chicas en el consumo de todas las sustancias consideradas, a excepción del cannabis. Esta tendencia se invierte si tenemos en cuenta el consumo habitual, en donde son las chicas las que perciben unos mayores problemas derivados del consumo de estas sustancias.

En cuanto a la edad, observamos que es el alumnado de 14 años el más preocupado por los riesgos del consumo de alcohol y cannabis, y el de 16 el que en mayor medida piensa que el consumo de cocaína en polvo, éxtasis y heroína puede causar muchos problemas. En relación al tabaco, la mayor tasa de riesgo se encuentra en los 18 años, al igual que los tranquilizantes. Por su parte, la mayor prevalencia de estudiantes que piensan que el consumo de cocaína base puede causar muchos problemas se encuentra en los 17 años.

4.2. DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

¿Cómo analizamos la accesibilidad a las diferentes sustancias incluidas en la Encuesta?

La accesibilidad a las diferentes sustancias que se incluyen en la Encuesta se mide a través de la dificultad que observan las y los escolares para conseguirlas en caso de querer hacerlo.

Si observamos la siguiente tabla, vemos la comparación de la percepción que tiene el alumnado de 14 a 18 años sobre la dificultad de acceder a las diferentes sustancias incluidas en la Encuesta, medida como el porcentaje de alumnos que consideran que les resulta o resultaría muy fácil o relativamente fácil conseguirlas.

TABLA 4.2.1	DISPONIBILIDAD PERCIBIDA PARA LAS DROGAS (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga)	
	Aragón 2010	
Alcohol	96,2	
Tranquilizantes	68,6	
Cannabis	79,8	
Cocaína (polvo)	44,4	
Heroína	29,6	
Anfetaminas	47,3	
Éxtasis	35,4	
Alucinógenos	45,0	
Sustancias Volátiles	-	

Tal y como ocurría en anteriores ediciones el alcohol y el cannabis siguen siendo las sustancias más accesibles, con un 96,2% y 79,8% respectivamente, de estudiantes que consideran que son sustancias que se pueden conseguir de forma relativamente fácil o muy fácil.

5. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

¿Se sienten las y los jóvenes suficientemente informados en relación con el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados a ellas?

Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, las y los jóvenes de Aragón se sienten suficientemente informados en relación con el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados: un 41,5% declara sentirse suficientemente informado y un 40,2% perfectamente informado.

TABLA 5.1		INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS
		Aragón 2010
· Perfectamente informado		40,2
· Suficientemente informado		41,5
· Informado a medias		15,1
· Mal informado		3,1

Si nos fijamos en la información recibida sobre el consumo de drogas teniendo en cuenta el sexo y la edad, observamos que los hombres declaran en mayor porcentaje que las mujeres sentirse perfectamente informados sobre este tema. Por edad, a medida que las y los estudiantes se “hacen mayores” se van sintiendo mejor informados.

Por titularidad del centro, apenas existen diferencias para este criterio, mientras que por tipo de enseñanza, y en coherencia con las conclusiones del análisis por edad, este sentimiento es mayor en los tipos de enseñanza más avanzados.

TABLA 5.2 INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS


	MAL INFORMADO	PERFECTAMENTE INFORMADO	SUFICIENTEM. INFORMADO	INFORMADO A MEDIAS
Total	3,1	40,2	41,5	15,1
Sexo				
· Hombres	3,3	46,8	38,2	11,7
· Mujeres	3,0	33,8	44,7	18,4
Edad				
· 14 años	3,0	35,2	43,3	18,6
· 15 años	3,1	41,5	43,4	12,0
· 16 años	3,9	35,6	42,5	18,0
· 17 años	1,8	44,8	39,8	13,6
· 18 años	4,0	52,4	32,7	10,9
Titularidad				
· Público	2,6	40,1	42,0	15,3
· Privado	4,0	40,5	40,6	14,8
Tipo de Enseñanza				
· ESO	3,4	40,1	42,2	14,4
· Bachillerato	2,7	34,9	44,8	17,5
· CF Grado Medio	3,5	56,3	29,1	11,1
· CF Grado Superior	0,0	85,7	0,0	14,3

Si observamos el siguiente gráfico que refleja las principales vías por las que la juventud aragonesa ha recibido información sobre drogas, así como otras vías por las que podrían recibir información, concluimos que casi todas las propuestas tienen relevancia.

Las vías más habituales para recibir información son las madres (71,5%), las charlas o cursos (68,3%) y los padres (66,2%). Se observa también que parientes tan cercanos como son los hermanos y hermanas, tan sólo son citados por un 17,8% del alumnado.

En cuanto a las vías preferidas por las y los jóvenes aragoneses para recibir información sobre drogas, el 48,7% considera que podría recibir una información mejor y más objetiva por parte de profesionales sanitarios, y un 46,8% a través de charlas o cursos.

GRÁFICO 5.1: PRINCIPALES VÍAS DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS Y OTRAS VÍAS POR LAS QUE PODRÍAN RECIBIR INFORMACIÓN



6. ENTORNO SOCIAL

Si tenemos en cuenta el entorno social del alumnado, observamos los resultados que se presentan a continuación.

Respecto al consumo de drogas en el entorno social de las y los estudiantes y en su grupo de iguales, en esta edición de la Encuesta ESTUDES para Aragón, los resultados que muestran el consumo en los últimos 30 días, nos indica que el 81,2% afirma que en su entorno han consumido tabaco.

El alcohol sigue siendo la sustancia más generalizada, y así, el 87,3% de las y los jóvenes aragoneses declaran que en el grupo de amistades han consumido alcohol en los últimos 30 días.

Si tenemos en cuenta otras drogas como el hachís, el 56,7% de las amistades de las y los jóvenes encuestados han consumido esta sustancia, lo que la sitúa como la tercera más consumida en el grupo de iguales del alumnado que compone la muestra.

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos según sexo para el consumo de drogas en el grupo de iguales y para todas las sustancias, entendiendo por grupo de iguales, las y los amigos y compañeros con quienes el/la joven se relaciona habitualmente. En este sentido, cabe destacar que la brecha más amplia entre hombres y mujeres corresponde al consumo de hachís, sustancia cuyo consumo es 3 puntos porcentuales superior en el grupo de iguales de los hombres que en el de las mujeres.

TABLA 6.1 CONSUMO DE DROGAS EN EL GRUPO DE IGUALES POR SEXO			
	HOMBRE	MUJER	TOTAL
· Tabaco	86,2	88,4	87,3
· Bebidas alcohólicas	91,4	93,5	92,5
· Tranquilizantes	8,1	10,1	9,1
· Hachís	58,2	55,2	56,7
· Cocaína (polvo)	13,1	12,5	12,8
· Heroína	5,3	5,0	5,1
· Speed	16,0	13,2	14,6
· Éxtasis	9,3	8,4	8,9
· Alucinógenos	12,8	11,1	11,9
· Sustancias volátiles	4,5	3,0	3,8

La siguiente tabla hace referencia a diversos accidentes que ha sufrido el alumnado, causas que los motivaron e implicación de distintas drogas en ellos.

Un 15,9% de las y los alumnos de secundaria de Aragón reconocen haber intervenido en alguna pelea. De ellos, el 42,6% declaró haber consumido alcohol en las 2 horas previas a producirse la misma.

Por su parte, un 5,2% fue detenido por la policía o la guardia civil en los últimos 12 meses, de quienes un 36,8% expresó haber consumido alcohol y un 38,6% hachís durante las dos horas anteriores a haberse producido la detención.

TABLA 6.2 PORCENTAJE DE JÓVENES INVOLUCRADOS EN ALGUNA INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS DURANTE LAS 2 HORAS ANTERIORES A ÉSTA

	Alumnos implicados	Alcohol	Hachis	Cocaína	Anfetam. Extasis	Tranquil.	Otras
. Accidente que requirió asistencia médica	2,8	16,4	27,7	6,8	0	0	0
. Interviniste en alguna pelea	15,9	42,6	21,2	3,2	0	0	0
. Precisaste asistencia sanitaria urgente	7,5	14,1	7,3	2,7	0	0	0
. Fuiste detenido por la policía o guardia civil	5,2	36,8	38,6	4,8	0	0	0

Si tenemos en cuenta las relaciones que los chavales y chavalas mantienen con sus padres, éstas son mejores con la madre que con el padre, tal y como se refleja en la siguiente tabla: el 81,1% considera que son muy o bastantes buenas con su padre, y el 87,9% opina lo mismo de las relaciones con su madre.

TABLA 6.3 ¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES?

	PADRE					MADRE				
	MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULAR	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS	MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULAR	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS
Total	1,9	2,0	14,2	38,8	43,2	0,7	1,4	10,0	36,7	51,2
Sexo										
· Hombre	1,3	1,6	12,6	37,4	47,1	0,5	1,3	9,5	37,0	51,8
· Mujer	2,4	2,3	15,7	40,2	39,3	0,8	1,5	10,4	36,5	50,7
Edad										
· 14 años	1,6	1,1	10,3	38,5	48,5	0,4	0,3	8,7	37,9	52,7
· 15 años	1,3	2,8	12,6	40,4	43,0	1,1	2,1	10,9	36,9	49,0
· 16 años	1,9	2,4	15,1	40,6	40,1	0,4	1,6	9,0	38,4	50,7
· 17 años	1,3	1,3	15,9	36,6	44,9	0,4	0,7	11,2	33,4	54,3
· 18 años	5,9	1,2	19,1	33,7	40,2	1,5	2,5	10,4	35,7	50,0
Titularidad										
· Público	1,8	2,0	14,0	38,7	43,6	0,6	1,3	9,4	36,8	51,8
· Privado	2,1	2,0	14,5	39,1	42,4	0,7	1,5	11,1	36,5	50,2
Tipo Enseñanza										
· ESO	1,7	2,4	12,4	39,4	44,1	0,9	1,5	10,1	37,2	50,3
· Bachillerato	1,5	1,5	14,9	39,8	42,4	0,5	1,1	8,6	37,8	52,1
· CFGM	3,6	1,6	21,4	35,1	38,3	0,0	2,3	14,7	32,4	50,6
· CFGS	14,3	0,0	0,0	0,0	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Otra cuestión acerca de la cual se consultaba al alumnado era sobre la experimentación de diversas situaciones como discusiones con padres y hermanos o hermanas, robos, escapadas de casa o expulsiones del centro de estudios en los últimos 12 meses. Los resultados para estas cuestiones se observan en la tabla 6.4.

TABLA 6.4 SITUACIONES EXPERIMENTADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO				
	CONFLICTO O DISCUSIÓN IMPORTANTE CON PADRES O HERMANOS	SUFRIR UN ROBO O UN ATRACO	ESCAPARSE DE CASA MÁS DE UN DÍA	HABER SIDO EXPULSADO DEL CENTRO EDUCATIVO UN DÍA O MÁS
Total	32,4	9,1	2,4	3,9
Sexo				
· Hombres	28,2	11,1	2,7	6,5
· Mujeres	36,5	7,3	2,2	1,3
Edad				
· 14 años	22,9	11,2	1,7	3,2
· 15 años	30,3	8,2	2,4	3,2
· 16 años	36,2	10,2	2,5	3,8
· 17 años	34,1	7,1	2,3	4,2
· 18 años	39,6	9,1	3,4	7,2
Titularidad				
· Público	31,6	7,6	2,3	4,6
· Privado	34,0	12,0	2,7	2,5

Los conflictos con padres o hermanos/as resultan ser la situación más común, con un 32,5% de jóvenes aragoneses que han afirmado haber experimentado esta situación en el último año, con diferencias importantes en función del sexo. Tan solo un 2,4% ha reconocido haberse escapado de su casa durante más de un día, y un 3,9% ha sido expulsado de su centro educativo durante un día o más, situación ésta más común entre los hombres que entre las mujeres.

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos acerca de la aplicación de distintas normas fijadas por los padres, en función del sexo, la edad y titularidad del centro en el que el alumnado que respondió a la encuesta está matriculado:

TABLA 6.5 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES FIJAN NORMAS CLARAS DE LO QUE PUEDO HACER EN CASA					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	6,5	9,0	15,4	26,1	43,0
Sexo					
· Hombres	6,2	8,2	15,6	27,9	42,2
· Mujeres	6,8	9,8	15,2	24,4	43,8
Edad					
· 14 años	4,1	6,7	15,9	26,3	47,0
· 15 años	6,4	8,6	16,3	26,1	42,6
· 16 años	6,4	9,5	15,6	25,4	43,0
· 17 años	8,8	9,6	16,3	26,0	39,4
· 18 años	6,1	11,2	8,5	28,9	45,3
Titularidad					
· Público	7,0	10,1	15,1	24,8	43,0
· Privado	5,5	6,9	16,0	28,6	43,0

TABLA 6.6 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES FIJAN NORMAS CLARAS DE LO QUE PUEDO HACER FUERA DE CASA					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	15,9	16,8	26,2	23,3	17,8
Sexo					
· Hombres	16,2	17,0	25,4	23,5	17,8
· Mujeres	15,5	16,7	26,9	23,1	17,9
Edad					
· 14 años	10,8	13,7	24,4	26,6	24,5
· 15 años	14,2	14,3	26,4	23,0	22,2
· 16 años	15,7	16,6	26,0	24,4	17,4
· 17 años	17,9	22,6	26,8	20,1	12,6
· 18 años	26,9	17,7	28,0	21,9	5,4
Titularidad					
· Público	16,3	19,3	25,4	21,7	17,3
· Privado	15,0	12,2	27,5	26,4	18,9

TABLA 6.7 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES SABEN <u>CON QUIÉN ESTOY</u> CUANDO SALGO POR LAS NOCHES					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	5,5	5,5	13,5	20,3	55,1
Sexo					
· Hombres	6,9	6,3	14,5	22,5	49,8
· Mujeres	4,2	4,7	12,6	18,3	60,3
Edad					
· 14 años	5,1	3,0	16,9	19,7	55,4
· 15 años	5,6	4,4	14,5	20,8	54,7
· 16 años	5,1	5,2	13,1	19,8	56,8
· 17 años	4,5	8,9	11,2	18,8	56,6
· 18 años	10,2	6,7	11,2	26,2	45,7
Titularidad					
· Público	5,4	5,4	13,2	20,1	55,9
· Privado	5,7	5,7	14,2	20,7	53,7

TABLA 6.8 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES SABEN <u>DÓNDE ESTOY</u> CUANDO SALGO POR LAS NOCHES					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	7,2	9,0	17,5	22,6	43,6
Sexo					
· Hombres	10,2	11,3	16,9	23,5	38,2
· Mujeres	4,4	6,8	18,1	21,8	48,9
Edad					
· 14 años	9,5	5,8	21,8	23,0	39,9
· 15 años	7,6	10,8	17,6	22,6	41,5
· 16 años	7,1	8,1	17,0	23,3	44,5
· 17 años	4,9	9,8	14,8	20,7	49,7
· 18 años	8,1	11,3	17,2	24,2	39,3
Titularidad					
· Público	7,0	8,4	16,4	21,9	46,3
· Privado	7,7	10,2	19,6	24,0	38,6

TABLA 6.9 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
PUEDO FÁCILMENTE RECIBIR CARIÑO Y CUIDADO DE <u>MI MADRE Y/O MI PADRE</u>					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
	1,9	2,3	7,7	17,8	70,4
Sexo					
· Hombres	2,3	2,9	10,7	19,3	64,8
· Mujeres	1,4	1,7	4,9	16,3	75,8
Edad					
· 14 años	1,1	1,4	4,8	17,2	75,4
· 15 años	2,0	1,8	7,8	15,7	72,7
· 16 años	1,9	2,4	7,4	19,0	69,3
· 17 años	1,7	2,1	9,7	17,5	69,0
· 18 años	3,2	5,3	9,4	21,6	60,5
Titularidad					
· Público	2,3	2,6	8,3	18,5	68,2
· Privado	0,9	1,6	6,5	16,5	74,4

TABLA 6.10 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
PUEDO FÁCILMENTE RECIBIR CARIÑO Y CUIDADO DE <u>MI MEJOR AMIGO/A</u>					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	1,9	2,3	8,5	23,6	63,8
Sexo					
· Hombres	2,9	3,4	13,6	29,8	50,4
· Mujeres	0,9	1,2	3,6	17,6	76,7
Edad					
· 14 años	2,0	2,8	8,1	23,3	63,8
· 15 años	1,6	1,7	9,0	20,5	67,2
· 16 años	2,6	1,6	8,5	23,9	63,4
· 17 años	1,4	2,0	7,9	22,8	65,8
· 18 años	0,9	6,2	9,3	34,6	49,0
Titularidad					
· Público	2,0	2,3	9,0	23,7	63,0
· Privado	1,5	2,2	7,6	23,4	65,2

En las tablas presentadas se observa cómo a la hora de fijar normas fuera de casa los padres son menos estrictos que cuando se trata de fijar las normas sobre lo que las y los jóvenes pueden hacer en casa.

Según el 55,1% del alumnado encuestado, sus padres casi siempre saben con quién están cuando salen por las noches, y según el 43,6%, casi siempre saben dónde se encuentran.

Un 70,4% considera que casi siempre puede recibir fácilmente cariño y cuidado de su padre o de su madre, y un 63,8% afirma lo mismo con respecto a su mejor amigo o amiga. En ambos casos, las percepciones acerca de la facilidad para recibir cariño y cuidado son más comunes en las mujeres.



7. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

Con el objetivo de estudiar un perfil más detallado de aquellos jóvenes con consumos intensos de distintas sustancias, se ha analizado de forma conjunta algunas de las situaciones. El resultado de dicho análisis son las siguientes tablas. La primera de ellas refleja las relaciones de las y los jóvenes con sus padres según el tipo de consumo diario de tabaco (consumidores y no consumidores):

¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES?		
TABLA 7.1.1 (según consumo de tabaco)		
	No consume	Consume
PADRE		
· Muy malas	1,6	2,6
· Bastante malas	1,7	2,7
· Regulares	12,1	19,4
· Bastante buenas	39,1	38,0
· Muy buenas	45,5	37,3
MADRE		
· Muy malas	0,5	1,0
· Bastante malas	0,9	2,5
· Regulares	9,1	12,2
· Bastante buenas	35,5	39,1
· Muy buenas	53,9	45,1

Si tenemos en cuenta las respuestas, parece que existe relación entre el consumo diario de tabaco y las relaciones del alumnado con sus padres, en el sentido de que las relaciones con ambos progenitores son calificadas como mejores por quienes no consumen dicha sustancia.

Realizando un test χ^2 para cada uno de los progenitores, no se obtienen valores significativos, por lo que no se puede inferir una relación entre el consumo diario de tabaco y las relaciones de los jóvenes con sus padres.

En la siguiente tabla se observan los porcentajes obtenidos para el consumo diario de tabaco según el tipo de relación con sus progenitores:

¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES?		
TABLA 7.1.2 (según tipo de relación)		
	No consume	Consume
PADRE		
· Muy malas	59,7	40,3
· Bastante malas	60,1	39,9
· Regulares	60,4	39,6
· Bastante buenas	71,5	28,5
· Muy buenas	74,9	25,1
MADRE		
· Muy malas	54,8	45,2
· Bastante malas	47,2	52,8
· Regulares	64,4	35,6
· Bastante buenas	68,7	31,3
· Muy buenas	74,3	25,7

Si observamos los resultados en este sentido, es decir según el tipo de relación que mantienen bien con la madre o bien con el padre, vemos con mayor claridad este tipo de relación entre el consumo diario de tabaco y la relación con los padres. Si tenemos en cuenta las relaciones con el padre, observamos como entre quienes las consideran muy buenas, el 74,9% no consumen tabaco a diario, porcentaje que cae drásticamente hasta un 25,1% entre quienes sí reconocen consumir tabaco. La misma tendencia se observa en la relación con la madre.

Si analizamos ahora si existe o no correspondencia entre el hecho de que fume alguna de las personas con las convive la persona encuestada y el comportamiento del consumo diario de tabaco que ésta presenta, observamos que cuando ninguna de las personas con las que se convive fuma, el 79% no fuma a diario, y solo lo hace el 21%. Si se convive con personas fumadoras, este último porcentaje se incrementa hasta un 37,8%, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

TABLA 7.2			¿ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVES FUMA DIARIAMENTE?	
	No consume		Consumo	
· No	79,0		21,0	
· Sí	62,2		37,8	
· Vives en un centro educativo	58,1		41,9	
· Vives solo/a	26,5		73,5	

Un análisis de *residuos corregidos* permite establecer con claridad el sentido de las relaciones entre ambas variables. Cuando ninguna de las personas con las que se convive fuma, existe una relación inversa, es decir, convivir con gente no fumadora aumenta las probabilidades de no fumar diariamente. Mientras que convivir con gente fumadora es determinante para que el joven termine fumando diariamente. Para los casos de residencia en un centro educativo o para quienes viven solos, el reducido número de casos hace inadecuado contrastar estas situaciones.

Si tenemos en cuenta la relación entre el consumo diario de tabaco y el permiso paterno y/o materno para fumar, parece que esta variable influye también en el hecho de que las y los jóvenes decidan hacerlo o no, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

TABLA 7.3			PERMISO PATERNO Y MATERNO PARA FUMAR	
	No consume		Consumo	
PADRE				
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	33,2		66,8	
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	39,0		61,0	
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	80,3		19,7	
· No sabe	76,3		23,7	
MADRE				
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	30,4		69,6	
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	33,5		66,5	
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	83,7		16,3	
· No sabe	78,2		21,8	

Analizando los resultados obtenidos (porcentajes y residuos) vemos que tanto el padre como la madre presentan patrones idénticos, y no existe una clara relación entre el permiso de los progenitores y el comportamiento de las y los chavales respecto al consumo de tabaco.

Observamos que un 66,8% del alumnado que cuenta con el permiso paterno para fumar en cualquier sitio, y un 69,6% de quienes tienen permiso de su madre para hacerlo, consume tabaco habitualmente.

Siguiendo con este análisis, se ha querido comprobar si existe relación entre el hecho de repetir algún curso y el consumo de tabaco, tal y como refleja la tabla que se presenta a continuación:

TABLA 7.4		
¿HAS REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ?		
	No consume	Consume
· No	77,8	22,2
· Sí, un curso	57,5	42,5
· Sí, dos o más cursos	51,8	48,2

Tres son las posibles respuestas que obtenemos y que pueden tener una relación con el hecho de fumar diariamente. Si nunca se ha repetido ningún curso parece que las probabilidades de que el alumno o alumna fume diariamente se reducen, y a la inversa. El análisis de los *residuos corregidos* permite corroborar que el sentido de esta relación es el mencionado.

Paralelamente al análisis realizado para el consumo diario de tabaco, se ha realizado un análisis para el consumo intenso de alcohol.

La tabla que sigue a continuación nos permite confirmar cómo son las relaciones con los padres según si durante los 30 días anteriores a la realización de la Encuesta se ha consumido o no alcohol.

TABLA 7.5		
RELACIONES CON LOS PADRES EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS		
	No consume	Consume
PADRE		
· Muy malas o Bastante malas	30,8	69,2
· Regulares	24,8	75,2
· Bastante buenas o Muy buenas	29,4	70,6
MADRE		
· Muy malas o Bastante malas	25,5	74,5
· Regulares	22,4	77,6
· Bastante buenas o Muy buenas	29,6	70,4

A la vista de los datos, encontramos las menores tasas de consumo de alcohol entre quienes califican de bastante o muy buenas las relaciones con su madre, mientras que para las relaciones con el padre, la menor tasa de consumo de alcohol corresponde a quienes las califican como bastante o muy malas. Si analizamos esta situación, vemos que ambos contrastes χ^2 no son significativos, y del análisis de residuos tampoco se puede señalar una relación estadísticamente significativa. Por ello, no se puede concluir de manera categórica que cuanto mejores sean las relaciones de las y los jóvenes con sus padres, menores serán las probabilidades de que se hayan emborrachado, al menos una vez, durante el mes anterior a la realización de la Encuesta.

La tabla 7.6 presenta la relación entre el permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas y el hecho de haberse emborrachado en alguna ocasión. Igual que ocurría con el consumo diario de tabaco, parece que existe también algún tipo de relación entre ambas variables. Si observamos los resultados obtenidos mediante el análisis de los porcentajes y de los *residuos corregidos* vemos que la relación existente es en el mismo sentido para ambos padres. Cuando no permiten que sus hijos e hijas consuman alcohol, se establece una mayor probabilidad de que éstos no lo hagan, mientras que si sí les permiten beber, ya sea en cualquier sitio o sólo fuera de casa, aumentan las probabilidades de que se hayan emborrachado alguna vez durante los últimos 30 días.

TABLA 7.6 PERMISO PATERNO Y MATERNO PARA TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
	No consume	Consumo
PADRE		
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	11,3	88,7
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	15,5	84,5
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	43,6	56,4
· No sabe	36,1	63,9
MADRE		
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	10,9	89,1
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	14,6	85,4
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	44,6	55,4
· No sabe	38,6	61,4

Hasta el momento, observamos que el comportamiento del consumo intenso de alcohol es prácticamente igual al del consumo diario de tabaco. Nos planteamos ahora conocer si el haber repetido curso alguna vez influye también en las borracheras de las y los chavales durante los últimos 30 días. Los datos se presentan en la siguiente tabla:

TABLA 7.7	¿HAS REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ?	
	No consume	Consume
· No	31,7	68,3
· Sí, un curso	25,1	74,9
· Sí, dos o más cursos	18,4	81,6

A medida que se aumenta el número de cursos repetidos, aumenta el porcentaje de estudiantes que se ha emborrachado alguna vez durante los últimos 30 días, aumentando desde un 68,3% entre quienes no han repetido curso en ninguna ocasión hasta un 81,6% entre quienes han repetido dos o más cursos.

El contraste χ^2 no revela existencia de relación entre ambas variables, de manera que no se puede concluir que el hecho de repetir curso influya las posibilidades de que el alumno o la alumna se haya emborrachado, al menos una vez, durante el mes previo a la realización de la Encuesta.

Siguiendo la misma tendencia, se han construido las siguientes tablas (7.8.1 y 7.8.2), en las que se analiza el estado de las relaciones que las y los jóvenes mantienen con su padre y su madre respectivamente, en función del consumo diario de las distintas sustancias que se han venido analizando a lo largo de la Encuesta.

TABLA 7.8.1

RELACIONES CON EL PADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

		MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULARES	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS
TABACO	NO CONSUME	1,2	1,8	11,5	38,8	46,8
	CONSUME	3,3	2,3	19,8	38,8	35,8
ALCOHOL	NO CONSUME	1,5	2,4	12,6	35,6	47,9
	CONSUME	2,0	1,6	15,5	39,8	41,2
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	1,0	1,2	12,4	39,6	45,7
	CONSUME	2,8	2,4	17,7	38,8	38,3
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	1,5	1,9	14,0	39,1	43,5
	CONSUME	10,7	3,6	17,4	32,9	35,4
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	1,6	1,9	14,2	39,0	43,3
	CONSUME	16,8	3,3	12,4	31,9	35,6
HACHIS	NO CONSUME	1,5	1,8	12,7	39,1	44,9
	CONSUME	3,3	2,4	19,6	37,8	36,8
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	1,8	2,0	14,0	38,8	43,3
	CONSUME	4,8	0,0	26,4	40,3	28,5
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	1,8	2,0	14,1	38,9	43,2
	CONSUME	4,7	3,5	15,2	33,8	42,8
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	1,8	1,9	14,1	38,9	43,3
	CONSUME	4,0	3,0	18,2	37,4	37,5
GHB	NO CONSUME	1,8	2,0	14,1	38,8	43,2
	CONSUME	9,6	0,0	21,2	37,8	31,5
ÉXTASIS	NO CONSUME	1,8	2,0	14,0	38,8	43,4
	CONSUME	5,5	0,0	26,7	42,1	25,7
SPEED	NO CONSUME	1,8	2,0	14,2	39,1	43,0
	CONSUME	8,0	1,6	13,8	24,3	52,3
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	1,8	2,0	14,1	38,9	43,3
	CONSUME	5,8	0,0	21,5	37,3	35,4
HEROÍNA	NO CONSUME	1,8	2,0	14,2	38,9	43,2
	CONSUME	22,1	0,0	7,4	35,8	34,7
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	1,9	2,0	14,2	38,9	43,1
	CONSUME	5,5	0,0	11,0	30,3	53,3

TABLA 7.8.2

RELACIONES CON LA MADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

		MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULARES	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS
TABACO	NO CONSUME	0,5	0,9	8,6	35,7	54,3
	CONSUME	1,0	2,4	13,1	38,9	44,6
ALCOHOL	NO CONSUME	0,6	1,1	7,9	32,6	57,7
	CONSUME	0,7	1,5	11,1	38,1	48,7
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	0,3	1,0	9,2	34,7	54,8
	CONSUME	1,0	1,8	12,2	39,0	46,0
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	0,6	1,3	10,1	36,9	51,1
	CONSUME	1,4	4,7	6,2	32,6	55,2
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	0,6	1,4	10,1	36,6	51,3
	CONSUME	2,9	0,0	5,7	42,1	49,4
HACHIS	NO CONSUME	0,5	1,3	8,6	36,4	53,2
	CONSUME	1,2	1,9	14,9	38,0	44,0
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	0,6	1,4	9,9	36,7	51,3
	CONSUME	2,4	2,8	18,5	33,4	42,8
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	0,6	1,4	10,0	36,6	51,4
	CONSUME	3,2	1,7	11,2	43,4	40,6
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	0,6	1,4	9,9	36,7	51,5
	CONSUME	2,7	1,5	14,9	39,3	41,6
GHB	NO CONSUME	0,6	1,4	9,9	36,7	51,4
	CONSUME	10,4	5,6	15,6	36,9	31,5
ÉXTASIS	NO CONSUME	0,6	1,4	9,9	36,7	51,5
	CONSUME	3,9	2,1	18,9	40,0	35,1
SPEED	NO CONSUME	0,6	1,4	10,0	36,8	51,2
	CONSUME	4,5	1,6	7,7	31,8	54,5
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	0,6	1,4	10,0	36,6	51,5
	CONSUME	3,9	2,1	9,9	46,9	37,1
HEROÍNA	NO CONSUME	0,6	1,4	10,0	36,8	51,2
	CONSUME	13,6	0,0	14,8	13,6	58,1
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	0,6	1,4	10,0	36,8	51,2
	CONSUME	11,9	6,4	11,0	18,4	52,3

Para finalizar, se han querido analizar algunos de los problemas y situaciones que el alumnado haya podido experimentar durante los 12 meses anteriores a la realización de la Encuesta, dependiendo de si consume o no las sustancias que se han ido estudiando hasta ahora. Dichos resultados se reflejan en las siguientes tablas, en las que se han descrito las sustancias por filas, y las situaciones propuestas por columnas. El porcentaje representa la distribución de jóvenes involucrados en cada una de las situaciones en función de su consumo o no de cada una de las sustancias.

TABLA 7.9.1 EXPERIMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES EN FUNCIÓN DEL CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS

		ACCIDENTE CON ASISTENCIA	PELEA O AGRESIÓN	ASISTENCIA MÉDICA URGENTE	DETENCIÓN POLICÍA O GUARDIA CIVIL
TABACO	NO CONSUME	1,2	8,8	7,2	2,3
	CONSUME	4,9	26,2	8,1	9,3
ALCOHOL	NO CONSUME	0,4	4,2	6,9	1,6
	CONSUME	3,5	19,2	7,9	6,5
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	1,5	7,0	6,3	2,7
	CONSUME	3,9	23,5	8,2	7,3
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	2,4	14,9	6,5	5,1
	CONSUME	7,4	27,3	19,3	6,8
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	2,5	15,1	7,1	4,7
	CONSUME	10,2	35,3	17,0	17,3
HACHIS	NO CONSUME	1,4	9,4	6,9	2,0
	CONSUME	5,6	28,5	8,8	11,4
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	2,4	15,2	7,4	4,8
	CONSUME	24,8	54,1	15,8	23,9
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	2,3	14,3	7,3	4,4
	CONSUME	17,9	60,8	14,8	26,9
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	2,3	14,2	7,3	4,4
	CONSUME	15,2	56,3	14,8	25,0
GHB	NO CONSUME	2,6	15,3	7,3	4,8
	CONSUME	26,5	74,6	19,6	45,3
ÉXTASIS	NO CONSUME	2,4	14,7	7,4	4,4
	CONSUME	18,3	59,0	13,8	32,3
SPEED	NO CONSUME	2,4	14,6	7,2	4,2
	CONSUME	14,1	49,3	15,3	29,3
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	2,5	14,6	7,4	4,4
	CONSUME	14,3	60,8	11,5	32,6
HEROÍNA	NO CONSUME	2,7	15,7	7,4	5,1
	CONSUME	22,5	59,8	34,7	29,5
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	2,7	15,5	7,5	4,9
	CONSUME	16,7	54,0	16,1	32,4

TABLA 7.9.2 EXPERIMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES EN FUNCIÓN DEL CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS

		CONFLICTO CON PADRE O HERMANO	SUFRIR ROBO O ATRACO	ESCAPARSE DE CASA MAS DE 1 DÍA	EXPULSIÓN DEL CENTRO 1 DÍA O MÁS
TABACO	NO CONSUME	24,1	8,8	1,1	1,7
	CONSUME	44,7	9,7	4,3	7,1
ALCOHOL	NO CONSUME	17,0	7,9	0,5	0,7
	CONSUME	36,3	9,5	3,0	4,9
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	21,6	8,4	1,2	1,9
	CONSUME	40,1	9,4	3,6	5,5
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	31,7	8,8	1,9	3,6
	CONSUME	40,5	12,5	8,0	7,1
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	31,9	9,0	2,1	3,5
	CONSUME	44,3	12,3	10,0	12,9
HACHIS	NO CONSUME	25,4	8,3	1,0	1,3
	CONSUME	46,1	10,8	5,1	8,8
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	32,1	9,0	2,1	3,3
	CONSUME	51,7	17,0	17,9	29,7
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	31,7	9,2	1,9	2,9
	CONSUME	53,8	9,0	16,9	30,6
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	31,6	9,1	1,9	2,9
	CONSUME	52,4	10,9	15,8	28,2
GHB	NO CONSUME	32,1	9,1	2,1	3,5
	CONSUME	61,6	15,7	29,5	39,8
ÉXTASIS	NO CONSUME	31,8	9,1	1,9	3,4
	CONSUME	54,6	9,5	20,4	22,3
SPEED	NO CONSUME	31,7	9,2	2,1	3,1
	CONSUME	49,3	7,8	10,9	21,6
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	31,7	9,2	2,0	3,4
	CONSUME	57,9	6,8	17,0	19,6
HEROÍNA	NO CONSUME	32,3	9,1	2,2	3,7
	CONSUME	70,5	16,4	53,7	29,5
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	32,3	9,0	2,3	3,6
	CONSUME	47,6	21,2	13,6	32,4

8. NUEVAS SUSTANCIAS

A pesar de que no existen datos sobre la prevalencia de drogas emergentes en el ámbito internacional, salvo en grupos y entornos de riesgo, la introducción, en la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 14 a 18 años de Enseñanzas Secundarias en España (2010) de un módulo específico sobre este grupo de sustancias, permite una aproximación a las prevalencias de consumo de las mismas y a la percepción del riesgo que este grupo de población asocia a su consumo, así como a su disponibilidad.

Las nueve sustancias incluidas en el módulo específico de drogas emergentes son: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, *research chemicals* y *legal highs*.

El 4,3 % del alumnado aragonés de entre 14 y 18 años admitió haber consumido, alguna vez en su vida, una o más de las drogas antes mencionadas e incluidas en el grupo de drogas emergentes. De ellos, el 75,9% fueron chicos y el 24,1% chicas. Los datos, desagregados por edad mostraron las mayores prevalencias de consumo en los jóvenes de 17 y 16 años.

De la misma manera, un 3,4 % de estudiantes de Aragón de la misma franja de edad admitieron haber consumido, alguna vez en los últimos 12 meses, una o más de las drogas antes mencionadas e incluidas en el grupo de drogas emergentes. De ellos, el 73,2% fueron chicos y el 26,8% chicas. Con esta referencia temporal, se producen mayores prevalencias de consumo entre los jóvenes de 16 y 17 años.

Finalmente, un 1,9 % del estudiantado de 14 a 18 años admitió haber consumido, alguna vez en el último mes, una o más de las drogas antes mencionadas e incluidas en el grupo de drogas emergentes. De ellos, el 68,1% fueron chicos y el 31,9% chicas. También en este período temporal se producen mayores prevalencias de consumo entre los jóvenes de 16 y 17 años.

La tabla siguiente (8.1.) nos muestra las prevalencias de consumo de cada una de las nuevas sustancias consideradas, y teniendo en cuenta los mismos períodos de tiempo que se han venido manejando a lo largo de este informe para el resto de sustancias.

TABLA 8.1
PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE NUEVAS SUSTANCIAS

	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
Ketamina	0,9	0,7	0,3
Spice	1,4	1,0	0,7
Piperazinas	0,2	0,2	0,2
Mefedrona	0,3	0,2	0,2
Nexus	0,5	0,4	0,2
Metanfetamina	1,1	0,9	0,3
Setas Mágicas	2,8	2,3	1,0
Research Chemicals	0,3	0,2	0,2
Legal Highs	0,5	0,4	0,2

La escasa diferencia de las cifras de prevalencia de consumo para los indicadores “alguna vez en la vida” y “último año” en muchas de las sustancias estudiadas podría explicarse tanto por la corta edad de las y los jóvenes encuestados a quienes, por tanto, se les presupone un historial de abuso de sustancias relativamente limitado, como por lo reciente de la aparición de estas sustancias en el mercado.

Las prevalencias de consumo en el último mes muestran cifras muy bajas que confirman el carácter esporádico y experimental del consumo de estas sustancias entre el alumnado.

8.1. KETAMINA

El 0,9% del alumnado aragonés ha tomado *ketamina* alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual entre los hombres, y que aumenta conforme lo hace la edad, excepto en el paso de los 15 a los 16 años, de manera que la mayor prevalencia del consumo se sitúa en los 18 años.

TABLA 8.1.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE KETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,9
Sexo		
Hombre		1,5
Mujer		0,3
Edad		
14 años		0,5
15 años		0,8
16 años		0,6
17 años		1,3
18 años		1,9
Titularidad		
Pública		0,6
Privada		1,3
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,8
Bachillerato		0,5
CFGM		2,2
CFGS		0

En los últimos 12 meses, consumieron *ketamina* un 0,7% de las y los estudiantes encuestados, repitiéndose los comportamientos en función del sexo y la edad.

TABLA 8.1.2		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE KETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 12 MESES
Total		0,7
Sexo		
Hombre		1,2
Mujer		0,2
Edad		
14 años		0,2
15 años		0,8
16 años		0,4
17 años		1
18 años		1,9
Titularidad		
Pública		0,4
Privada		1,2
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,6
Bachillerato		0,5
CFGM		1,5
CFGS		0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *ketamina* cae hasta un 0,3%. En este período, el consumo entre el alumnado de 16 años es inexistente.

TABLA 8.1.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE KETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS			
Total			0,3
Sexo			
Hombre			0,6
Mujer			0,1
Edad			
14 años			0,2
15 años			0,5
16 años			0
17 años			0,6
18 años			1
Titularidad			
Pública			0,1
Privada			0,8
Tipo de Enseñanza			
ESO			0,4
Bachillerato			0,4
CFGM			0
CFGS			0

8.2. SPICE

El 1,4% del alumnado de Aragón ha consumido *spice* alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual entre los hombres, y cuya mayor prevalencia corresponde a las y los jóvenes de 18 años.

TABLA 8.2.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SPICE SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		1,4
Sexo		
Hombre		2,1
Mujer		0,7
Edad		
14 años		0,7
15 años		0,9
16 años		1,6
17 años		1,7
18 años		2,4
Titularidad		
Pública		1,3
Privada		1,5
Tipo de Enseñanza		
ESO		1,4
Bachillerato		1,3
CFGM		1,5
CFGS		14,3

En los últimos 12 meses, consumieron *spice* un 1% de las y los estudiantes aragoneses encuestados. El consumo de los hombres prácticamente triplica en este período al de las mujeres, y los 18 años continúan siendo la edad en la que la prevalencia del consumo de esta sustancia es mayor.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SPICE SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 8.2.2	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	1
Sexo	
Hombre	1,4
Mujer	0,5
Edad	
14 años	0,7
15 años	0,6
16 años	1,5
17 años	0,6
18 años	1,4
Titularidad	
Pública	0,9
Privada	1
Tipo de Enseñanza	
ESO	1,1
Bachillerato	0,9
CFGM	0,7
CFGS	0

El análisis del consumo de spice durante los 30 días previos a la realización de la Encuesta revela una caída del mismo, que se sitúa en un 0,7%. Los comportamientos en función del sexo y la edad se repiten.

TABLA 8.2.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SPICE SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 30 DÍAS
Total		0,7
Sexo		
Hombre		1
Mujer		0,5
Edad		
14 años		0,5
15 años		0,5
16 años		1
17 años		0,6
18 años		1,4
Titularidad		
Pública		0,8
Privada		0,5
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,7
Bachillerato		0,7
CFGM		0,7
CFGS		0

8.3. PIPERAZINAS

El 0,2% del alumnado aragonés ha tomado *piperezinas* alguna vez en su vida, un consumo que una vez más es superior entre los hombres, y que se da únicamente entre los 14 y los 16 años, entre el alumnado matriculado en ESO.

TABLA 8.3.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE PIPERAZINAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,2
Sexo		
Hombre		0,3
Mujer		0,1
Edad		
14 años		0,2
15 años		0,5
16 años		0,1
17 años		0
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,1
Privada		0,2
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,3
Bachillerato		0
CFGM		0
CFGS		0

En cuanto a los últimos 12 meses, la tasa de consumo es la misma que para alguna vez en la vida, e iguales son también los comportamientos observados en el período anterior.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE PIPERAZINAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,2
Sexo	
Hombre	0,3
Mujer	0,1
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,5
16 años	0,1
17 años	0
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,1
Privada	0,2
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,3
Bachillerato	0
CFGM	0
CFGS	0

Durante los últimos 30 días, el consumo de piperazinas se mantiene en un 0,2%, pero en este espacio temporal es inexistente el consumo entre el alumnado de 14 años, con lo que queda limitado a las y los jóvenes de 15 y 16.

TABLA 8.3.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE PIPERAZINAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 30 DÍAS
Total		0,2
Sexo		
Hombre		0,2
Mujer		0,1
Edad		
14 años		0
15 años		0,5
16 años		0,1
17 años		0
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,1
Privada		0,1
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,3
Bachillerato		0
CFGM		0
CFGS		0

8.4. MEFEDRONA

El 0,3% del alumnado de Aragón ha tomado *mefedrona* alguna vez en su vida, más los hombres que las mujeres, y en mayor medida las y los jóvenes de 18 años que el resto.

TABLA 8.4.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEFEDRONA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,3
Sexo		
Hombre		0,5
Mujer		0,1
Edad		
14 años		0
15 años		0,3
16 años		0,3
17 años		0
18 años		1
Titularidad		
Pública		0,2
Privada		0,3
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,2
Bachillerato		0,2
CFGM		0,7
CFGS		0

En los últimos 12 meses, el consumo de *mefedrona* cae una décima. Los comportamientos en función del sexo se repiten, mientras que, en función de la edad, únicamente presenta consumo el alumnado de 15 y 16 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEFEDRONA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,2
Sexo	
Hombre	0,3
Mujer	0,1
Edad	
14 años	0
15 años	0,3
16 años	0,3
17 años	0
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,1
Privada	0,3
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,2
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *mefedrona* entre el estudiantado aragonés en dicho período temporal se mantiene estable con respecto al período anterior, y los comportamientos en función del sexo, la edad y la titularidad del centro se repiten.

TABLA 8.4.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEFEDRONA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS			
Total			0,2
Sexo			
Hombre			0,3
Mujer			0,1
Edad			
14 años			0
15 años			0,3
16 años			0,3
17 años			0
18 años			0
Titularidad			
Pública			0,1
Privada			0,3
Tipo de Enseñanza			
ESO			0,2
Bachillerato			0,2
CFGM			0
CFGS			0

8.5. NEXUS

El 0,5% del alumnado aragonés ha tomado *nexus* alguna vez en su vida, un consumo que es muy superior entre los hombres y que aumenta en función de la edad, excepto en el paso de los 15 a los 16 años.

TABLA 8.5.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE NEXUS SEGÚN SEXO, EDAD, TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,5
Sexo		
Hombre		0,8
Mujer		0,2
Edad		
14 años		0,2
15 años		0,6
16 años		0,3
17 años		0,6
18 años		1
Titularidad		
Pública		0,3
Privada		0,8
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,4
Bachillerato		0,8
CFGM		0
CFGS		0

En los últimos 12 meses, consumieron *nexus* un 0,4% de las y los estudiantes aragoneses encuestados. Los comportamientos en función del sexo y la edad se repiten, y el consumo de esta sustancia desaparece entre el alumnado de 18 años.

TABLA 8.5.2		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE NEXUS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 12 MESES
Total		0,4
Sexo		
Hombre		0,6
Mujer		0,2
Edad		
14 años		0,2
15 años		0,6
16 años		0,3
17 años		0,6
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,2
Privada		0,7
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,4
Bachillerato		0,5
CFGM		0
CFGS		0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *nexus* entre las y los estudiantes aragoneses es de un 0,2%. En este espacio temporal, el consumo corresponde a estudiantes de ESO de entre 14 y 16 años de edad, y la mayor prevalencia del consumo de esta sustancia la encontramos en los 15 años.

TABLA 8.5.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE NEXUS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS			
Total			0,2
Sexo			
Hombre			0,2
Mujer			0,1
Edad			
14 años			0,2
15 años			0,3
16 años			0,1
17 años			0
18 años			0
Titularidad			
Pública			0,1
Privada			0,2
Tipo de Enseñanza			
ESO			0,3
Bachillerato			0
CFGM			0
CFGS			0

8.6. METANFETAMINAS

El 1,1% del alumnado aragonés ha tomado *metanfetaminas* alguna vez en su vida, un consumo que es más común entre los hombres, y que aumenta en función de la edad, excepto en el paso de los 15 a los 16 años, alcanzando a los 18 la mayor prevalencia.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE METANFETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 8.6.1	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	1,1
Sexo	
Hombre	1,9
Mujer	0,3
Edad	
14 años	0,2
15 años	1,1
16 años	0,6
17 años	1,9
18 años	2,9
Titularidad	
Pública	1,1
Privada	1,1
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,9
Bachillerato	1,1
CFGM	1,5
CFGS	14,3

En los últimos 12 meses, consumieron *metanfetaminas* un 0,9% de las y los estudiantes de Aragón que respondieron a la Encuesta. Los comportamientos en función del sexo y la edad se mantienen.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE METANFETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,9
Sexo	
Hombre	1,6
Mujer	0,2
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,9
16 años	0,6
17 años	1,5
18 años	1,9
Titularidad	
Pública	0,9
Privada	0,9
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,9
Bachillerato	0,9
CFGM	1,5
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *metanfetaminas* cae hasta un 0,3%. El consumo entre el alumnado de 18 años desaparece en este período, correspondiendo la mayor prevalencia a las y los estudiantes de 15 años, mayoritariamente hombres, que cursan estudios de ESO o Bachillerato.

TABLA 8.6.3 PREVALENCIA DEL CONSUMO DE METANFETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA

ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,3
Sexo	
Hombre	0,6
Mujer	0,1
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,6
16 años	0,3
17 años	0,2
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,2
Privada	0,4
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,5
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

8.7. SETAS MÁGICAS

El 2,9% del alumnado de Aragón ha tomado *setas mágicas* alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual entre los hombres y que aumenta a medida que lo hace la edad, con especial incidencia entre los 17 y los 18. Se trata, pues, de la sustancia emergente con mayor prevalencia de consumo de todas las estudiadas.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SETAS MÁGICAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 8.7.1	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	2,8
Sexo	
Hombre	4,4
Mujer	1,3
Edad	
14 años	1
15 años	2
16 años	2,6
17 años	2,9
18 años	10,5
Titularidad	
Pública	3,3
Privada	2,1
Tipo de Enseñanza	
ESO	2,3
Bachillerato	3
CFGM	3,7
CFGS	28,6

En los últimos 12 meses, consumieron *setas mágicas* un 2,3% de las y los estudiantes aragoneses encuestados. Los comportamientos en función del sexo y la edad se repiten.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SETAS MÁGICAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	2,3
Sexo	
Hombre	3,4
Mujer	1,2
Edad	
14 años	1
15 años	1,7
16 años	2,3
17 años	2,5
18 años	7,7
Titularidad	
Pública	2,6
Privada	1,6
Tipo de Enseñanza	
ESO	1,9
Bachillerato	2,7
CFGM	3
CFGS	14,3

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *setas mágicas* se reduce hasta un 1%. De nuevo, el consumo es más común en el caso de los hombres, y aumenta en función de la edad, excepto entre los 15 y los 16 años, que se mantiene constante.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SETAS MÁGICAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	1
Sexo	
Hombre	1,3
Mujer	0,6
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,8
16 años	0,8
17 años	1
18 años	3,8
Titularidad	
Pública	0,9
Privada	1,1
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,9
Bachillerato	1,1
CFGM	1,5
CFGS	0

8.8. RESEARCH CHEMICALS

El 0,3% del alumnado de la comunidad aragonesa ha tomado *research chemicals* alguna vez en su vida. El consumo de los hombres duplica al de las mujeres, y alcanza su mayor intensidad en el grupo de jóvenes de 15 años, cayendo a partir de esta edad, hasta el punto de ser inexistente entre el alumnado de 17 y 18 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE RESEARCH CHEMICALS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	0,3
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,2
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,6
16 años	0,3
17 años	0
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,3
Privada	0,3
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,5
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

En los últimos 12 meses, el consumo de *research chemicals* es de un 0,2%, y los comportamientos en función del sexo y la edad observados en el período anterior se repiten.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE RESEARCH CHEMICALS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,2
Sexo	
Hombre	0,3
Mujer	0,2
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,5
16 años	0,3
17 años	0
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,2
Privada	0,3
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,4
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *research chemicals* entre el alumnado que respondió a la Encuesta es del 0,2%. La brecha de género se agranda en este período, mientras que si atendemos al tipo de enseñanza, el consumo se limita a estudiantes de ESO.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE RESEARCH CHEMICALS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,2
Sexo	
Hombre	0,3
Mujer	0,1
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,5
16 años	0,1
17 años	0
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,1
Privada	0,2
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,3
Bachillerato	0
CFGM	0
CFGS	0

8.9. LEGAL HIGHS

El 0,5% del alumnado aragonés ha tomado *legal highs* alguna vez en su vida, consumo que es más habitual entre los hombres y que alcanza el máximo valor en el grupo de estudiantes de 17 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE LEGAL HIGHS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 8.9.1	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	0,5
Sexo	
Hombre	0,8
Mujer	0,3
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,6
16 años	0,5
17 años	0,8
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,5
Privada	0,5
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,5
Bachillerato	0,5
CFGM	0,7
CFGS	0

En los últimos 12 meses, consumieron *legal highs* un 0,4% de las y los estudiantes aragoneses encuestados. Los comportamientos en función del sexo se repiten, mientras que en relación a la edad, la mayor prevalencia corresponde en este período al alumnado de 15 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE LEGAL HIGHS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,4
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,3
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,6
16 años	0,5
17 años	0,4
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,4
Privada	0,4
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,4
Bachillerato	0,5
CFGM	0
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *legal highs* se sitúa en un 0,2%. En este período, el consumo de hombres y mujeres se iguala, y corresponde únicamente a estudiantes de ESO o Bachillerato con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.

TABLA 8.9.3 PREVALENCIA DEL CONSUMO DE LEGAL HIGHs SEGÚN SEXO, EDAD, TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA

ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,2
Sexo	
Hombre	0,2
Mujer	0,2
Edad	
14 años	0
15 años	0,5
16 años	0,1
17 años	0,4
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,2
Privada	0,1
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,3
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0