

# Indicador Admisiones a Tratamiento por Consumo de Sustancias Psicoactivas Resumen Datos Aragón 2010

Dirección General de Salud Pública  
Servicio de Promoción de la Salud  
y Prevención de la Enfermedad

## **ÍNDICE GRÁFICOS**

**DISTRIBUCIÓN POR EDAD**

**DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO**

**DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA**

**DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA**

**DISTRIBUCIÓN INICIOS DE TRATAMIENTO POR PROVINCIAS**

**DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y PROVINCIA DE ASISTENCIA**

**DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO**

**SITUACIÓN DE CONVIVENCIA**

**DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA**

**DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA**

**DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA**

**REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA**

**VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL**

**SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA**

Los inicios de tratamiento notificados durante 2010 en la Comunidad Autónoma han sido 1.534, el 81 % de los inicios de tratamiento corresponde a hombres y el 19 % a mujeres.

### DISTRIBUCIÓN POR EDAD. 2010

GRUPO EDAD	TOTAL	%
14 y <	52	3,39
15 a 20 años	174	11,35
21 a 30 años	360	23,48
31 a 40 años	406	26,48
41 a 50 años	381	24,85
51 a 60 años	123	8,02
61 y >	38	2,41
NC	0	0
	1534	

### DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO. 2010

GRUPO EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
14 y <	40	3,2	12	4,1
15 a 20 años	149	12	25	8,6
21 a 30 años	309	24,8	51	17,5
31 a 40 años	325	26,2	81	27,8
41 a 50 años	297	23,9	84	28,9
51 a 60 años	91	7,3	32	11
61 y >	32	2,5	6	2
<b>TOTAL</b>	1243	<b>100%</b>	291	<b>100%</b>

Los inicios de tratamiento entre los jóvenes de 14 a 20 constituyeron el 14 %. El grupo de edad de 31 a 50 años representó el mayor porcentaje de inicios de tratamiento con un 51,33 %.

## DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA. 2010

GRUPO EDAD		Alcohol	Anfetam	Benzodiac	Cannabis	Cocaína	Heroína	Otros estimul	Otros opioides	Sust volátiles
14 y <	52	1			49	1		1		
15 a 20 años	174	15	13		116	22	8			
21 a 30 años	360	85	35	1	56	142	33	2	4	2
31 a 40 años	406	174	8	2	21	109	81		11	
41 a 50 años	381	279	1	6	4	34	50		6	1
51 a 60 años	123	110		2		5	4	1	1	
61 y >	38	36						1		
<b>TOTAL</b>	<b>1534</b>	<b>700</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>246</b>	<b>313</b>	<b>176</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>3</b>

Si analizamos los datos en relación con las sustancias consumidas, observamos que los jóvenes de 14 a 20 años iniciaron tratamiento en un 73% por consumo de cannabis (65,7 % en 2009 y 67,7% en 2008), seguido por consumo de cocaína 10,18% (14,6% en 2009 y 16,4% en 2008), por consumo de alcohol 7 % y consumo de anfetaminas 5,75% (8,2 % en 2009 y 10% en 2008).

Entre los jóvenes de 21 a 30 años la droga por la que se iniciaron más tratamientos fue la cocaína con un 39,5% (44,8 % en 2009 y 46,9 % en 2008), seguido de alcohol con un 23,6% (17,6 % en 2009 y 10,6 % en 2008) y cannabis (15,56%) junto con anfetaminas (9,7%) y heroína (9,17%).


Entre los 31-40 años el mayor porcentaje de tratamientos iniciados fue por abuso de alcohol 42,86% (40,3% en 2009) seguido por consumo de cocaína 26,85% (23,7% en 2009), heroína más otros opiáceos 25,56% (26,8% en 2009).

El grupo de edad entre 41-50 años, inició tratamiento en el 73,23% de los casos por alcohol (62,2 % en 2009), seguido de heroína y otros opiáceos con un 14,70% (19,5% en 2009) y de cocaína con un 9,45% (11,8 % en 2009).

El 89,5% de los inicios de tratamiento para el grupo de edad comprendido entre los 51 a 60 años se produce por consumo de alcohol (88,3 % en 2009, 85,9% en 2008), seguidos de cocaína y heroína y otros opiáceos 4%.

Los inicios de tratamiento para el grupo de edad de 61 y más que suponen un 2,4 % del total de tratamientos iniciados, el 97,3 % de los casos fue por consumo de alcohol.

## DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA. 2010




GRUPO SUSTANCIAS	TOTAL	MUJER	%	HOMBRE	%
Alcohol	700	153	52,58%	547	44,01%
Anfetaminas	57	9	3,09%	48	3,86%
Benzodiacepinas	11	4	1,37%	7	0,56%
Cannabis	246	42	14,43%	204	16,41%
Cocaína	314	40	13,75%	274	22,04%
Heroína	176	36	12,37%	140	11,26%
Otros estimulantes	5	2	0,69%	3	0,24%
Otros opioides	22	4	1,37%	18	1,45%
Sustancias volátiles	3	1	0,34%	2	0,16%
	1534	291	100%	1243	100%

Los hombres iniciaron tratamiento durante 2010 en primer lugar por alcohol con 44% (2009, 36,2%), seguido con un 26,1% seguido por estimulantes (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes; 2009, 29 %) y opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 12,7% (16,7 % el año anterior).

Con respecto a las mujeres, iniciaron tratamiento un 52,6% por alcohol (un aumento importante respecto al 43,2% de 2009), seguido por estimulantes (cocaína, anfetaminas

y otros estimulantes) con un 17,5% (2009, 22 %) y los opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 13,7%.

## DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS




Grupo sustancia	% Aragón	Total	HUESCA	% Hu	TERUEL	% Te	ZARAGOZA	% Zgz
Alcohol	45,63%	700	156	51,8%	139	46,2%	405	43,5%
Anfetaminas	3,72%	57	15	5,0%	9	3,0%	33	3,5%
Benzodiacepinas	0,72%	11	2	0,7%	0	0,0%	9	1,0%
Cannabis	16,04%	246	44	14,6%	60	19,9%	142	15,2%
Cocaína	20,47%	314	63	20,9%	61	20,3%	190	20,4%
Heroína	11,47%	176	18	6,0%	13	4,3%	145	15,6%
Otros estimulantes	0,33%	5	2	0,7%	1	0,3%	2	0,2%
Otros opioides	1,43%	22	1	0,3%	18	6,0%	3	0,3%
Sustancias volátiles	0,20%	3	0	0,0%	0	0,0%	3	0,3%
	100%	1534	301	100%	301	100%	932	100%


Los tratamientos por alcohol han supuesto el mayor porcentaje en el conjunto de Aragón con un 45,6% (2009, 37,6%), seguidos de estimulantes (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes) con un 24,5% (2009, 27,7%), cannabis 16% y opiáceos (heroína más otros opiáceos) 12,9% (16,4% el año anterior).

Si observamos los datos por provincias, las diferencias fundamentales las encontramos en los inicios de tratamiento por heroína (Zaragoza: 15,6%; Huesca: 6% y Teruel: 4,3%), y por cannabis (Teruel: 19,9%; Zaragoza: 15,2% y Huesca: 14,6%).

## DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y PROVINCIA DE ASISTENCIA

### TOTAL ARAGÓN





## DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y POR PROVINCIA DE ASISTENCIA 2010

	Total	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
ESPAÑA	1365	88,0%	89,4%	89,2%
EUROPA	54	2,7%	4,3%	3,5%
ÁFRICA	43	3,7%	2,0%	2,8%
AMÉRICA LATINA	62	5,6%	2,7%	4,0%
OCEANÍA	1	0,0%	0,0%	0,1%
DESCONOCIDA	9	0,0%	1,7%	0,4%
	1534	100%	100%	100%

En cuanto al número de extranjeros que han iniciado tratamiento, no se han producido modificaciones reseñables, Zaragoza sigue siendo la provincia en la que se atiende el mayor número de estos pacientes, aunque proporcionalmente le superan ligeramente Huesca (+1,2%) y Teruel (+0,02%).



## DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO 2010

PROCEDENCIA	TOTAL	%
Otro servicio drogas	128	8,3%
Servicios sanitarios	503	32,8%
Servicios sociales	79	5,1%
Prisión/Judicial	123	8,0%
Familiares/Amigos	242	15,8%
Iniciativa propia	394	25,7%
Otros	58	3,8%
Desconocido	7	0,5%
Total	1534	100,0%

Como viene ocurriendo en años anteriores, los pacientes que inician tratamiento, llegan a los centros en la mayoría de las ocasiones por iniciativa propia (25,7%) o a través de familiares y amigos (15,8%) en un total del 41,5% de los casos. En el 32,5% de los casos,+4% respecto a 2009, los pacientes llegan a los centros a través de servicios sanitarios. El 8,3% procede de otros servicios de drogas.

## SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 2010

CONVIVENCIA	TOTAL	%
Solo/a	250	16,3%
Únicamente con pareja	197	12,8%
Únicamente con hijos/as	40	2,6%
Con la pareja e hijos/as	298	19,4%
Con padres o familia de origen	552	36,0%
Con amigos/as	33	2,2%
Otras	136	8,9%
Desconocida	28	1,8%
Total	1534	100,0%


El 36% de pacientes vivían con padres o familia de origen en los treinta días anteriores al inicio de tratamiento. El 19,4% de los pacientes vivían con la pareja e hijos/as y el 16,3 % vivían solos.

## DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA 2010

RESIDENCIA	TOTAL	%
Alojamiento inestable/precario	22	1,4%
Casas, pisos, apartamento	1412	92,0%
Desconocida	4	0,3%
Otras instituciones	9	0,6%
Otro lugar	58	3,8%
Pensiones, hoteles, hostales	5	0,3%
Prisión, centro de reforma o de internamiento cerrado para menores	24	1,6%
	1534	100,0%

En 2010 el 92% de los pacientes declaran haber vivido en casas, pisos o apartamentos en los treinta días antes de iniciar tratamiento. El porcentaje de personas que procedían de prisión o de centro de reforma para menores es de 1,6%.


## DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA, 2010.



GRUPO SUSTANCIA	Total	Descon	No lee/escr	Otros	Primarios	Secundarios	Univ_ Medio	Univ_ Sup
Alcohol	700	31	2	2	280	321	37	27
Anfetaminas	57	2	0	0	17	38	0	0
Benzodiacepinas	11	1	0	0	3	6	1	0
Cannabis	246	4	0	0	68	167	3	4
Cocaína	314	9	0	0	92	197	7	9
Heroína	176	6	2	0	94	72	0	2
Otros estimulantes	5	0	0	0	2	3	0	0
Otros opioides	22	0	0	0	12	10	0	0
Sustancias volátiles	3	0	0	0	2	1	0	0
	1534	53	4	2	570	815	48	42

El 38% de pacientes tienen estudios primarios y el 53% secundarios, en torno al 6% tienen estudios universitarios.


#### DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA. 2010



Grupo sustancia	Total	Trabajando	En paro	Otras	Incapac. O Pensionista	Estudiante	Descon.
Alcohol	700	314	236	41	85	4	20
Anfetaminas	57	24	27	0	1	5	0
Benzodiacepinas	11	5	4	1	1	0	0
Cannabis	246	52	62	6	5	103	18
Cocaína	314	162	120	11	10	4	7
Heroína	176	31	94	33	13	1	4
Otros estimulantes	5	1	2	0	1	1	0
Otros opioides	22	9	9	0	4	0	0
Sustancias volátiles	3	0	2	0	0	0	1
	1534	598	556	92	120	118	50

Del total de los pacientes que iniciaron tratamiento en 2010, el 39 % se encontraba trabajando, el 38% parado, el 6% estudiando. El 7% se encontraba en situación de incapacidad o pensionista.


## REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA



Grupo sustancia	Sí	% Sí	No	%No	Descon.	Total
Alcohol	322	46,0%	339	48,4%	39	700
Anfetaminas	23	40,4%	31	54,4%	3	57
Benzodiacepinas	2	18,2%	6	54,5%	3	11
Cannabis	75	30,5%	141	57,3%	30	246
Cocaína	148	47,1%	151	48,1%	15	314
Heroína	151	85,8%	25	14,2%	0	176
Otros estimulantes	3	60,0%	2	40,0%	0	5
Otros opioides	17	77,3%	5	22,7%	0	22
Sustancias volátiles	2	66,7%	1	33,3%	0	3
<i>Total</i>	743	<b>48,4%</b>	701	<b>45,7%</b>	90	1534

Para los que consumían alcohol era el primer tratamiento en un 48,4% de los casos. Para los que iniciaron tratamiento por consumo de cocaína era el primero en un 48,1% y por consumo de cannabis realizaban el primer tratamiento el 57,3% de los casos notificados.

### VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL 2010



Grupo sustancia	Total	Descon.	Esnifada	Oral	Otras	Parenteral	Pulmon.o fumada
Alcohol	700			698			2
Anfetaminas	57	5	40	12			
Benzodiacepinas	11			11			
Cannabis	246	21	6	4			215
Cocaína	314	8	288	1		9	8
Heroína	176	7	13	1	1	61	93
Otros estimulantes	5			3			2
Otros opioides	22	1		4		2	15
Sustancias volátiles	3	1					2
		43	347	734	1	72	337

Un 8% del total de los inicios realizados en 2010 continúa usando la vía parenteral. El 87,5% de los consumidores de cannabis toman la sustancia por vía pulmonar o fumada.

## SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA

Grupo sustancia	Total	Sin prueba	Positivo	Negativo	Descon.
Alcohol	700	453	9	127	111
Anfetaminas	57	38	0	5	14
Benzodiacepinas	11	7	1	0	3
Cannabis	246	194	1	14	37
Cocaína	314	183	6	77	48
Heroína	176	52	47	68	9
Otros estimulantes	5	2	0	1	2
Otros opioides	22	7	5	8	2
Sustancias volátiles	3	1	0	1	1
	1534	937	69	301	227

El 61 % no tiene prueba para determinación de anticuerpos VIH y el 14,8% es desconocida. El 75,3% de los resultados positivos corresponde a personas que iniciaron tratamiento por consumo de opiáceos (heroína más otros opiáceos), frente al 83,3% de 2009.

De la serología conocida (370 inicios de tratamiento), un 81,3% es negativo y un 18,7% positivo.

