

Indicador Admisiones a Tratamiento por Consumo de Sustancias Psicoactivas Resumen Datos Aragón 2013

Dirección General de Salud Pública
Servicio de Drogodependencia
y Vigilancia en Salud Pública

ÍNDICE GRÁFICOS AÑO 2013

DISTRIBUCIÓN POR EDAD.....	4
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	4
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA	5
DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA.....	6
DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS	7
DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE	8
DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y POR PROVINCIA DE ASISTENCIA	8
DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO.....	9
SITUACIÓN DE CONVIVENCIA.....	10
DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA	10
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA	11
DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA. 2011.....	12
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA.....	13
VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	14
SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA	15

Los inicios de tratamiento notificados durante 2013 en la Comunidad Autónoma de Aragón han sido 1461, el 78,1 % de las admisiones a tratamiento corresponde a hombres y el 21,9 % a mujeres.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Aragón, 2013

GRUPO EDAD	Total	%
14 y <	133	9,10
15 a 20 años	185	12,66
21 a 30 años	372	25,46
31 a 40 años	387	26,49
41 a 50 años	263	18,07
51 a 60 años	96	6,57
61 y >	25	1,71
NC	0	0,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Aragón, 2013

GRUPO EDAD	Hombre	%	Mujer	%
14 y <	102	76,69	31	23,31
15 a 20 años	144	77,84	41	22,16
21 a 30 años	311	83,60	61	16,40
31 a 40 años	297	76,74	90	23,26
41 a 50 años	193	73,11	70	26,52
51 a 60 años	77	80,21	19	19,79
61 y >	17	68,00	8	32,00
TOTAL	1141	100%	320	100%

Los inicios de tratamiento entre los jóvenes de 14 a 20 constituyeron el 21.76 %. El grupo de edad de 21 a 40 años representó como en años anteriores, el mayor porcentaje de inicios de tratamiento con un 51.95%.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2013

Grupo edad	Total	Alcohol	Anfetaminas	Benzod	Cannabis	Cocaína	Heroína	Otros opioides	Otras
14 y <	133	7	5		117	4			
15 a 20 años	185	12	23		121	20	6	1	2
21 a 30 años	372	82	63	3	57	117	43	6	1
31 a 40 años	387	198	19	4	19	66	74	6	
41 a 50 años	264	193	3	7	2	12	41	6	
51 a 60 años	96	86		2	1	3	1	2	1
61 y >	25	24							1
NC	0								

Si analizamos los datos en relación con las sustancias consumidas, observamos que los jóvenes de 14 a 20 años iniciaron tratamiento en un 77% por consumo de cannabis, cifra similar a la de años anteriores (79.2% en 2012), seguido por consumo de anfetaminas con 9,1% que ha repuntado respecto al año 2012 (4,3%) y por el consumo de cocaína 7,7% que se mantiene en niveles similares al año anterior (7,8 %). El consumo de alcohol supuso el 6,1% (7,3 % en 2012) del total de tratamientos en este rango de edad.

Entre los jóvenes de 21 a 30 años la droga por la que se iniciaron más tratamientos fue la cocaína con un 31,4% (34,9 % en 2012) y que mantiene la tendencia de años anteriores, seguido de alcohol con un 22% (26,5% en 2012) y de los tratamientos por anfetaminas con 16,9%. En 2013 se ha modificado lo ocurrido años anteriores en los que el cannabis era la tercera sustancia por la que se iniciaron más tratamientos pasando en 2013 a ser la cuarta sustancia por la que se iniciaron tratamientos en este grupo de edad y que ha supuesto el 15,3%. Por heroína en 2013 se ha iniciado el 11,5% de tratamientos frente al 10,3% de 2012.

Entre los 31-40 años el mayor porcentaje de tratamientos iniciados fue por abuso de alcohol con un 51,1%(48,5% en 2012) seguido por tratamientos iniciados por heroína con un 19,1% (heroína o metadona ya que algunos casos no se especifica) y por consumo de cocaína con un 17% bajando 5 puntos respecto al año anterior en el que los tratamientos por cocaína supusieron el 21 % de este franja de edad)


El grupo de edad entre 41-50 años, inició tratamiento en el 73,1 % de los casos por alcohol (71,9% en 2012) seguido por los inicios de tratamiento por heroína y otros opiáceos con un

15,5% igual que en años anteriores 16,1% en 2012 o 22,4% en 2011) por consumo de cocaína iniciaron tratamiento el 4,5% de este grupo de edad, cifra inferior a la de años anteriores 6,8% en 2012, 12,6% en 2011 y 9,45% en 2010).

El 89,5% de los inicios de tratamiento para el grupo de edad comprendido entre los 51 a 60 años se produce por consumo de alcohol El 9,3% restantes se distribuyen entre el resto de sustancias benzodiacepinas, cocaína heroína y cannabis

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2013



Sustancia	Total	Hombre	%	Mujer	%
Alcohol	602	453	30,94	149	10,20
Anfetaminas	113	98	6,71	15	1,03
Benzodiacepinas	16	7	0,48	9	0,62
Cannabis	317	247	16,91	70	4,79
Cocaína	222	192	13,14	30	2,05
Heroína	166	129	8,83	37	2,53
Otros opioides	21	14	0,96	7	0,48
Alucinógenos	1	0	0	1	0,07
Hipnóticos y sedantes	1	0	0	1	0,07


Otros estimulantes	2	1	0	1	0,07
	1461	1141	77,97	320	21,91

Los hombres iniciaron tratamiento durante 2013 en primer lugar por alcohol con un 39,7% respecto del total, seguido por cannabis con un 21,6%, por cocaína con un 16,8% y opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 12,5 %. En el mismo orden que en años anteriores.

Con respecto a las mujeres, iniciaron tratamiento un 46,5% por alcohol, seguido por cannabis con un 21,8%, por opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 13,7% y por consumo de cocaína con un 9,3%

DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS

Aragón, 2013



Grupo sustancia	Total	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alcohol	602	118	115	369
Anfetaminas	113	25	3	85
Benzodiacepinas	16	4	0	12
Cannabis	317	57	36	224
Cocaína	222	34	54	134
Heroína	166	19	26	121
Otros opioides	21	4	3	14
Alucinógenos	1	1	0	0


Hipnóticos y sedantes	1	1	0	0
Otros estimulantes	2	0	1	1
	1461	263	238	960

Del total de Admisiones a Tratamiento, las correspondientes a Huesca representan un 18%, las de Teruel un 15,7% y las de Zaragoza un 65,7%, del total de Aragón.

Los tratamientos en 2013 siguen el mismo patrón que el año 2012 y las sustancias por las que iniciaron mantienen las cifras muy similares. Por abuso de alcohol los tratamientos en 2013 han supuesto el mayor porcentaje en el conjunto de Aragón con un 41,2%, seguidos de cannabis con un 21,7%, de cocaína con 15,2% opiáceos (heroína más otros opiáceos) 11,3%.

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE

Aragón, 2013




En cuanto al país de origen de las personas que iniciaron tratamiento en 2013 nos encontramos, que proceden de España el 88.3% del total de tratamientos y el 11,7% restante se distribuye entre 39 países diferentes. El país que más representado está en inicios de tratamiento exceptuando España, es Rumania con 26 inicios de tratamiento, Marruecos y

Colombia con 22 y por último Brasil y Ecuador con 11 y 10 inicios de tratamiento en Aragón. Ante la dispersión se han agrupado por continentes y excluido España del gráfico.

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y POR PROVINCIA DE ASISTENCIA

Aragón, 2013



En cuanto al número de extranjeros que han iniciado tratamiento, no se han producido modificaciones reseñables, Zaragoza sigue siendo la provincia en la que se atiende el mayor número de estos pacientes y la procedencia está distribuida casi por igual entre países de Europa, América sobre todo del Sur y África.

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO

Aragón, 2013

PROCEDENCIA	TOTAL	%
Iniciativa propia	434	29,67
Servicios sanitarios	433	29,60
Familiares/Amigos	199	13,60

Prisión/Judicial	144	9,84
Otro servicio drogas	98	6,70
Servicios sociales	72	4,92
Otros	69	4,72
Desconocido	14	0,96

Como viene ocurriendo en años anteriores, los pacientes que inician tratamiento, llegan a los centros en la mayoría de las ocasiones a través de iniciativa propia y/o familiares y amigos (29,6 % y 13,6 %) en un total del 43,2% de los casos. Año tras años se va incrementando el porcentaje de los inicios tra tratamiento a través de los Servicios Sanitarios, en 2013 han sido el 29,6% del total. A través de los Servicios sociales han llegado el 4,9% y el 6,7 % procede de otros servicios de drogas, cifras muy similares a las de años anteriores.

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

Aragón, 2013

Convivencia	Total	%
Con padres o familia de origen	524	35,82
Con la pareja e hijos/as	277	18,93
Solo/a	239	16,34
Únicamente con pareja	180	12,30
Otras	101	6,90
Desconocida	68	4,65
Únicamente con hijos/as	43	2,94

El 35,8% de pacientes vivían con padres o familia de origen en los treinta días anteriores al inicio de tratamiento, el año pasado este porcentaje llegaba hasta el 41%. El 18,9% de los pacientes vivían con la pareja e hijos/as y el 16,3 % vivían solos/as.

DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA


Aragón, 2013

Lugar de residencia en los treinta días anteriores al inicio Tratamiento	Total	%
Casas, pisos, apartamento	1331	90,98
Otro lugar	32	2,19
Alojamiento inestable/precario	25	1,71
Desconocida	23	1,57
Otras instituciones	21	1,44
Prisión, centro de reforma o de internamiento cerrado para menores	21	1,44
Pensiones, hoteles, hostales	10	0,68

En 2013 el 90,9% de los pacientes declaran haber vivido en casas, pisos o apartamentos en los treinta días antes de iniciar tratamiento. El porcentaje de personas que procedían de prisión o de centro de reforma para menores ha sido de 1,4% inferior al año anterior.

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2013



Sustancia	Total	No leer / escribir	Primarios	Secundarios	Univ. Medio	Univ. Sup.	Otros	Descon
Alcohol	602	3	193	308	25	23	1	49
Cannabis	317	2	90	172	13	15	1	24
Cocaína	222	1	59	134	7	6		15
Heroína	166	5	66	76	2	6	1	10
Anfetaminas	113		24	81	1	3		4
Otros opioides	21		6	7	1	3		4
Benzodiacepinas	16		5	10	1			
Otros estimulantes	2			1	1			
Alucinógenos	1			1				
Hipnóticos y sedantes	1				1			

El 30% de pacientes tienen estudios primarios y el 54 % secundarios, en torno al 8% tienen estudios universitarios. Estos datos se corresponden con el perfil de consumidor actual que pertenece a un estatus normalizado, con estudios y una situación familiar y laboral estructurada y normalizada.

DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2013




Sustancia	Total	Trabajando	Parado	Incapacidad Permanente	Estudiante	Otras	Desconoc.
Alcohol	602	225	222	92	8	29	26
Cannabis	317	46	106	5	131	4	25
Cocaína	222	96	94	12	7	6	7
Heroína	166	30	85	25	4	14	8
Anfetaminas	113	47	54	3	7	1	1
Otros opioides	21	4	4	7		1	5
Benzodiazepinas	16	4	9			1	2
Otros estimulantes	2	1			1		
Alucinógenos	1				1		
Hipnóticos y sedantes	1			1			

En cuanto a la situación laboral de los pacientes que iniciaron tratamiento en 2013, el 32,3% estaba parado, el 31% trabajando, el 10,9% estudiando y el 9,9% se encontraba en situación de incapacidad permanente o pensionista.

REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA

Aragón, 2013




Grupo sustancia	Total	Tto previo Sí	%	Tto previo No	%	Descon.	%
Alcohol	602	315	52,33	256	42,52	31	5,15
Cannabis	317	66	20,8	175	55,2	76	23,97
Cocaína	222	113	59,9	102	45,94	7	3,15
Heroína	166	144	86,74	18	10,84	4	2,4
Anfetaminas	113	46	40,7	59	52,21	8	7,08
Otros opioides	21	12	57,14	7	33,33	2	9,52
Benzodiazepinas	16	10	62,5	6	37,5		
Otros estimulantes	2	1	50	1	50		
Alucinógenos	1			1	100		
Hipnóticos y sedantes	1			1	100		

Para los que consumían alcohol fue el primer tratamiento en un 42,5% de los casos (52,3% habían recibido previamente y en un 5,1% se desconoce el dato). Para los que iniciaron

tratamiento por consumo de cocaína era el primero en un 45,9% y por consumo de cannabis realizaban el primer tratamiento el 55,2 % de los casos notificados. Estos porcentajes son muy similares a los de años anteriores

VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL

Aragón, 2013



Grupo sustancia	Total Ttos	Esnifada	Oral	Parenteral	Pulmonar o fumada	No Recogido
Alcohol	602		599			3
Cannabis	317	4	6	1	306	
Cocaína	222	203	6	2	11	
Heroína	166	15	3	40	100	8
Anfetaminas	113	90	17	1	3	2
Otros opioides	21	2	15	1	1	2
Benzodiacepinas	16		16			
Otros estimulantes	2		2			
Alucinógenos	1		1			
Hipnoticos y sedantes	1		1			
		315	665	45	423	13

El 96,5 % de los consumidores de cannabis toman la sustancia por vía pulmonar o fumada. El 91,4% de los consumidores de cocaína que han iniciado tratamiento en 2013 utilizaban principalmente la vía esnifada que es la vía utilizada en un 79,6% por los consumidores de anfetaminas. Un 3% del total de los inicios realizados en 2013 continúa usando la vía parenteral

SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2013

Sustancia	Total	Sin prueba	Positivo	Negativo	Desconocido
Alcohol	602	411	3	77	111
Cannabis	317	264	2	13	38
Cocaína	222	145	2	43	32
Heroína	166	40	35	62	29
Anfetaminas	113	74		27	12
Otros opioides	21	7	1	6	7
Benzodiacepinas	16	9	1	5	1
Otros estimulantes	2	1		1	
Alucinógenos	1	1			
Hipnóticos y sedantes	1	1			

El 65,2 % no tiene prueba para determinación de anticuerpos VIH, el 15,7% recoge como desconocido este dato. El 3% sabe que es seropositivo y de éstos el 79,5% de los resultados positivos corresponde a personas que iniciaron tratamiento por consumo de opiáceos (heroína más otros opiáceos).

