

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por enfermedades del sistema digestivo durante el año 2014. Se representó la edad de los casos en el momento de la defunción. El Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) de residencia de cada defunción se asignaron según Padrón de habitantes.

Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la población europea con su IC al 95% y representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad por enfermedades del sistema digestivo de Aragón por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) por ZBS, divididas en quintiles, para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tabla 1-4).

RESULTADOS

Las tasas más elevadas se hallan en los sectores de Zaragoza III y Zaragoza II y la más baja en el de Calatayud aunque no existen diferencias significativas entre los sectores(Figura1). Las tasas de los hombres son superiores a las de las mujeres en todos los sectores. No se han encontrado diferencias significativas entre los distintos sectores ni en el caso de los hombres ni en el de las mujeres (Figura2).

Figura 1. Tasa de mortalidad ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.





Figura 2. Tasa de mortalidad ajustada por sexo y sector sanitario.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 51,5 por 100.000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 28,8 por 100.000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 47,0 por 100.000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 15,9 por 100.000 hab

Las tasas específicas por edad y sexo siguen el mismo patrón aunque son más elevadas en los hombres en todos los grupos de edad. Las tasas específicas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más alta se sitúa en el grupo de edad de 85 y más años tanto en el caso de los hombres (655 por 100.000 hab) como en el de las mujeres (518 por 100.000 hab) (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres. Aragón y Zaragoza Capital.

Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres. Aragón y Zaragoza Capital.





Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Actur Oeste)
Calatayud Rural

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zaragoza Capital (San José Centro)
Zaragoza Capital (Rebojería)

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Fraga
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Tamarite de Litera
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)
Zaragoza Capital (Fernando El Católico)
Binéfar

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Sariñena
Zaragoza Capital (Bombarda)
Zaragoza Capital (Miralbueno-Garrapinillos)
Zaragoza Capital (San José Centro)
Ateca
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zaragoza Capital (Oliver)
Zaragoza Capital (Independencia)