

Sisymbrium cavanillesianum Castroviejo & Valdés Bermejo.

FAMILIA: Brassicaceae (CRUCIFERAE)

Nombre Vulgar: rabanillo cornudo, jaramugo de Cavanilles.



Sisymbrium cavanillesianum

Fte. imágenes Anthos (<http://www.anthos.es/>)

Sinónimos:

Sisymbrium matritense (Jacq.) P.W. Ball & Heywood

Sisymbrium corniculatum Cav.

BIORREGION

En Aragón está presente únicamente en la biorregión mediterránea.

CATALOGACIÓN

- Presente en los **Anexos II y IV** de la Directiva Hábitats 92/43/CEE.
- **Anexo I del Convenio de Berna** (1997)
- **Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Real Decreto 139/2011**, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- **Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA)** en la categoría de **Interés Especial**.
- Catálogos autonómicos: Listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial, **Andalucía** [Decreto 23/2012]; Peligro de extinción, Vulnerable, **Castilla la Mancha** [Decreto 200/2001], Sensible a la Alteración de su Hábitat, **Madrid** [Decreto 18/1992].

Respecto de Aragón esta especie no ha vuelto a ser localizada desde que se citó en 1883, pese a que se han realizado prospecciones específicas para su localización, dándose como extinta en territorio aragonés.



DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Terófito escaposo. Hierba anual o bienal de tallos 15-75 cm, erectos o suberectos, en ocasiones ramificados superiamente, pelosa o glabrescente. Hojas basales en roseta, con peciolo largo, ensanchado en la base, con 4-7 pares de lóbulos laterales triangulares y un lóbulo terminal algo mayor que los otros; hojas medias parecidas a las basales; las superiores, subsésiles, lanceoladas, de subenteras a dentado-lobuladas. Inflorescencia en racimo sin brácteas, laxa en la fructificación. Pedicelos rígidos, engrosados como la base del fruto, pubescentes. Pétalos de 1,3-2,2 mm, de un amarillo pálido. Silicuas adpresas al tallo, cónicas, de 6 a 11 mm, algo curvadas y pilosas, de ápice comprimido. Florece hacia marzo-mayo y fructifica en mayo-junio.

DISTRIBUCIÓN

Endemismo ibérico del centro y sur de la península Ibérica (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Albacete y Granada). En la actualidad se conocen dos únicos núcleos disyuntos en las provincias de Madrid y Albacete, sin que se haya encontrado continuidad entre estas dos áreas. Existen además citas para Ciudad Real, Zaragoza y Granada.

Se citó en 1883, con dudas, en Aragón y no se ha vuelto a localizar. Esta cita correspondía, de forma poco precisa, a la zona entre Alhama de Aragón y el Monasterio de Piedra (Zaragoza).

En los últimos años no ha sido localizada en las prospecciones que se han realizado dentro de diferentes proyectos.

ESPACIOS NATURA 2000 EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE

Al desconocer la distribución y presencia de esta especie en Aragón no tenemos constancia de ningún espacio de la RN2000 que tenga este taxón inventariado dentro de sus límites.

ECOLOGÍA

Vive en ambientes ruderalizados sobre yesos, margas subsalobres y arcillas. Se la puede localizar en los bordes de cultivos de cereal, sobre suelos margosos salobres. También se la ha citado sobre suelos húmedos arcillosos. Se trata de una especie ruderal arvense que suele aparecer ocupando bordes de caminos, sembrados (especialmente los dedicados al cereal de secano), reposaderos de ganado, etc



Red de seguimiento para especies de flora y hábitats de interés
Comunitario en Aragón
LIFE12 NAT/ES/000180 RESECOM



SEGUIMIENTO

Esta especie se ha dado como extinta para Aragón tras numerosas prospecciones dirigidas a su localización en las zonas donde había sido citada, por lo que no se realizará ningún seguimiento.