

Indicador Admisión a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas

Aragón - Resumen Datos 2010 -

Sección de Drogodependencias. Servicio de Promoción de la
Salud y Prevención de la enfermedad.

Dirección General de Salud Pública.

Distribución por grupos de edad y sexo

GRUPO EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
14 y <	40	3,2	12	4,1
15 a 20 años	149	12	25	8,6
21 a 30 años	309	24,8	51	17,5
31 a 40 años	325	26,2	81	27,8
41 a 50 años	297	23,9	84	28,9
51 a 60 años	91	7,3	32	11
61 y >	32	2,5	6	2
TOTAL	1243	100%	291	100%

- Los inicios de tratamiento notificados durante 2010 en la Comunidad Autónoma han sido **1.534**, el **81 % de los inicios de tratamiento corresponde a hombres y el 19 % a mujeres**.
- Los inicios de tratamiento entre los **jóvenes de 14 a 20 constituyeron el 14 %**. El grupo de edad de **31 a 50 años representó el mayor porcentaje de inicios de tratamiento con un 51,33 %**.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA. 2010

GRUPO EDAD		Alcohol	Anfetam	Benzodiac	Cannabis	Cocaína	Heroína	Otros estimul	Otros opioides	Sust volátiles
14 y <	52	1			49	1		1		
15 a 20 años	174	15	13		116	22	8			
21 a 30 años	360	85	35	1	56	142	33	2	4	2
31 a 40 años	406	174	8	2	21	109	81		11	
41 a 50 años	381	279	1	6	4	34	50		6	1
51 a 60 años	123	110		2		5	4	1	1	
61 y >	38	36						1		
TOTAL	1534	700	57	11	246	313	176	5	22	3


- jóvenes **de 14 a 20 años** iniciaron tratamiento en un **73% por consumo de cannabis** (65,7 % en 2009 y 67,7% en 2008), seguido por **consumo de cocaína 10,18%** (14,6% en 2009 y 16,4% en 2008), por **consumo de alcohol 7 %** y **consumo de anfetaminas 5,75%** (8,2 % en 2009 y 10% en 2008).

- jóvenes **de 21 a 30 años** la droga por la que se iniciaron más tratamientos fue la **cocaína con un 39,5%** (44,8 % en 2009 y 46,9 % en 2008), seguido de **alcohol con un 23,6%** (17,6 % en 2009 y 10,6 % en 2008) y **cannabis (15,56%)** junto con **anfetaminas (9,7%)** y **heroína (9,17%)**.

Distribución por grupos de edad y sustancias

- Entre los **31-40 años** el mayor porcentaje de tratamientos iniciados fue por abuso de **alcohol 42,86%** (40,3% en 2009) seguido por consumo de **cocaína 26,85%** (23,7% en 2009), **heroína más otros opiáceos 25,56%** (26,8% en 2009).
- El grupo de edad entre **41-50 años**, inició tratamiento en el **73,23% de los casos por alcohol** (62,2 % en 2009), seguido de **heroína y otros opiáceos con un 14,7%** (19,5% en 2009) y de **cocaína con un 9,4%** (11,8 % en 2009).
- El **89,5%** de los inicios de tratamiento para el grupo de edad comprendido entre los **51 a 60 años se produce por consumo de alcohol** (88,3 % en 2009, 85,9% en 2008), seguidos de **cocaína y heroína y otros opiáceos 4%**.
- Los inicios de tratamiento **para el grupo de edad de 61 y más** que suponen un 2,4 % del total de tratamientos iniciados, el **97,3 % de los casos fue por consumo de alcohol**.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIAS. 2010




- Los **hombres** iniciaron tratamiento durante 2010 en **primer lugar por alcohol con 44%** (2009, 36,2%), seguido con un **26,1% seguido por estimulantes** (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes; 2009, 29 %) y opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 12,7% (16,7 % el año anterior).
- Con respecto a las **mujeres**, iniciaron tratamiento un **52,6% por alcohol** (un aumento importante respecto al 43,2% de 2009), seguido por **estimulantes** (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes) con un **17,5%** (2009, 22 %) y los **opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 13,7%**.

Distribución por provincia y sustancia

- Los tratamientos **por alcohol han supuesto el mayor porcentaje en el conjunto de Aragón** con un **45,6%** (2009, 37,6%), seguidos de **estimulantes** (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes) con un 24,5% (2009, 27,7%), **cannabis 16%** y **opiáceos** (heroína más otros opiáceos) **12,9%** (16,4% el año anterior).
- Si observamos los datos **por provincias, las diferencias fundamentales las encontramos en los inicios de tratamiento por heroína** (Zaragoza: 15,6%; Huesca: 6% y Teruel: 4,3%), **y por cannabis** (Teruel: 19,9%; Zaragoza: 15,2% y Huesca: 14,6%).


DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS 2010



Distribución por provincia y sustancia

Grupo sustancia	Aragón	Total	Zgza	Teruel	Huesca	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alcohol	45,63%	700	405	139	156	51,8%	46,2%	43,5%
Anfetaminas	3,72%	57	33	9	15	5%	3%	3,5%
Benzodiacepinas	0,72%	11	9	0	2	0,7%	0%	1%
Cannabis	16,04%	246	142	60	44	14,6%	19,9%	15,20%
Cocaína	20,47%	314	190	61	63	20,9%	20,3%	20,4%
Heroína	11,47%	176	145	13	18	6%	4,3%	15,6%
Otros estimulantes	0,33%	5	2	1	2	0,7%	0,3%	0,2%
Otros opioides	1,43%	22	3	18	1	0,3%	6%	0,3%
Sustancias volátiles	0,20%	3	3	0	0	0%	0%	0,3%
	100%	1534	932	301	301	100%	100%	100%

Distribución por continente



Distribución por procedencia de casos

PROCEDENCIA	TOTAL	%
Otro servicio drogas	128	8,3%
Servicios sanitarios	503	32,8%
Servicios sociales	79	5,1%
Prisión/Judicial	123	8,0%
Familiares/Amigos	242	15,8%
Iniciativa propia	394	25,7%
Otros	58	3,8%
Desconocido	7	0,5%
Total	1534	100,0%

por iniciativa propia (25,7%) o a través de familiares y amigos (15,8%) en un total del 41,5% de los casos. En el 32,5% de los casos,+4% respecto a 2009, los pacientes llegan a los centros a través de servicios sanitarios. El 8,3% procede de otros servicios de drogas.

Distribución por situación de convivencia

CONVIVENCIA	TOTAL	%
Solo/a	250	16,3%
Únicamente con pareja	197	12,8%
Únicamente con hijos/as	40	2,6%
Con la pareja e hijos/as	298	19,4%
Con padres o familia de origen	552	36,0%
Con amigos/as	33	2,2%
Otras	136	8,9%
Desconocida	28	1,8%
	1534	100,0%


El 36% de pacientes vivían con padres o familia de origen en los treinta días anteriores al inicio de tratamiento. El 19,4% de los pacientes vivían con la pareja e hijos/as y el 16,3 % vivían solos

Distribución por situación de residencia

RESIDENCIA	TOTAL	%
Alojamiento inestable/precario	22	1,4%
Casas, pisos, apartamento	1412	92,0%
Desconocida	4	0,3%
Otras instituciones	9	0,6%
Otro lugar	58	3,8%
Pensiones, hoteles, hostales	5	0,3%
Prisión, centro de reforma o de internamiento cerrado para menores	24	1,6%
	1534	100,0%

En 2010 el 92% de los pacientes declaran haber vivido en casas, pisos o apartamentos en los treinta días antes de iniciar tratamiento. El porcentaje de personas que procedían de prisión o de centro de reforma para menores es de 1,6%.

NIVEL DE ESTUDIOS - INICIO TRATAMIENTO 2010




El 38% de pacientes tienen estudios primarios y el 53% secundarios, en torno al 6% tienen estudios universitarios.

Distribución por nivel de estudios y sustancia

GRUPO SUSTANCIA	Total	Desc	No lee	Otro	Primarios	Secundarios	Univ Medio	Univ Sup
Alcohol	700	31	2	2	280	321	37	27
Anfetaminas	57	2	0	0	17	38	0	0
Benzodiacepinas	11	1	0	0	3	6	1	0
Cannabis	246	4	0	0	68	167	3	4
Cocaína	314	9	0	0	92	197	7	9
Heroína	176	6	2	0	94	72	0	2
Otros estimulantes	5	0	0	0	2	3	0	0
Otros opioides	22	0	0	0	12	10	0	0
Sustancias volátiles	3	0	0	0	2	1	0	0
	1534	53	4	2	570	815	48	42

SITUACIÓN LABORAL - TRATAMIENTO 2010



Distribución por situación laboral

Grupo sustancia	Total	Trabajando	En paro	Otras	Incapac. O Pensionista	Estudiante	Descon.
Alcohol	700	314	236	41	85	4	20
Anfetaminas	57	24	27	0	1	5	0
Benzodiazepinas	11	5	4	1	1	0	0
Cannabis	246	52	62	6	5	103	18
Cocaína	314	162	120	11	10	4	7
Heroína	176	31	94	33	13	1	4
Otros estimulantes	5	1	2	0	1	1	0
Otros opioides	22	9	9	0	4	0	0
Sustancias volátiles	3	0	2	0	0	0	1

Distribución por tratamiento previo por la misma droga

Grupo sustancia	Sí	% Sí	No	% No	Des con.	Total
Alcohol	322	46,0%	339	48,4%	39	700
Anfetaminas	23	40,4%	31	54,4%	3	57
Benzodiacepinas	2	18,2%	6	54,5%	3	11
Cannabis	75	30,5%	141	57,3%	30	246
Cocaína	148	47,1%	151	48,1%	15	314
Heroína	151	85,8%	25	14,2%	0	176
Otros estimulantes	3	60,0%	2	40,0%	0	5
Otros opioides	17	77,3%	5	22,7%	0	22
Sustancias volátiles	2	66,7%	1	33,3%	0	3
<i>Total</i>	743	48,4%	701	45,7%	90	1534

Situación serológica VIH relacionada con el tipo de sustancia

Grupo sustancia	Total	Sin prueba	Positivo	Negativo	Descon.
Alcohol	700	453	9	127	111
Anfetaminas	57	38	0	5	14
Benzodiazepinas	11	7	1	0	3
Cannabis	246	194	1	14	37
Cocaína	314	183	6	77	48
Heroína	176	52	47	68	9
Otros estimulantes	5	2	0	1	2
Otros opioides	22	7	5	8	2
Sustancias volátiles	3	1	0	1	1

1534

937



69

301

227

El 61 % no tiene prueba para determinación de anticuerpos VIH y el 14,8% es desconocida. El 75,3% de los resultados positivos corresponde a personas que iniciaron tratamiento por consumo de opiáceos (heroína más otros opiáceos), frente al 83,3% de 2009.

Evolución Admisión a tratamiento 2003- 2010



Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas

Aragón - Resumen Datos 2010 -

Sección de Drogodependencias

Distribución del Indicador Urgencias

Por sexo		
HOMBRES	127	69%
MUJERES	58	31%
TOTAL	185	100%

Por nacionalidad		
ESPAÑA	29	15,7%
RUMANIA	2	1,1%
ARGELIA	1	0,5%
CHILE	1	0,5%
COLOMBIA	1	0,5%
REPÚBLICA DOMINICANA	1	0,5%
DESCONOCIDO	150	81,1%
TOTAL	185	100%

Por franjas de edad	2010	%
15-19 AÑOS	18	10%
20-24 AÑOS	33	18%
25-29 AÑOS	31	17%
30-34 AÑOS	28	15%
35-39 AÑOS	21	11%
40-44 AÑOS	21	11%
45-49 AÑOS	24	13%
50-54 AÑOS	9	5%
TOTAL	185	100%

*Datos recogidos tras la revisión de las urgencias del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza

Sustancias mencionadas (total) en las Urgencias

2009		
HIPNÓTICOS Y SEDANTES	93	25%
ALCOHOL +OTRA SUSTANCIA	71	19%
COCAÍNA	55	15%
CANNABIS	54	15%
OTRAS SUSTANCIAS	35	9%
OTROS OPIÁCEOS	20	5%
HEROÍNA	15	4%
ANFETAMINAS	24	6%
ALUCINÓGENOS	2	1%
MDMA Y DERIVADOS	0	0%
SUSTANCIAS VOLÁTILES	3	1%
TOTAL	372	100%

2010		
HIPNÓTICOS Y SEDANTES	84	21%
CANNABIS	77	19%
ALCOHOL +OTRAS SUSTANCIAS	75	19%
COCAÍNA	48	12%
OTRAS SUSTANCIAS	48	12%
ANFETAMINAS	22	5%
OTROS OPIÁCEOS	19	5%
DESCONOCIDAS	16	4%
HEROÍNA	10	2%
MDMA Y DERIVADOS	2	1%
ALUCINÓGENOS	1	0%
TOTAL	402	100%

* Sustancias mencionadas ≠ sustancias relacionadas

El cannabis pasa al segundo lugar de las sustancias mencionadas (+4%). Hipnóticos y sedantes se mantienen como las más mencionadas debido a los intentos de suicidio.

Sustancias relacionadas (total) con las Urgencias

Sustancias relacionadas con los diagnósticos		
HIPNÓTICOS Y SEDANTES	47	25%
ALCOHOL +OTRAS SUSTANCIAS	44	23%
COCAÍNA	24	12%
CANNABIS	24	12%
OTRAS SUSTANCIAS	14	7%
ANFETAMINAS	14	7%
OTROS OPIÁCEOS	10	6%
DESCONOCIDA	8	4%
HEROÍNA	6	3%
MDMA Y DERIVADOS	1	1%
ALUCINÓGENOS	0	0%
TOTAL	192	100%

URGENCIAS RELACIONADAS	101	55%
URGENCIAS NO RELACIONADAS	84	45%
TOTAL	185	100%

- el grupo de sustancias que aparece **con más frecuencia es el grupo de hipnóticos y sedantes** (25%), seguido de **alcohol +otras** (23%), **cocaína** (12%), **cannabis** (12%), **anfetaminas** (7%), otras sustancias psicoactivas (7%), otros opiáceos (6%), sustancias desconocidas (4%) y heroína (3%)

- Mantienen la misma línea que en 2009, el cannabis como relacionada aumenta un 2%

Urgencias. Distribución de los diagnósticos mencionados

Trastornos mentales y del comportamiento	232	66%
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	31	9%
Causas externas de morbilidad y de mortalidad	20	6%
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa	16	5%
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	16	5%
Enfermedades del sistema respiratorio	11	3%
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	6	2%
Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo	6	2%
Enfermedades del sistema nervioso	4	1%
Enfermedades del sistema circulatorio	3	1%
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	2	0%
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0%
Enfermedades de la sangre	2	0%
Enfermedades del aparato digestivo / Enfermedades del ojo y sus anexos / Enfermedades del sistema genito urinario (agrupadas)	3	%
TOTAL	354	100%

* Varios diagnósticos por urgencia

Evolución Urgencias

	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
HOMBRES	137	62.6%	174	71%	139	61%	127	67%	128	64%	127	69%
MUJERES	82	37.4%	71	29%	89	39%	62	33%	73	36%	58	31%
TOTAL	219	100%	245	100%	228	100%	189	100%	201	100%	185	100%

GRUPO SUSTANCIA	2008	2009	2010
COCAÍNA	33%	27%	12%
HIPNÓTICOS Y SEDANT	51%	46%	21%
ALCOHOL + OTRA SUS	34%	35%	19%
CANNABIS	28%	27%	19%
OTROS OPIÁCEOS	15%	10%	5%
ANFETAMINAS	13%	12%	5%
HEROÍNA	13%	8%	2%
OTRAS SUSTANCIAS	24%	17%	12%
MDMA Y DERIVADOS	2%	0%	1%
ALUCINÓGENOS	2%	1%	0%
SUSTANCIAS VOLÁTILES	1%	2%	0%


Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas

Aragón - Resumen Datos 2010 -

Sección de Drogodependencias

Indicador Mortalidad. Evolución 2003 - 2010

	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
HOMBRES	3	100%	4	67%	6	86%	4	100%	6	100%	8	89%	16	80%	7	70%
MUJERES	0	0	2	33%	1	14%	0	0	0	0	1	11%	4	20%	3	30%
TOTAL	3	100	6	100	7	100	4	100	6	100	9	100%	20	100%	10	100%



Indicador Mortalidad. Evolución sustancias analizadas 2003 - 2010

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
OPIÁCEOS	3	4	7	4	9	10	34	7
COCAÍNA	2	1	5	4	4	6	12	4
BENZODIACEPINAS	1	5	4	0	1	0		3
ANFETAMINAS	1	0	0	0	0	0	2	0
MDMA Y DERIVADOS	1	0	0	0	0	0	5	0
CANNABIS	1	2	1	0	1	1	8	4
ALCOHOL	1	2	0	0	0	3	5	4
OTROS	3	6	3	0	1	3	1	2
TOTAL CASOS ANALIZADOS	3	6	7	4	5	9	20	10