

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 26 de noviembre de 2020 (publicada en B.O.A. nº 248 de 17/12/2020)

Categoría:

Facultativo Especialista de Área de PSIQUIATRÍA

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de: 120 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Cualquier marca en la hoja de respuestas podrá dar lugar a la anulación del examen.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMÉN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS

SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA DE PSIQUIATRÍA

- 1 Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven, se denomina:
 - A: Personal estatutario sanitario.
 - B: Personal estatutario de gestión y servicios.
 - C: Personal estatutario fijo.
 - D: Personal estatutario temporal.

- 2 Según los criterios de causalidad de Hill, "la asociación observada repetidamente por varias personas, en sitios, circunstancias y épocas diferentes" se denomina:
 - A: Fuerza
 - B: Consistencia
 - C: Especificidad
 - D: Temporalidad

- 3 El concepto Calidad Total de los servicios sanitarios incorpora uno de los siguientes aspectos fundamentales:
 - A: El nivel científico técnico.
 - B: La satisfacción del paciente.
 - C: Distribución equitativa de recursos.
 - D: Sistemas de información centralizados.

- 4 El Comité de Bioética de Aragón está adscrito a:
 - A: La Dirección General de Asistencia Sanitaria.
 - B: La Dirección General de Salud Pública.
 - C: La Dirección de Coordinación Asistencial.
 - D: La Dirección General de Calidad y Atención al Usuario.

- 5 El procedimiento de actualización de la Cartera de Servicios del Sistema de Salud de Aragón se regula en:
 - A: La Orden de 20 de julio de 2015.
 - B: El Decreto 65/2007, de 8 de mayo.
 - C: La Orden de 11 de julio de 2007.
 - D: El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.

- 6 Según el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa, un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
- A: Hasta 100 funcionarios: 10.
 - B: De 101 a 250 funcionarios: 20.
 - C: De 501 a 750 funcionarios: 30.
 - D: De 501 a 750 funcionarios: 40.
- 7 En un ensayo clínico, "la asignación aleatoria del tratamiento o no tratamiento a los participantes" se denomina:
- A: Randomización.
 - B: Reclutamiento de los participantes.
 - C: Análisis de los datos.
 - D: Sesgo de información.
- 8 En cuanto al deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, indique la respuesta FALSA:
- A: La obligación general del deber de confidencialidad será suplementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
 - B: Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.
 - C: La obligación general del deber de confidencialidad será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
 - D: La obligación del deber de confidencialidad se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
- 9 Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las sanciones impuestas al personal estatutario por la comisión de faltas graves prescriben:
- A: A los 10 años.
 - B: A los 5 años.
 - C: A los 2 años.
 - D: A los 6 meses.
- 10 La principal medida de la magnitud de la asociación en los estudios de casos y controles es:
- A: Odds ratio.
 - B: Significación estadística.
 - C: Intervalo de confianza.
 - D: Riesgo relativo.
- 11 El síndrome cultural consistente en hipersensibilidad al terror súbito, acompañado de ecolalalia, ecopraxia, obediencia a la autoridad y comportamiento disociativo o anormal, es conocido como:
- A: Dhat.
 - B: Koro.
 - C: Latah.
 - D: Shenjing shuairuo.

- 12** En relación a los mecanismos de defensa y los trastornos de la personalidad. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones es cierta?
- A: La escisión es una forma de dirigir la ira contra uno mismo.
 - B: La identificación proyectiva es utilizada principalmente por personas con trastorno paranoide de la personalidad.
 - C: En la fantasía se crean vidas imaginarias y son típicas de personalidades depresivas.
 - D: La disociación permite sustituir afectos desagradables por otros agradables.
- 13** Dentro de los trastornos del espectro autista (TEA) indique la respuesta correcta:
- A: Se caracterizan por dificultades en cuatro dominios sintomáticos: interacción, comunicación social, lenguaje y patrones de comportamiento estereotipados
 - B: Es cada vez más importante en las personas con TEA la identificación de etiologías específicas con estudios de genética molecular.
 - C: La diferenciación entre Asperger y TEA de alto funcionamiento tiene un alto consenso entre expertos.
 - D: El tratamiento farmacológico es imprescindible en todos los casos.
- 14** ¿Cuál de las siguientes patologías es MENOS probable que se incluya en el diagnóstico diferencial del Trastorno de Pánico?
- A: Hipertiroidismo.
 - B: Hipoparatiroidismo.
 - C: Feocromocitoma.
 - D: Prolapso de la válvula mitral.
- 15** Según el DSM-5, una adolescente con disforia de género que se ha sometido a una penectomía para confirmar su sexo femenino deseado se considera que se encuentra en periodo de:
- A: Cambio de sexo.
 - B: Postransición.
 - C: Transición.
 - D: Ambivalencia sexual.
- 16** Entre el inventario de los factores, de los mecanismos terapéuticos, que operan en psicoterapia de grupo, considerados por I. D. Yalom, NO se encontraría uno de los siguientes:
- A: Universalidad.
 - B: Catársis.
 - C: Altruismo.
 - D: Disociación.
- 17** El proceso de evaluación de los problemas de pareja, resulta fundamental para concretar la situación dentro de las etapas de cambio que permita la intervención más adecuada. Señale la respuesta que considere INCORRECTA:
- A: Los problemas de pareja están codificados en los principales sistemas diagnósticos (CIE-10. DSM 5).
 - B: La exploración de la violencia en la pareja es ineludible, incluyendo el riesgo vital y su presencia contraindica el inicio de una terapia de pareja.
 - C: La evaluación inicial se aconseja habitualmente que sea con entrevistas individuales con cada miembro de la pareja.
 - D: Las creencias distorsionadas, (como pensar que los desacuerdos en la pareja son destructivos) se correlacionan con expectativas negativas acerca de la terapia.

- 18** Varios psicofármacos pueden inhibir la isoenzima CPY450 2D6 alterando su actividad. Señale el que NO actúa así:
- A: Bupropion.
 - B: Fluoxetina.
 - C: Fluvoxamina.
 - D: Paroxetina.
- 19** En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 5ª edición (DSM -5) el trastorno facticio está incluido dentro de:
- A: Trastornos disociativos.
 - B: Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados.
 - C: Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica.
 - D: Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés.
- 20** ¿Cuál es la situación que con mayor probabilidad puede causar un trastorno de estrés postraumático (TEPT)?
- A: Verse afectado por un terremoto.
 - B: Ser diagnosticado de cáncer.
 - C: Ser víctima de una violación.
 - D: Ser testigo de un crimen.
- 21** ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la alexitimia?
- A: Término acuñado por Kahlbaum.
 - B: Los pacientes con alexitimia refieren sueños profusos y abundantes fantasías.
 - C: El pensamiento en los pacientes alexitímicos es literal, utilitario y preocupado por acontecimientos externos.
 - D: El estilo comunicativo muestra una marcada utilización en el pensamiento simbólico.
- 22** En Urgencias, al valorar a un paciente de mediana edad con clínica maniaca atípica, identificas que presenta el signo de Argyll-Robertson, ¿cuál de las siguientes respuestas es verdadera?
- A: Solicitarías colaboración a Infecciosas para descartar borreliosis (enfermedad de Lyme).
 - B: Hay miosis pupilar bilateral en la oscuridad (efecto Flynn).
 - C: No hay atrofia del iris y la lesión se produce en lóbulo occipital.
 - D: El reflejo ante la luz está ausente aunque se conserva el reflejo de acomodación.
- 23** De los siguientes fármacos, ¿cuál es MENOS probable que precipite un episodio de manía?
- A: Bromocriptina.
 - B: Isoniazida.
 - C: Propranolol.
 - D: Disulfiram.
- 24** Los siguientes fármacos se emplean para atenuar los síntomas del síndrome de abstinencia a opiáceos EXCEPTO:
- A: Metadona.
 - B: Clonidina.
 - C: Buprenorfina.
 - D: Naltrexona.

- 25** En un paciente en su primer episodio psicótico que acude a Urgencias y para el que, dentro de un plan global de tratamiento, se recomienda una pauta de tranquilización rápida. Según las recomendaciones de la Academia Americana de Urgencias Psiquiátricas (Proyecto BETA), ¿cuál de las siguientes respuestas sería la opción más recomendable?
- A: Haloperidol y diazepam ambos IM.
 - B: Antipsicóticos de nueva generación y corta duración IM.
 - C: Zuclopentixol acufase y biperideno IM.
 - D: Haloperidol, levomepromacina y diazepam IM.
- 26** Respecto a la obra de Melanie Klein, ¿cuál de las siguientes respuestas es FALSA?
- A: Hizo hincapié en la existencia de relaciones de objeto tempranas, considerándolas fundamentales en el desarrollo psíquico.
 - B: Comenzó trabajando en análisis con niños e introdujo la técnica del juego infantil para tener acceso a sus conflictos.
 - C: Describió un Complejo de Edipo temprano, un súper-yo temprano y mecanismos de defensa primitivos organizados en torno a una angustia principal.
 - D: Definió la posición Esquizo-Paranoide a partir de los 12 meses de edad.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la violencia y enfermedad mental es FALSA?
- A: Los estudios epidemiológicos encuentran mayor riesgo de comportamiento violento en las personas con esquizofrenia comparadas con la población general.
 - B: Las personas con trastorno mental grave tienen más probabilidad de convertirse en víctimas de un delito que en perpetradores del mismo.
 - C: Las falsas identificaciones, los delirios de amenaza y las alucinaciones imperativas son algunos de los rasgos psicopatológicos que se han relacionado con la violencia en la esquizofrenia.
 - D: El crimen cometido por las personas con esquizofrenia suele ser impulsivo, sin planificar ni conversar con la víctima, dejando muchos indicios en el lugar de los hechos. Habitualmente sobre personas desconocidas, sin relación previa.
- 28** ¿Cuál de las siguientes medidas NO es adecuada para la prevención del síndrome de desgaste profesional del personal sanitario?
- A: Disminuir la propia reactividad emocional.
 - B: Facilitar la resiliencia desde el inicio de la vida, incluida la académica (actitud de ayuda profesional eficaz desde pregrado).
 - C: No diferir las libranzas de las guardias, elegir bien la especialidad-centro docente y potenciar la presentificación en el trabajo.
 - D: Ser proactivo y eficiente en la colaboración con los pacientes y con otros profesionales.
- 29** En relación a los trastornos de la personalidad, ¿cuál de las siguientes respuestas es FALSA?
- A: Tienen un curso prolongado, son egosintónicos y aloplásticos.
 - B: Hay elevaciones del 5-hidroxiindolacético en personas impulsivas y agresivas.
 - C: La disocialidad se relaciona con actos médico-legales, al igual que la depresión y tentativas de suicidio con las personalidades límites o la somatización con la personalidad histriónica.
 - D: La sociabilidad se ha asociado a concentraciones bajas de la monoaminooxidasa plaquetaria.

- 30** Los fármacos antipsicóticos ocupan los receptores D2 del encéfalo en las primeras horas después de su administración, sin embargo, los síntomas psicóticos con frecuencia tardan más en desaparecer. De las siguientes afirmaciones señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Se considera que son necesarias 4-6 semanas para que los fármacos comiencen a actuar.
 - B: Los pacientes que van a responder escasamente al tratamiento farmacológico (“refractarios”) tienen pocos cambios las primeras semanas del tratamiento.
 - C: Los síntomas psicóticos que se observan en personas no esquizofrénicas ni psicóticas con frecuencia desaparecen en las horas siguientes a la administración de una única dosis de un fármaco antipsicótico bloqueante de los receptores D2.
 - D: Estudios recientes han mostrado que la máxima reducción sintomática podría producirse en las primeras 2 semanas de tratamiento.
- 31** En relación con los trastornos disociativos, indique la respuesta CORRECTA:
- A: Es poco importante el procesamiento de la información en el cerebro.
 - B: Se mantienen en el área de la psicopatología para la cual el mejor tratamiento es la psicofarmacología.
 - C: Los diferentes tipos tienen en común la dificultad de acceso inmediato a la estructura completa de la personalidad o al contenido mental en una u otra forma.
 - D: No tienen apenas historia en la psicopatología clásica.
- 32** Respecto al traslado del paciente agitado, señale la respuesta correcta:
- A: En la actualidad no existe ningún protocolo en la Comunidad Autónoma de Aragón para el traslado del paciente agitado a un centro hospitalario.
 - B: En caso de tener que proceder a la contención mecánica y traslado en contra de la voluntad del paciente se requerirá siempre de la oportuna autorización judicial.
 - C: La primera prioridad en la atención del paciente agitado es su seguridad y la del personal sanitario encargado.
 - D: Las fuerzas de orden público que intervengan pueden acceder a toda la documentación de la historia clínica del paciente en ausencia de su consentimiento y autorización judicial.
- 33** Son síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, según criterios de la “CIE 10ª, clasificación de trastornos mentales y del comportamiento: descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico” de la OMS, todos los siguientes, EXCEPTO:
- A: Aprensión.
 - B: Neurastenia.
 - C: Hiperactividad vegetativa.
 - D: Tensión muscular.
- 34** En relación a los mecanismos específicos del COVID para producir delirium u otras complicaciones en SNC y en sus sistemas de neurotransmisión (NEUROCOVID) ¿Cuál es la respuesta FALSA?:
- A: Daño neuronal a través de hipoxia y trombosis.
 - B: Inflamación del SNC tras tormenta de citoquinas.
 - C: Reacción autoinmune postinfecciosa.
 - D: Disminución de la producción de noradrenalina tanto en SNC como en SN periférico.

- 35** Si hablamos de la valoración de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) mediante test, cuestionarios y entrevistas indique la respuesta correcta:
- A: Instrumentos de criba como el Eating Attitudes Test (EAT-40) proporcionan de forma segura un diagnóstico acertado y preciso de los TCA.
 - B: El SCOFF es un instrumento de criba de TCA validado en español que consta sólo de 6 preguntas dicotómicas (Si/No).
 - C: La entrevista semiestructurada Eating Disorder Examination (EDE) con versión española destaca entre las utilizadas en anorexia nerviosa (AN).
 - D: Para la insatisfacción corporal en la AN los cuestionarios autoaplicados BITE y BULIT son los más adecuados.
- 36** ¿Con cuál de las siguientes situaciones clínicas se asocia más frecuentemente al Síndrome de Fibromialgia?
- A: Hipomanía.
 - B: Trastorno de Pánico.
 - C: Trastorno de Ansiedad Generalizada.
 - D: Depresión.
- 37** En relación al síndrome serotoninérgico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:
- A: La determinación analítica de serotonina y sus metabolitos son de utilidad para el diagnóstico.
 - B: Hay manifestaciones en SNC (delirium/agitación), inestabilidad autonómica y síntomas gastrointestinales.
 - C: Hay signos característicos como el clonus/mioclónia.
 - D: Hay múltiples factores de riesgo como cirugía, litio, LSD y fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, incluidos los IMAOS.
- 38** Señala el orden de jerarquía de evidencia (de mayor a menor) de los siguientes tipos de estudios:
- A: Revisión Sistemática > Metanálisis > Estudio Controlado Aleatorizado > Estudio de Cohortes.
 - B: Metanálisis > Revisión Sistemática > Estudio de Casos y Controles > Series de Casos.
 - C: Metanálisis > Estudio de Casos y Controles > Revisión Sistemática > Opinión de Expertos.
 - D: Todas las anteriores son falsas.
- 39** ¿Cuál de los siguientes NO es un instrumento de diagnóstico estandarizado diseñado para la promoción de la epidemiología psiquiátrica?
- A: Escala de evaluación clínica en neuropsiquiatría (SCAN).
 - B: Examen internacional de los trastornos de personalidad (IPD).
 - C: Test de apercepción temática (TAT).
 - D: Entrevista diagnóstica internacional compuesta (CIDI).
- 40** ¿Cuál de los siguientes antidepresivos es modulador de la neurotransmisión glutamatérgica mediante la potenciación de la función del receptor AMPA?
- A: Tianeptina.
 - B: Vilazodona.
 - C: Desvenlafaxina.
 - D: Vortioxetina.

41 Respecto de la familia, es cierto que:

- A: El estilo comunicacional más adecuado es la comunicación enmascarada e indirecta.
- B: El estilo comunicacional menos adecuado es la comunicación clara y directa.
- C: La comunicación en la familia se ejerce principalmente en dos campos: el instrumental y el afectivo.
- D: La autoridad pertenece claramente a la generación de los hijos.

42 Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A: El trastorno de conversión es crónico y generalmente más relacionado con una constelación de síntomas.
- B: El trastorno de síntomas somáticos se diferencia del trastorno de ansiedad por enfermedad en que en la segunda el énfasis recae sobre la presencia de múltiples síntomas y en la primera sobre el temor a tener una enfermedad.
- C: En el diagnóstico del trastorno de síntomas somáticos deben descartarse enfermedades como SIDA, la miastenia gravis o la esclerosis múltiple.
- D: El trastorno de síntomas somáticos se diferencia del trastorno facticio con síntomas físicos en que los pacientes con trastorno de síntomas somáticos simulan sus síntomas.

43 De los siguientes grupos de pacientes, ¿cuál es el que tiene un menor riesgo para desarrollar un Delirium?:

- A: Ancianos.
- B: Grandes quemados.
- C: Pacientes con lesiones cerebrales previas.
- D: Personas sometidas a estrés psicológico intenso.

44 En relación con la memoria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

- A: Los recuerdos de la infancia se almacenan pero no pueden ser recuperados hasta que los infantes tienen 3 años.
- B: Se pueden crear recuerdos ilusorios.
- C: Las amnesias psicógenas no afectan la capacidad de aprender nueva información.
- D: Los lóbulos frontales son fundamentales para la memoria declarativa.

45 En relación con el Programa de Rehabilitación "Terapia Psicológica Integrada" conocido por su siglas IPT, señale la respuesta correcta:

- A: Fue diseñado por Hogarty en 1994.
- B: Opera en un marco psicosocial con material significativo para el paciente; usa la contingencia y el refuerzo social.
- C: Consta de 4 módulos que incluyen: establecimiento de alianza terapéutica, taller de habilidades de supervivencia, reincorporación a la vida normalizada y terapia familiar o sesiones de apoyo.
- D: Se basa en el modelo de recuperación (recovery).

46 En relación al síndrome de abstinencia del alcohol denominado delirium tremens, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

- A: El periodo de mayor incidencia es entre las 72 y las 96 horas después de la última ingestión etílica.
- B: La carbamacepina 800mg/día puede ser igual de efectiva como tratamiento que las benzodiazepinas en tratamiento oral o parenteral.
- C: Las alteraciones en la sensoripercepción incluyen de forma no exclusiva la modalidad visual (microzoopsias, liliputienses).
- D: En un 15% de los pacientes con convulsiones por abstinencia llegan al status epiléptico.

- 47 La OMS en el año 2000 elaboró un documento para ayudar a los profesionales de la información para realizar una información adecuada del suicidio. ¿Cuál de las siguientes NO es una recomendación?
- A: Referirse al suicidio como un hecho logrado y no como un suceso exitoso.
 - B: Publicitar indicadores de riesgo.
 - C: Informar de detalles específicos del suicidio.
 - D: Resaltar las alternativas al suicidio.
- 48 En el actual concepto de trastorno explosivo intermitente, según DSM-5:
- A: Los arrebatos agresivos requeridos deben de ser físicos.
 - B: La edad cronológica o grado de desarrollo debe ser de al menos 6 años.
 - C: La prevalencia recogida en los estudios es similar en diferentes localizaciones geográficas.
 - D: Las tres anteriores son incorrectas.
- 49 En relación al síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: La determinación de tiamina en sangre es prueba diagnóstica.
 - B: Son causas posibles de Wernicke la hiperémesis en embarazo, la anorexia nerviosa, la gastrectomía o la hemodiálisis entre otras.
 - C: Se puede prevenir su precipitación en la atención en Urgencias al paciente alcohólico administrando 100mg de tiamina por cada litro de solución glucosada.
 - D: Las alteraciones de la motilidad ocular deben ser bilaterales y simétricas.
- 50 Dentro del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en infancia y adolescencia indique la respuesta INCORRECTA:
- A: El diagnóstico del TDAH en niños y adolescentes es exclusivamente clínico.
 - B: En el TDAH puede haber disregulación emocional, además de la triada sintomática clásica.
 - C: La comorbilidad se encuentra en cerca de dos terceras partes de los niños remitidos a consulta por TDAH.
 - D: Los estimulantes como la atomoxetina y la exguanfacina tienen la indicación para el tratamiento del TDAH.
- 51 En relación al internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la FALSA?:
- A: Pueden tener carácter ordinario o urgente (comunicación en plazo máximo de 24 horas y ratificación de la autoridad judicial en plazo máximo de 72 horas).
 - B: Una vez autorizado el ingreso los informes se realizarán al menos cada 6 meses o antes si el clínico lo considera.
 - C: Al paciente con autorización de ingreso involuntario no se le podrá dar el alta sin avisar previamente al Juzgado.
 - D: El internamiento de menores se realizará siempre en establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe a los Servicios de asistencia al menor.
- 52 Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto a la discapacidad intelectual diagnosticada según criterios DSM-5:
- A: En la discapacidad intelectual leve el individuo puede funcionar de forma apropiada a la edad en el cuidado personal.
 - B: En la discapacidad intelectual moderada el comportamiento social y comunicativo a lo largo del desarrollo no presenta diferencias respecto a sus iguales.
 - C: En la discapacidad intelectual grave el individuo necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, como comer, vestirse, bañarse y las funciones excretoras.
 - D: En la discapacidad intelectual profunda el individuo puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos.

- 53** ¿Cuál de los siguientes tipos de fobia específica tendrá más probabilidad de cursar asociada a un cuadro vasovagal?:
- A: Animal.
 - B: Situacional.
 - C: Tipo sangre-inyecciones-heridas.
 - D: Del entorno natural.
- 54** Todo lo siguiente corresponde a características de los trastornos delirantes en los ancianos, EXCEPTO:
- A: Las ideas delirantes persecutorias y somáticas son las más comunes.
 - B: Los delirios persecutorios generalizados se han llegado a observar hasta en un 4% de personas mayores de 65 años.
 - C: La privación sensorial puede ser un factor de riesgo potencial.
 - D: La parafrenia, trastorno delirante de inicio tardío, está asociada a demencia subyacente.
- 55** Señale cuál es la respuesta FALSA respecto a las causas de discapacidad intelectual:
- A: La rubeola es la causa más frecuente de discapacidad intelectual adquirida por infección materna.
 - B: La toxoplasmosis se puede transmitir al feto pero la vía más común es la transmisión en el canal del parto.
 - C: La zidovudina es útil para prevenir la transmisión del VIH de la madre al feto.
 - D: En el síndrome alcohólico fetal la discapacidad intelectual es frecuente sin el síndrome completo fenotípico.
- 56** En lo referente a los trastornos psicóticos inducidos por tóxicos, ¿qué es INCORRECTO?
- A: Aproximadamente un 3% de pacientes alcohólicos experimentan alucinaciones auditivas o delirios paranoides durante la intoxicación o la abstinencia.
 - B: Se ha demostrado que, en el 35% de los casos, la evolución de un primer episodio de psicosis a Esquizofrenia o Trastorno bipolar está asociado al consumo de sustancias.
 - C: El cannabis es el tóxico que produce una mayor tasa de conversión (47%) desde un primer episodio de psicosis a Esquizofrenia o Trastorno bipolar.
 - D: Los trastornos psicóticos inducidos por la cocaína son más comunes en el consumo intranasal que en los consumidores de crack y de cocaína intravenosa.
- 57** En urgencias atendemos a un varón de 32 años, con antecedentes de politoxicomanía, que aqueja síntomas psicóticos bizarros e inexplicables, que impresiona simular, aparentemente con el fin de obtener tranquilizantes o psicofármacos como automedicación. Revisando en la historia clínica electrónica encontramos que ha venido teniendo desde hace un tiempo una conducta de peregrinaje entre diferentes hospitales y centros sanitarios simulando enfermedades para obtener medicaciones. ¿Qué epónimo ha recibido esta conducta?
- A: Síndrome de Ganser.
 - B: Síndrome de Damocles.
 - C: Síndrome de Briquet.
 - D: Síndrome de Asuero.
- 58** Respecto de la Escala de Inteligencia Wechsler del Adulto en su 4ª Edición (WAIS-IV), ¿qué respuesta es INCORRECTA?
- A: Consta de siete subtest.
 - B: Puede administrarse entre los 16 y los 89 años y 11 meses de edad.
 - C: El span de dígitos evalúa la memoria de trabajo.
 - D: Las puntuaciones compuestas se transforman a una escala métrica con una media de 100 y una desviación estándar de 15.

- 59** En relación a la Terapia Electroconvulsiva (TEC) se consideran factores de riesgo asociados con el incremento de los efectos secundarios cognitivos todos los siguientes, EXCEPTO:
- A: Género masculino.
 - B: Tratamiento farmacológico concomitante.
 - C: Tipo de onda sinusoidal y mayor amplitud de pulso.
 - D: Posición bilateral de los electrodos.
- 60** Dentro de los trastornos del espectro autista (TEA) indique la respuesta correcta:
- A: Se han identificado más de 2000 genes "causales" del autismo.
 - B: La comorbilidad de TEA con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es más frecuente entre las personas adultas.
 - C: El trastorno de apego reactivo no se debe considerar dentro del diagnóstico diferencial de los TEA.
 - D: Dentro de la sintomatología asociada más habitual están los trastornos del sueño y la alimentación.
- 61** En los trastornos disociativos indique la respuesta INCORRECTA:
- A: En el conocimiento moderno de los trastornos disociativos se ha explorado el vínculo entre disociación y trauma.
 - B: La hipnosis permite a los pacientes con amnesia disociativa reorientarse en el tiempo y tener acceso a los recuerdos antes disociados.
 - C: Se puede usar amobarbital sódico o sedantes de acción corta para revertir la amnesia o fuga disociativa.
 - D: El trastorno de despersonalización no es fundamentalmente un trastorno de la integración de la experiencia perceptiva.
- 62** En la entrevista psiquiátrica hay que tener en cuenta que...
- A: Es poco importante establecer un buen rapport con el paciente que va ser entrevistado.
 - B: Hacer preguntas para ampliar y mejorar la conexión emocional con el paciente puede ser muy contraproducente.
 - C: La entrevista psiquiátrica eficaz permite al profesional obtener los datos necesarios para la evaluación.
 - D: Las preguntas de respuesta cerrada facilitan al paciente dar respuestas detalladas y emocionalmente significativas.
- 63** Señale cual de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:
- A: La dificultad en la identificación de sentimientos y su expresión correlacionan con una amplificación somatosensorial.
 - B: La somatización puede ser definida como la percepción selectiva y focalización en manifestaciones somáticas del trastorno con denegación o mínima aceptación de los cambios afectivos y cognitivos.
 - C: El uso de los síntomas somáticos y la metáfora somática para comunicar distrés emocional sólo se da en determinados lenguajes y culturas.
 - D: Las quejas de disforia emocional en términos de síntomas somáticos pueden reflejar la limitación de la profesión médica para escuchar las quejas más que la pobreza del lenguaje o de expresión verbal en el paciente.
- 64** En relación a los antagonistas opiáceos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:
- A: La prueba de provocación con naloxona (0.8 mg. IV o SC) se utiliza para verificar que no ha habido toma de opiáceos antes de la inducción de la terapia con naltrexona.
 - B: La naltrexona y la naloxona son antagonistas fuertes de los receptores opioides mu, kappa y delta.
 - C: El nalmefeno puede ser eficaz como pauta de deshabitación rápida.
 - D: La naltrexona puede causar hepatotoxicidad que es dosis dependiente, salvo que haya hepatotoxicidad previa.

- 65** La Asociación Americana de Psiquiatría en la "Guía para Valoración y Tratamiento de Pacientes con Conductas Suicidas" (APA, 2010) recoge las siguientes definiciones. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Suicidio: muerte autoinfligida, con evidencia (implícita o explícita) de que la persona tiene intención de morir.
 - B: Intento suicida: conducta autolesiva con resultado no fatal acompañada de evidencia (implícita o explícita) de que la persona tenía intención de morir.
 - C: Letalidad de la conducta suicida: peligro objetivo para la vida asociado con un método o acción suicida.
 - D: Autolesiones intencionales: actos dolorosos deliberados y autoinfligidos, destructivos o perjudiciales, con intención de causar la muerte.
- 66** ¿En qué año se estableció la Declaración de Madrid de la Asociación Mundial de Psiquiatría referente a la Ética y derechos del paciente?
- A: 1990.
 - B: 1992.
 - C: 1995.
 - D: 1996.
- 67** ¿Cuál de estos fármacos NO está indicado oficialmente para la ansiedad por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios?
- A: Lorazepam.
 - B: Diazepam.
 - C: Clonazepam.
 - D: Bromazepam.
- 68** En relación con los factores etiológicos de las parafilias, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: Hay identificación inadecuada con el progenitor del sexo opuesto.
 - B: Suponen infancias erotizadas debido a un abuso específicamente de naturaleza sexual.
 - C: En ellos puede ser útil el manejo de la angustia de castración.
 - D: Puede haber diferentes anomalías en el neurodesarrollo.
- 69** En el uso de la Carbamazepina en el tratamiento del Trastorno Bipolar es FALSO que:
- A: Presenta un proceso de autoinducción metabólica característico.
 - B: Estados mixtos y ciclación rápida son predictores de respuesta.
 - C: Ataxia y diplopía son dos efectos secundarios independientes de la dosis.
 - D: La intoxicación se caracteriza por agitación, alucinosis, disartria, hiperreflexia, midriasis, nistagmus y taquicardia sinusal.
- 70** Respecto a la neurobiología del sueño, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El sueño lento es más sensible a la regulación del sistema homeostático (aumenta conforme se acumulan las horas de vigilia).
 - B: El sueño REM es más sensible al sistema circadiano (ritmo sueño/vigilia).
 - C: La alternancia del sueño lento con el sueño REM viene determinado por el sistema ultradiano.
 - D: El glutamato parece ser el neurotransmisor más importante en la inactivación del sueño REM.

- 71** La Teoría General de Sistemas se caracteriza por 3 conceptos principales. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Totalidad.
 - B: Funcionalidad.
 - C: Circularidad.
 - D: Equifinalidad.
- 72** El Dialogo Abierto, terapia originada en Laponia, basada en el enfoque dialógico de M. Bajtin, y desarrollada por Jaakko Seikkula se caracteriza por los siguientes principios, EXCEPTO:
- A: Intervención estandarizada y manualizada.
 - B: Respuesta inmediata.
 - C: Inclusión de la red de apoyo social.
 - D: Tolerar la incertidumbre.
- 73** Uno de los factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular es el patrón de personalidad tipo A. Respecto a ello, ¿cual de las siguientes afirmaciones es cierta?
- A: La terapia de modificación de conducta no es útil para reducir los episodios de isquemia.
 - B: La hostilidad incrementa la modulación parasimpática del ritmo cardíaco.
 - C: Los niveles de lípidos se incrementan durante los conflictos interpersonales.
 - D: La hostilidad se asocia a descenso de catecolaminas circulantes.
- 74** En los criterios de investigación del trastorno delirante (CIE 10ª) es necesario:
- A: Ideas delirantes presentes al menos 3 meses.
 - B: Ausencia de alucinaciones.
 - C: Ausencia de síntomas depresivos.
 - D: Especificar los subtipos de delirios.
- 75** Respecto a la actual Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia en España (LORE) 3/2021, señale la afirmación FALSA:
- A: En el caso de una enfermedad mental crónica que genera un sufrimiento insoportable el médico responsable consultará a un psiquiatra que actuará como médico consultor.
 - B: Según la ley, todas las personas con enfermedad mental que soliciten acogerse al derecho a la eutanasia deberán ser evaluadas por un psiquiatra o un psicólogo durante el proceso.
 - C: Las personas con enfermedad mental grave no están excluidas per se del derecho a solicitar la eutanasia según la LORE.
 - D: El médico responsable debe valorar la capacidad de una persona adulta para solicitar la prestación de derecho a la ayuda para morir.
- 76** Desde la fenomenología, (psicopatología descriptiva), y de una forma restrictiva, las "experiencias pasivas" en la esquizofrenia vienen definidas por los siguientes fenómenos, de los que se debería EXCLUIR uno de ellos:
- A: Son recibidas por el paciente de forma pasiva e involuntaria. Son experiencias simples, inmediatas e impuestas.
 - B: Son no opcionales, inevitables, evidentes en sí mismas.
 - C: Son actos de formulación de juicios por el paciente para comprender o explicar cada una de las experiencias pasivas.
 - D: Con frecuencia se experimentan como enigmáticas y desconcertantes.

- 77** El modelo de "Indefensión Aprendida" fue desarrollado por Martin Seligman en estudios de Psicología experimental en animales y desarrollado en perros expuestos a una corriente eléctrica de la que no podían escapar. Se propuso que la indefensión aprendida es un modelo animal relacionado con la génesis de un trastorno. ¿Con cuál de los siguientes trastornos se relaciona este modelo?
- A: Depresión.
 - B: Trastorno de pánico.
 - C: Trastornos fóbicos.
 - D: Esquizofrenia.
- 78** Los objetivos de organización citados por la mayoría de autores para la psicoterapia de apoyo son:
- A: Mejorar los síntomas, mejorar y estimular la adaptación, la autoestima y el funcionamiento global.
 - B: Desarrollar insight de sentimientos, pensamientos, necesidades y conflictos previamente no identificados.
 - C: Cambiar la estructura del ego y de la personalidad.
 - D: Bastante diferentes de los objetivos de la psicoterapia psicoanalítica, pero similares a los de la psicoterapia expresiva.
- 79** Dentro de la terapia de conducta indique la respuesta INCORRECTA:
- A: El conductismo tiene como figuras de referencia a Watson y Thorndike.
 - B: Los incitadores son estímulos o acciones que facilitan la ejecución de determinado comportamiento.
 - C: El reforzamiento se refiere a la presentación contingente de un reforzador para aumentar la probabilidad de aparición de una conducta que se quiere incrementar
 - D: El encadenamiento no se parece en nada al moldeamiento, no es como una versión del mismo.
- 80** ¿Cuál de las siguientes ideas delirantes NO es propia de la melancolía?:
- A: Primarias.
 - B: De culpabilidad.
 - C: Hipocondríacas.
 - D: Nihilistas.
- 81** En el Trastorno Bipolar, ¿qué es cierto en referencia a la ciclación rápida?
- A: Más frecuente en hombres que en mujeres.
 - B: Suele responder adecuadamente al tratamiento con antidepresivos tricíclicos.
 - C: Se define como 4 o más episodios al mes.
 - D: Alcohol, cafeína y estimulantes son factores de riesgo.
- 82** Dentro de la terapia de conducta indique la respuesta correcta:
- A: El aislamiento (time out) no tiene que ver con la extinción.
 - B: La saciación usa la presentación o consumo repetido de un estímulo gratificante para incrementar su valor como reforzador.
 - C: La hipercorrección consiste en ignorar una conducta inadecuada nada más producirse.
 - D: La extinción es la retirada de un reforzador que mantiene la conducta.
- 83** ¿Cuál de las siguientes asociaciones es cierta entre el autor y la psicoterapia de grupo de la que se considera haber sido creador de la misma?
- A: Psicodrama – Moreno.
 - B: Grupo Tavistock – Lewin.
 - C: El Grupo T – Bion.
 - D: Grupo de Encuentro – Slavson.

- 84** En relación al tratamiento psicofarmacológico de personas con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿cuál es la respuesta FALSA?
- A: La atomoxetina, lisdexanfetamina, clonidina, guanfacina y modafinilo son fármacos aprobados por la FDA con esta indicación.
 - B: Los simpaticomiméticos deben evitarse en caso que haya comorbilidad con tics.
 - C: Los simpaticomiméticos no afectan al crecimiento según estudios longitudinales.
 - D: Los simpaticomiméticos aumentan concentraciones de warfarina, amitriptilina y fenobarbital cuando hay administración concomitante.
- 85** En relación a indicadores clínicos de depresión que pueden predecir un viraje posterior a trastorno bipolar, ¿cuál es la respuesta FALSA?
- A: El comienzo de la clínica depresiva precoz (antes de los 25 años).
 - B: El inicio rápido de los síntomas y la finalización brusca.
 - C: La ausencia de estresores en los primeros episodios depresivos.
 - D: Los síntomas como hipersomnia, incremento de peso, retardo psicomotor.
- 86** En los enfoques teóricos que explican la depresión, ¿cuál es la respuesta FALSA?
- A: Las personas con depresión, según la terapia cognitiva, presentan la triada cognitiva caracterizada por un pensamiento negativo sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre su futuro.
 - B: El enfoque cognitivo de Beck explica la depresión en función de las atribuciones internas, globales y estables referidas a los sucesos negativos.
 - C: Hay modelos sobre la importancia de la autoevaluación, autoobservación y autorrefuerzo.
 - D: En otros se enfatiza en la importancia de la percepción de emociones negativas.
- 87** Señale cual de las siguientes afirmaciones NO es cierta:
- A: Levy-Bruhl distinguía dos clases de mentalidades en las sociedades: una prelógica, propia de las sociedades primitivas y muy difícil de entender por los que pertenecemos a la otra mentalidad, la lógica.
 - B: Durkheim mostró estadísticamente la elevada correlación existente entre la tasa de suicidios y la de enfermedades mentales en distintos países con escasa influencia de factores sociales.
 - C: HS Sullivan consideraba que el individuo poseería dos objetivos, uno el de obtener satisfacciones que responderían a una necesidad biológica, y otro el de obtener seguridad, que respondería a una necesidad cultural.
 - D: Parsons en su teoría de la desviación trató de definir y de caracterizar a todas aquellas conductas humanas que se separan de las que tiene prescritas la sociedad.
- 88** ¿Qué psicopatología NO está asociada a las respuestas aproximadas (Vorbeighen)?
- A: Obnubilación de la conciencia.
 - B: Pseudodemencia histérica.
 - C: Pseudología fantástica.
 - D: Problema de salud física o estrés emocional intenso.

89 Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la enfermedad coronaria:

- A: Friedman y Rosenman en 1959 describen el patrón de personalidad tipo A como un sujeto ambicioso, competitivo, impaciente, hostil, deseoso de éxito y de reconocimiento por los demás, con necesidad de resolver las cosas con urgencia y una gran dificultad para relajarse.
- B: Se ha demostrado que los sujetos con personalidad tipo A tienen un riesgo dos veces superior al resto de la población de padecer patología coronaria.
- C: La patología coronaria más grave se ha observado en pacientes que presentaban puntuaciones elevadas de hostilidad y además tendían a reprimir sus expresiones de ira, de manera que la combinación de estos dos rasgos parece ser el factor psicológico más nocivo.
- D: La conducta sumisa actúa como factor de riesgo frente a la arteriopatía coronaria.

90 Señale la respuesta correcta en el trastorno de insomnio:

- A: Es más frecuente en varones.
- B: La polisomnografía en este trastorno puede detectar una disminución de la fase 1 y prolongación de las fases 3 y 4.
- C: El insomnio paradójico ("mala percepción del propio sueño") se caracteriza por una queja subjetiva de insomnio grave en ausencia de evidencias objetivas.
- D: Los horarios de sueño irregulares suponen una mayor fragmentación del mismo.

91 ¿Cuál es el término utilizado por Zetzel (1956) para la "transferencia positiva inobjetable", componente de la relación real, parte esencial del principio sobre el que se basa toda la psicoterapia y su eficacia?

- A: Contratransferencia.
- B: Interpretación.
- C: Defensas.
- D: Alianza terapéutica.

92 Respecto de la comorbilidad en el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

- A: No suele ser superior a la presentada en otros trastornos psiquiátricos.
- B: El TEPT suele ser el trastorno secundario.
- C: Episodios depresivos mayores, trastornos por uso de sustancias (TUS) y trastornos de conducta suelen ser los más presentes en términos de prevalencia-vida.
- D: Ninguna de las anteriores es correcta.

93 Respecto del litio, ¿cual es el enunciado FALSO?

- A: Biodisponibilidad del 100%.
- B: El litio intraeritrocitario es un indicador poco fiable de las concentraciones cerebrales.
- C: Atraviesa fácilmente la placenta.
- D: La única vía de administración es la oral.

94 ¿Cuál de los siguientes trastornos NO se encuentra enmarcado en el capítulo de Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de las conductas, en el actual DSM-5?

- A: Trastorno negativista desafiante.
- B: Ludopatía.
- C: Cleptomanía.
- D: Piromanía.

- 95 En la realización de terapia cognitivo-conductual, todos los siguientes son procesos terapéuticos para su empleo por el terapeuta EXCEPTO:
- A: Animar a que reduzca las horas de trabajo para combatir el estrés.
 - B: Explorar el modelo de creencias del paciente.
 - C: Utilizar las palabras que utiliza el paciente para describir su malestar.
 - D: Establecer objetivos y metas desde el principio.
- 96 ¿Qué hallazgos en el estudio de líquido cefalorraquídeo son orientativos de Enfermedad de Alzheimer?
- A: Aumento de los niveles de beta-amiloide y reducción de los niveles de tau y fosfo-tau.
 - B: Aumento de los niveles de beta-amiloide y aumento de los niveles de tau y fosfo-tau.
 - C: Reducción de los niveles de beta-amiloide y aumento de los niveles de tau y fosfo-tau.
 - D: Hasta el momento todavía no se han descrito hallazgos en el estudio de líquido cefalorraquídeo que orienten a Enfermedad de Alzheimer.
- 97 Respecto a la farmacocinética de las siguientes benzodiazepinas. ¿Cuál tiene la vida media más larga?
- A: Midazolam.
 - B: Lorazepam.
 - C: Diazepam.
 - D: Triazolam.
- 98 ¿Cuál de los siguientes fármacos disminuye el umbral convulsivo?
- A: Benzodiacepinas.
 - B: Barbitúricos.
 - C: Anticomiciales.
 - D: Litio.
- 99 La terapia de pareja debe tener en cuenta una serie de consideraciones que contextualicen su relevancia. Entre las siguientes respuestas señale la INCORRECTA:
- A: Las parejas que viven una relación de pareja positiva suelen tener un mejor ajuste psicológico, mejor estado de salud y menos conductas de riesgo.
 - B: La convivencia en pareja ha dejado de ser la opción prioritaria debido a los múltiples cambios acontecidos en las últimas décadas.
 - C: Los hijos de las parejas en conflicto pueden ser más propensos a desarrollar problemas emocionales y de comportamiento.
 - D: Los procesos básicos que median en las relaciones entre personas del mismo sexo son prácticamente idénticos a los de las relaciones heterosexuales.
- 100 ¿Cuál de las siguientes es FALSA?
- A: Se han descrito episodios de psicosis tanto en casos de hipertiroidismo como de hipotiroidismo.
 - B: El hipotiroidismo se ha relacionado con el trastorno bipolar de ciclos rápidos.
 - C: Los síntomas de hipotiroidismo se solapan con los de la depresión, por lo que una prueba de ACTH está indicada como cribado de hipotiroidismo en pacientes con clínica depresiva.
 - D: Puede estar indicado el tratamiento con tiroxina en pacientes con trastorno afectivo, aunque sean eutiroides.

- 101** El mecanismo de acción y otras características de los fármacos antipsicóticos definen una farmacología que algunos autores consideran "sucía" y otros "rica". ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en relación a estas propuestas es INCORRECTA?
- A: Los antipsicóticos de primera generación se comportan como antagonistas no selectivos sobre los receptores D 2 con un margen estrecho entre eficacia y efectos secundarios.
 - B: La inducción enzimática puede justificar el aumento de los niveles de lurasidona cuando se combina con carbamazepina.
 - C: La farmacología se ocupa de como el paciente utiliza el fármaco determinando la adherencia y los resultados terapéuticos, e involucrando a cuidadores, prescriptores y proveedores.
 - D: El antagonismo de los receptores H-1 (histaminérgicos) está relacionado con el aumento del apetito y del peso generado por clozapina.
- 102** Dentro de los trastornos de ansiedad en infancia y adolescencia indique la respuesta INCORRECTA:
- A: La farmacoterapia con inhibidores de la recaptación de serotonina es una práctica clínica habitual en el trastorno de pánico en la adolescencia.
 - B: El trastorno de pánico en la adolescencia tiene un curso crónico y suele ser comórbido con otros trastornos de ansiedad y depresión.
 - C: El tratamiento de primera línea del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en infancia y adolescencia es la terapia cognitivo conductual (TCC).
 - D: El tratamiento de primera línea del trastorno de ansiedad episódica paroxística, trastorno de pánico y agorafobia en infancia y adolescencia es la fluoxetina.
- 103** El médico de atención primaria remite por sospecha de deterioro cognitivo a un paciente varón de 72 años con un Mini-Mental State Examination (MMSE) de 25 puntos. Para su evaluación se quiere utilizar otro instrumento desarrollado para la evaluación del deterioro cognitivo leve, heteroaplicado, cuyo tiempo de aplicación es aproximadamente de 10 minutos, cuya puntuación oscila de 0 a 30 y que evalúa los siguientes dominios cognitivos: memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, capacidad visuoespacial y orientación. ¿De qué otro test de cribado se trata?
- A: Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
 - B: Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) (Cuestionario de Pfeiffer).
 - C: Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo y colaboradores (MEC).
 - D: Test de los 7 minutos (7 Minute Screen, 7MT).
- 104** En el Plan de Salud Mental 2017-2021 de Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Se plantean como líneas estratégicas las siguientes EXCEPTO:
- A: Facilitar la toma de decisiones clínicas y de gestión disponiendo de un sistema de información fiable y útil.
 - B: Facilitar un entorno que favorezca el desarrollo, autonomía y responsabilidad de los profesionales.
 - C: Facilitar mediante la participación, la información y la colaboración con entidades y asociaciones, la autonomía y los derechos del paciente.
 - D: Facilitar, potenciar y garantizar la asistencia de calidad, integral y continuada en grupos de exclusión, medios penitenciarios e infanto-juveniles.
- 105** Un ejemplo de prevención primaria selectiva en salud mental infanto-juvenil sería:
- A: Intervenciones para reducir el acoso escolar.
 - B: Intervenciones en niños en edad preescolar con síntomas subumbral de trastornos de la conducta.
 - C: Monitorización de pacientes con síndrome velo-cardio-facial.
 - D: Identificación en edad infantil del trastorno psicótico incipiente.

- 106** El lupus eritematoso sistémico es un trastorno autoinmune que se acompaña frecuentemente de manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Cuál de los siguientes trastornos acompaña con MENOS frecuencia al lupus eritematoso sistémico?
- A: Disfunción cognitiva.
 - B: Depresión.
 - C: Ansiedad.
 - D: Psicosis.
- 107** Señale la respuesta INCORRECTA :
- A: La Tomografía Axial Computerizada (TAC) tiene como desventajas frente a la Resonancia Magnética (RM) su capacidad radiante y la limitada capacidad para aportar información en múltiples planos.
 - B: Los aparatos ferromagnéticos en el paciente suponen una contraindicación de la Resonancia Magnética (RM).
 - C: La Resonancia Magnética (RM) tiene una mayor capacidad para diferenciar la sustancia gris y blanca que la Tomografía Axial Computerizada (TAC).
 - D: La resolución de las imágenes es mayor en la Tomografía Computerizada por emisión de fotón simple (SPECT) que en la Tomografía por emisión de positrones (PET).
- 108** ¿Cuál de las siguientes intervenciones psicosociales en la esquizofrenia, adaptada de la rehabilitación del accidente cerebrovascular, consiste en el entrenamiento de funciones cognitivas específicas?
- A: Entrenamiento en habilidades sociales.
 - B: Intervenciones familiares.
 - C: Terapia cognitivo-conductual de reestructuración de emociones o experiencias aberrantes.
 - D: Técnicas de remediación cognitiva.
- 109** ¿Cuál de las siguientes asociaciones es FALSA?
- A: Delirio Erotomaniaco Síndrome de Clerambault.
 - B: Delirio Nihilista Síndrome de Cotard.
 - C: Delirio Sensitivo-Referencial Kretschmer.
 - D: Simulación Síndrome de Munchausen.
- 110** ¿Qué aportación psiquiátrica de los siguientes autores españoles del siglo XX es correcta?
- A: Lopez Ibor: la naturaleza biológica de las neurosis de angustia y su tratamiento igualmente biológico.
 - B: L. Valenciano: describió el "síndrome axil" que consideraba común a todas las psicosis, reivindicando la tesis de la psicosis única.
 - C: B. Llopis: el delirio consistiría en un cambio estructural negativo en el campo de las creencias.
 - D: Todas son falsas.

