

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL  
ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 13 de diciembre de 2021 (B.O.A. nº 257, de 21 de diciembre de 2021)

**CATEGORÍA:**

**ENFERMERO/A**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 16 inclusive.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de: 1:45 HORAS para turno LIBRE y 1:30 HORAS para PROMOCIÓN INTERNA.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuéstionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Cualquier marca en la hoja de respuestas podrá dar lugar a la anulación del examen.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN". LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**

**ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

**TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS  
SU INCUMPLIMIENTO PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



**1.- Señale la respuesta INCORRECTA. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aplica a:**

- A) Los partidos políticos y las organizaciones sindicales.
- B) La Administración General del Estado.
- C) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- D) Las Entidades que integran la Administración Local.

**2.- Conforme a la Orden SAN/441/2021, de 27 de abril, por la que se distribuyen funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes órganos del Servicio Aragonés de Salud, la aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Aragonés de Salud corresponde a:**

- A) La Dirección de Área de Coordinación Asistencial.
- B) La Dirección de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos del SALUD.
- C) La Dirección de Área de Recursos Humanos.
- D) La Dirección Gerencia del Servicio Aragonés Salud.

**3.- Conforme al artículo 27 del Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón, el Gerente del Sector será designado por:**

- A) El Presidente del Gobierno de Aragón.
- B) El Gobierno de Aragón.
- C) El titular del Departamento responsable en materia de Salud.
- D) El Gerente del Servicio Aragonés de Salud.

**4.- Conforme al artículo 43 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, se denomina:**

- A) Complemento de destino.
- B) Complemento específico.
- C) Complemento de productividad.
- D) Complemento de atención continuada.

**5.- Conforme al artículo 9 de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, el departamento competente en materia de sanidad y asuntos sociales desarrollará medidas para apoyar a las profesionales víctimas de violencia, EXCEPTO:**

- A) El apoyo psicológico y médico necesario cuando así lo requieran.
- B) La protección necesaria para que se garantice su derecho a la intimidad.
- C) La asistencia necesaria para los profesionales que puedan ser víctimas de violencia, desde su solicitud y durante todo el proceso.
- D) La calidad permanente en los servicios de atención especializada.

**6.- Conforme al artículo 37 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, cuando de un procedimiento de movilidad voluntaria se derive un cambio en el Servicio de Salud de destino, el plazo de la toma de posesión será de:**

- A) Tres días a contar desde el día del cese en el destino anterior.
- B) Quince días a contar desde el día del cese en el destino anterior.
- C) Treinta días a contar desde el día del cese en el destino anterior.
- D) Un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior.

**7.- De conformidad con la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, la identidad sexual o de género se define como:**

- A) La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina.
- B) La definida por terceros.
- C) El sexo asignado al momento del nacimiento.
- D) La que figura en el Documento Nacional de Identidad u otro documento equivalente.

**8.- El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece que la Seguridad Social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico, es una competencia:**

- A) Exclusiva.
- B) Ejecutiva.
- C) Compartida.
- D) Básica.

**9.- Conforme al artículo 9 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, cuál de los siguientes supuestos es INCORRECTO:**

- A) El titular con derecho a la información clínica es el paciente.
- B) El titular con derecho a la información clínica es el paciente y los familiares o personas allegadas cuando preste su conformidad de forma explícita.
- C) Si el médico responsable de la asistencia considera que el paciente no se encuentra en condiciones de recibir la información debido a su estado físico o psíquico, deberá ponerla en conocimiento de los familiares o personas allegadas al paciente.
- D) En el supuesto de incapacidad del paciente, este no debe ser informado.

**10.- Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Indica ¿cuál de las siguientes prestaciones NO corresponde a Atención Primaria?:**

- A) La asistencia sanitaria a demanda, urgente y programada.
- B) Prescripción y realización de técnicas y procedimientos diagnósticos.
- C) Las actividades en prevención, promoción de la salud, atención familiar y comunitaria.
- D) La asistencia especializada en hospital de día, médico-quirúrgica.

**11.- Conforme al artículo 81 de la Constitución Española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:**

- A) Mayoría de dos tercios del Congreso.
- B) Mayoría de tres quintos del Congreso.
- C) Mayoría simple del Congreso.
- D) Mayoría absoluta del Congreso.

**12.- De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes principios NO forma parte del Código de Conducta de los empleados públicos?:**

- A) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
- B) Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
- C) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
- D) Resolverán los expedientes de su competencia en un plazo máximo de 10 días.

**13.- El artículo 2 de la Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, refiere, entre sus principios básicos:**

- A) El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre los profesionales clínicos disponibles.
- B) Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera.
- C) Buena parte de las actuaciones en el ámbito de la sanidad requieren, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios.
- D) La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica será profesional sanitario.

**14.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones que las Administraciones sanitarias públicas y demás instituciones y organismos ostentan en materia de formación continuada, así como de coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo, se constituye la:**

- A) Comisión de Docencia.
- B) Comisión Autonómica para la Formación Continuada.
- C) Comisión de Formación Continuada.
- D) Consejo Nacional de Especialidades.

**15.- Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos se mantendrá:**

- A) Hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
- B) Hasta 2 años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
- C) Hasta 3 años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
- D) Aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

**16.- Indique la respuesta correcta, en relación con la población en Aragón:**

- A) Más de la mitad de la población vive en capitales de provincia.
- B) La población extranjera representa más del 25% de la población.
- C) La población total de Aragón supera los 2 millones de personas.
- D) Los municipios de hasta 2.000 habitantes suponen el 50% del total de la población.

**17.- ¿Cuál de las siguientes soluciones puede mezclarse en vía periférica en una transfusión de hemoderivados?:**

- A) Solución de Ringer lactato.
- B) Solución glucosalina al 5 %.
- C) Suero fisiológico al 0,9 %.
- D) Suero glucosado al 5 %.

**18.- ¿Cuál de los siguientes es un factor interno que afecta a la colaboración en los cuidados centrados en la persona y la familia?:**

- A) Los determinantes de la salud.
- B) La estructura y el entorno sanitario.
- C) Las características de los profesionales de la salud y de la persona y su familia.
- D) La evolución y la dinámica.

**19.- Según fuentes del Ministerio de Sanidad, en España el coste medio por proceso más elevado corresponde a:**

- A) Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).
- B) Leucemia aguda.
- C) Trasplante cardíaco.
- D) Trauma en la cabeza con coma profundo.

**20.- Dentro de las actividades relacionadas con la intervención enfermera NIC [1200]**

**Administración de nutrición parenteral total (NPT), NO se encuentra:**

- A) Mantener la permeabilidad y el apósito de la vía central, según el protocolo del centro.
- B) Utilizar una bomba de infusión para el aporte de las soluciones de NPT.
- C) Facilitar el uso del catéter para fines distintos a la administración de NPT (p. ej., transfusiones de sangre y toma de muestras de sangre).
- D) Evitar pasar rápidamente la solución de NPT que se ha retrasado para la infusión de otras sustancias.

**21.- Si se valora a un paciente que se encuentra en atención domiciliaria mediante el índice de Katz, se evalúa:**

- A) Su riesgo de úlceras por presión.
- B) Su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria básica.
- C) Su capacidad cognitiva.
- D) Su grado de depresión.

**22.- ¿Cuál de los siguientes es un indicador de evaluación dentro del programa de la Estrategia de Atención al paciente Crónico Complejo de Aragón?:**

- A) Porcentaje de altas de pacientes incluidos en programa en los que el Equipo de Atención Primaria realiza una visita presencial en los primeros diez días desde el alta.
- B) Porcentaje de pacientes incluidos en el programa que han fallecido en los doce primeros meses.
- C) Prevalencia de pacientes con enfermedad crónica registrada en Atención Primaria.
- D) Porcentaje de pacientes de la población diana ( $GMA \geq$  percentil 65) que se han incluido en el programa.

**23.- Según N. Dezin, en investigación cualitativa NO es un tipo de triangulación:**

- A) La triangulación de datos.
- B) La triangulación de teorías.
- C) La triangulación de técnicas.
- D) La triangulación de conveniencia.

**24.- Despues de identificar el diagnóstico enfermero de Afrontamiento Inefectivo (00069) con el fin de valorar específicamente el mismo, se debe indagar en los siguientes aspectos, EXCEPTO:**

- A) La percepción de la propia capacidad para manejar el estrés.
- B) La posibilidad de solicitar ayuda a los familiares o amigos.
- C) El grado de estrés o ansiedad.
- D) Variabilidad térmica de la persona.

**25.- El diagnóstico NANDA [00279] Deterioro de los procesos de pensamiento, tiene entre sus características:**

- A) Secuencia organizada de pensamiento.
- B) Deterioro de la interpretación de acontecimientos.
- C) Capacidad de juicio conservada.
- D) Respuesta emocional adecuada a las situaciones.

**26.- Según el proceso de atención a los pacientes con desnutrición en Aragón, ¿cuál de las siguientes escalas se recomienda para el cribado de Desnutrición?:**

- A) El Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002).
- B) Mini Nutritional Assessment (MNA).
- C) Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ).
- D) Malnutrition Screening Tool (MST).

**27.- Entre los objetivos del Programa de Atención al Ictus en Aragón NO se encuentra:**

- A) Reconocer exclusivamente por personal entrenado los primeros síntomas de un Ictus y actuar con rapidez para proporcionar un tratamiento específico.
- B) Incidir en el conocimiento del Ictus y su prevención con mensajes claros, concretos y mantenidos en el tiempo.
- C) Incidir en la adquisición de estilos de vida saludables y la necesidad de vigilar y controlar los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, abuso del alcohol, tabaco, sedentarismo, obesidad).
- D) Controlar la adherencia de las personas en riesgo de sufrir un Ictus a los tratamientos indicados y a los hábitos de salud recomendados.

**28.- ¿Cómo está estructurada la clasificación de los diagnósticos en la Taxonomía II de NANDA Internacional?:**

- A) Dominios, clases y diagnósticos.
- B) Campos, clases y diagnósticos.
- C) Diagnósticos, dominios y campos.
- D) Dominios, campos y clases.

**29.- Entre las manifestaciones que presentan los enfermos de Alzheimer, NO se encuentra:**

- A) Negativismo.
- B) Labilidad emocional.
- C) Perseveraciones verbales.
- D) Parpadeo compulsivo.

**30.- El Plan de Salud de Aragón 2030 aprobado en Consejo de Gobierno en mayo de 2018 estableció 4 áreas prioritarias. ¿Cuál de las siguientes NO es un área prioritaria de este plan?:**

- A) Mejorar la salud en todas las etapas de la vida.
- B) Investigar en salud medio ambiental.
- C) Orientar el sistema sanitario hacia las personas.
- D) Impulsar la información, la investigación y la formación en salud.

**31.- Dentro del plan de cuidados de enfermería para la atención de pacientes con necesidad de cuidados paliativos, ¿cuál de los siguientes Diagnósticos de Enfermería NO priorizarías?:**

- A) Afrontamiento familiar comprometido.
- B) Temor.
- C) Ansiedad ante la muerte.
- D) Desequilibrio nutricional por exceso.

**32.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades forma parte del cribado neonatal de enfermedades endocrino metabólicas?:**

- A) Hipertiroidismo congénito.
- B) Acidemia glutárica tipo I.
- C) Anemia normocítica.
- D) Deficiencia de Acil-coenzima A-deshidrogénasa de cadena larga.

**33.- Señale la respuesta correcta respecto a los modelos de enfermería:**

- A) El modelo de Hildegard Peplau se puede catalogar como de la orientación de teoría de sistemas.
- B) El modelo de Dorothy Johnson se puede catalogar como de relación interpersonal.
- C) El modelo de Martha Rogers se puede catalogar como de campo de energía.
- D) El modelo de Callista Roy se puede catalogar en el marco filosófico.

**34.- Respecto al Síndrome Compartmental Agudo, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) El dolor desaparece con el reposo y no deja secuelas en el tejido afectado.
- B) La causa más frecuente son las fracturas.
- C) En el examen físico se observa cianosis, disminución de la movilidad y disminución del pulso de la arteria principal del compartimento afectado.
- D) Se produce tensión en la zona, hinchazón y alteraciones sensitivas distales.

**35.- El estribo de Böhler se utiliza en:**

- A) Tracción manual.
- B) Tracción cutánea.
- C) Tracción transesquelética.
- D) Tracción blanda.

**36.- La escala de Glasgow para la valoración del nivel de conciencia incluye:**

- A) Valoración de las pupilas y respuesta motora.
- B) Valoración del dolor y respuesta verbal.
- C) Valoración de los pares craneales.
- D) Valoración ocular, respuesta motora y respuesta verbal.

**37.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las pautas que indirectamente protegen de los trastornos de la conducta alimentaria NO se deben transmitir como mensajes a la familia y al adolescente?:**

- A) Se recomienda realizar al menos una comida en casa al día con la familia.
- B) Se recomienda facilitar la comunicación y mejorar la autoestima de los adolescentes evitando que las conversaciones familiares giren compulsivamente sobre la alimentación y la imagen.
- C) Se recomienda evitar bromas y desaprobaciones sobre el cuerpo, el peso o la forma de comer de los niños y adolescentes.
- D) Se recomienda no hablar con los niños y adolescentes sobre los trastornos de la conducta alimentaria explícitamente.

**38.- En el consejo nutricional a los padres de niños de 2 a 6 años se incluyen los siguientes EXCEPTO:**

- A) Llevar una dieta variada, que incluya alimentos de todos los grupos.
- B) Limitar el acceso a alimentos y bebidas de alto contenido calórico y bajo en nutrientes.
- C) Evitar el uso de la comida o alimentos concretos como recompensa.
- D) Utilizar complementos protéicos y vitamínicos antes de la práctica deportiva.

**39.- Según la Escala Gijón de valoración sociofamiliar en el anciano (versión reducida), la "situación social buena" se obtiene con una puntuación de:**

- A) Más de 15 puntos.
- B) Entre 15 y 20 puntos.
- C) Menor o igual a 7 puntos.
- D) Entre 10 y 14 puntos.

**40.- ¿Qué modelo teórico proporciona a las enfermeras un marco para seleccionar las intervenciones que correspondan a cada fase del cambio de conducta?:**

- A) Modelo de equilibrio decisorio.
- B) Modelo de etapas de cambio.
- C) Modelo de autoeficiencia.
- D) Modelo de autocuidado.

**41.- La clasificación NIC, en su estructura, agrupa las intervenciones de enfermería en:**

- A) Campos y clases.
- B) Dominios y campos.
- C) Dominios y actividades.
- D) Intervenciones y actividades.

**42.- ¿Cuál de las siguientes suturas es de origen natural?:**

- A) Seda.
- B) Poliéster.
- C) Poligliconato.
- D) Poliglactina.

**43.- En un paciente diabético. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es microvascular?:**

- A) Nefropatía diabética.
- B) Enfermedad vascular cerebral.
- C) Enfermedad vascular periférica.
- D) Cardiopatía isquémica.

**44.- La fase II de un ensayo clínico con medicamentos se caracteriza por:**

- A) Demostrar la seguridad del compuesto y orientar hacia la pauta de administración más adecuada para estudios posteriores.
- B) Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento experimental en las condiciones de uso más parecidas a las habituales en la práctica clínica.
- C) Estudiar las condiciones de uso distintas de las autorizadas, como nuevas indicaciones del medicamento.
- D) Proporciona información preliminar sobre la eficacia del producto y establece la relación dosis-respuesta.

**45.- Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué método anticonceptivo se recomienda en la adolescencia?:**

- A) Método Billings.
- B) Método temperatura basal.
- C) Esponja vaginal.
- D) Preservativo.

**46.- Respecto a la hipertrfia benigna de próstata es cierto que:**

- A) Es la segunda causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre.
- B) Puede acompañarse de disminución en los niveles de la PSA sin tratamiento.
- C) La intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula.
- D) Puede acompañarse de insuficiencia renal crónica.

**47.- Según las necesidades y recomendaciones nutricionales para un adulto sano, ¿cuál es la proporción recomendada de los diferentes nutrientes en una dieta equilibrada?**

- A) Hidratos de carbono 50-60% / Grasas 25-30% / Proteínas 15-20% del aporte energético diario.
- B) Hidratos de carbono 40-50% / Grasas 15-20% / Proteínas 25-30% del aporte energético diario.
- C) Hidratos de carbono > 60% / Grasas 25% / Proteínas 10% de aporte energético diario.
- D) Hidratos de carbono > 50% / Grasas 35% / Proteínas 25% del aporte energético diario.

**48.- En relación a los Patrones funcionales de M. Gordon, NO se puede afirmar que:**

- A) La valoración por patrones funcionales tiene como objetivo determinar el perfil funcional del individuo.
- B) El juicio sobre si un patrón es funcional o disfuncional se hace comparando los datos obtenidos en la valoración con datos de referencia del individuo, normas establecidas según la edad del individuo, normas sociales o culturales, etc.
- C) Se busca la localización de aquellos patrones funcionales que están alterados, o en riesgo de alteración, en alguna medida, para posteriormente determinar un diagnóstico enfermero que describa esa situación.
- D) La valoración de cada uno de los patrones debe evaluarse independientemente del contexto de los demás.

**49.- La transmisión del virus del Zika NO puede darse:**

- A) Por Transmisión digestiva.
- B) Por Transmisión vertical.
- C) Por Transmisión sexual.
- D) Por Transmisión sanguínea.

**50.- Un niño de 10 años tendrá sobrepeso si:**

- A) Índice de masa corporal (IMC) se encuentra entre percentil entre 85 y 94 para la edad y el sexo.
- B) Índice de masa corporal (IMC) es igual o mayor percentil 95 para edad y sexo.
- C) Índice de masa corporal (IMC) es mayor que 30.
- D) Índice de masa corporal (IMC) es entre percentil entre 80 y 97 para altura y peso.

**51.- Siguiendo la evolución histórica del Proceso de Atención Enfermero, ¿de cuántas etapas constaba según Helen Yura y Mary Walsh?:**

- A) Cinco etapas: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.
- B) Cuatro etapas: Valoración, Planificación, Ejecución y Evaluación.
- C) Tres etapas: Análisis, Síntesis y Ejecución.
- D) Ninguna es correcta.

**52.- En la fijación y el sellado de la vía venosa periférica NO se recomienda:**

- A) Fijar el catéter utilizando fijación sin sutura.
- B) Utilizar conectores con válvula de cierre a rosca tipo Luer de presión positiva en los puertos de acceso a las vías venosas frente a tapones básicos.
- C) Sellar las vías venosas con suero fisiológico o solución de heparina sódica tras finalizar el lavado de las mismas con el fin de disminuir el riesgo de oclusión.
- D) Sellar con solución de alcohol al 96 % en pacientes neutropénicos portadores de catéter venoso central no tunelizados de más de un mes de duración, salvo si el catéter es de poliuretano, por el riesgo de degradación del mismo.

**53.- En Aragón, la hoja de notificación de situaciones de maltrato infantil, de uso en el ámbito sanitario, indica que en caso de notificación urgente, se debe remitir a:**

- A) Servicios sociales comunitarios.
- B) Policía.
- C) Servicio especializado de menores.
- D) Centro coordinador de 112.

**54.- Las fases de la enfermería basada en la evidencia son:**

- A) Formular una pregunta, encontrar la mejor evidencia disponible, aplicar la evidencia, elaborar protocolos o directrices, evaluar los resultados obtenidos.
- B) Identificar un problema, localizar la mejor evidencia, realizar una lectura crítica de artículos, elaborar protocolos o guías, evaluar los resultados.
- C) Resolver un problema, localizar la mejor evidencia, establecer la población a estudio, aplicar los procedimientos, escribir el artículo de investigación.
- D) Pensar una pregunta, establecer unos criterios, aplicar la evidencia, resumir los puntos más relevantes, evaluar los resultados.

**55.- ¿Cuál de los siguientes corresponde con un grupo de clasificación de residuos sanitarios, en la Comunidad Autónoma de Aragón?:**

- A) Grupo I. Residuos sanitarios no específicos.
- B) Grupo II. Cadáveres y restos humanos de entidad.
- C) Grupo V. Residuos químicos.
- D) Grupo VII. Residuos citostáticos.

**56.- ¿Cuándo se considera que hay una incontinencia urinaria funcional?:**

- A) Cuando hay una pérdida súbita de orina al realizar actividades que aumentan la presión intra-abdominal.
- B) Incapacidad de una persona, para llegar al inodoro a tiempo de evitar la pérdida involuntaria de orina, es el propio paciente quien no puede controlar la micción.
- C) Cuando hay una emisión involuntaria de orina poco después de sentir sensación de orinar.
- D) Cuando hay una pérdida involuntaria de orina asociada a una sobredistensión de la vejiga.

**57.- En un paciente diagnosticado de EPOC ¿cuál de las siguientes complicaciones potenciales es INCORRECTA?:**

- A) Desnutrición secundaria a hipoxemia.
- B) Mucositis relacionado con el tratamiento farmacológico.
- C) Hipertermia relacionada con infección.
- D) Mantenimiento ineficaz de la salud.

**58.- ¿Cuáles son los valores normales de la presión intracraneal (PIC) en el adulto?:**

- A) 5-15 mm de Hg.
- B) 15-20 mm de Hg.
- C) 5-15 cm de H<sub>2</sub>O.
- D) 15-20 cm de H<sub>2</sub>O.

**59.- Ante el diagnóstico enfermero, Disminución del gasto cardíaco relacionado con taquicardia evidenciado por deficiente irrigación sanguínea y alteración de la frecuencia cardiaca, ¿cuál de los siguientes resultados enfermeros NOC se priorizaría?:**

- A) 0407 Perfusion tisular: periférica.
- B) 0406 Perfusion tisular: cerebral.
- C) 0405 Perfusion tisular: cardíaca.
- D) 0408 Perfusion tisular: pulmonar.

**60.- En los pacientes con cáncer hematológico a menudo se administra una transfusión de glóbulos rojos para aumentar el nivel de hemoglobina y prevenir o tratar los síntomas de la anemia. Señalar la respuesta INCORRECTA:**

- A) Entre los riesgos potenciales de la transfusión se encuentran la erupción cutánea, fiebre, escalofríos y desarrollo de problemas respiratorios.
- B) Las reacciones a las transfusiones generalmente son de carácter leve y se tratan fácilmente.
- C) Las reacciones graves a las transfusiones de eritrocitos son muy frecuentes.
- D) La necesidad de una transfusión de glóbulos rojos generalmente es guiada por el nivel de hemoglobina.

**61.- Según el programa de detección precoz del cáncer de colon del Gobierno de Aragón, señale la respuesta correcta:**

- A) La población diana incluye a hombres y mujeres de 50 a 69 años, iniciándose por edades comprendidas entre los 60 y 69 años.
- B) La prueba de sangre oculta en heces se realiza cada tres años.
- C) Para la realización de la prueba de sangre oculta en heces hay que realizar una dieta pobre en residuos las 24 horas previas.
- D) Se puede realizar esta prueba si tiene la menstruación siempre y cuando realice un correcto lavado genital.

**62.- La presencia de pirosis durante el embarazo se asocia con todos los factores siguientes, EXCEPTO:**

- A) Aumento de concentración de progesterona.
- B) Cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono.
- C) Relajación del esfínter del cardias.
- D) Desplazamiento del estómago por aumento del tamaño del útero.

**63.- Es un concepto del modelo de Dorothea E. Orem:**

- A) Autocuidado.
- B) Conducta del paciente.
- C) Comunicación.
- D) Necesidad de ayuda.

**64.- ¿Cuál de las siguientes NO es una escala de valoración de lesiones por presión?:**

- A) Escala de Waterlow.
- B) Escala de Arnell.
- C) Escala Nova 5.
- D) Escala de Plutchick.

**65.- ¿Cuándo está indicado tratar a nivel ambulatorio la bulimia nerviosa?:**

- A) Si no hay riesgo de suicidio.
- B) Si hay complicaciones físicas graves.
- C) Si hay riesgo de autolesión.
- D) Si no hay riesgo de caídas.

**66.- Entre las contraindicaciones de la nutrición enteral NO se encuentra:**

- A) Obstrucción intestinal completa.
- B) Estenosis parciales de esófago.
- C) Íleo paralítico.
- D) Hemorragia gastrointestinal activa.

**67.- La menopausia artificial NO se relaciona con:**

- A) Sofocos.
- B) Pérdida de la libido.
- C) Aumento del flujo vaginal.
- D) Insomnio.

**68.- En la prevención del cáncer de cuello de útero causado por el virus del papiloma humano (VPH) es cierto que:**

- A) El uso del preservativo no reduce el riesgo de infección por el VPH.
- B) Las citologías periódicas constituyen el medio más eficaz para su detección.
- C) La vacuna del VPH elimina la infección si la mujer está infectada.
- D) La vacuna protege frente a todo tipo de virus VPH.

**69.- La fase que comprende todas las actuaciones que se producen desde el inicio de los síntomas de presentación del ictus, hasta el tratamiento de reperfusión o tratamiento conservador en el caso del ictus isquémico, o hasta el tratamiento específico que precise en el caso del ictus hemorrágico, se denomina:**

- A) Fase crónica.
- B) Fase aguda.
- C) Fase subaguda.
- D) Fase hiperaguda.

**70.- La guía para profesionales sanitarios del Ministerio de Sanidad, publicada en 2022, indica que “Los 5 momentos clave para la utilización segura de los medicamentos” son:**

- A) Una herramienta para la participación de los pacientes.
- B) Una herramienta exclusiva para facilitar la información a los pacientes en centros de salud y hospitales.
- C) Una herramienta que define los siguientes momentos: cuando se prescribe un medicamento, cuando se toma, al añadir otro medicamento, al revisar la medicación y antes de finalizar un tratamiento.
- D) Una herramienta que marca los momentos de forma fija y sucesiva, sin que se puedan dar alteraciones en el orden de las recomendaciones.

**71.- Para la elaboración de un programa de educación sanitaria, es necesario:**

- A) Establecer prioridades sin definir plazos.
- B) Que exista un equipo de responsables para el seguimiento del programa educativo.
- C) Que en la enseñanza de técnicas es suficiente con realizar una única demostración práctica.
- D) Que las actividades educativas se realicen siempre en grupo.

**72.- Ángel, paciente EPOC, tiene 80 años y una pérdida de visión importante. Últimamente, al irse a vivir a una residencia está sufriendo pérdidas de orina, ya que cuando siente ganas de orinar no le da tiempo de encontrar el inodoro y no es capaz de evitar la pérdida involuntaria de orina. ¿Qué diagnósticos enfermeros priorizaremos en la situación relatada?:**

- A) 00019 Incontinencia urinaria urgencia y 00155 Riesgo de caídas.
- B) 00018 Incontinencia urinaria involuntaria y 00092 Intolerancia a la actividad.
- C) 00176 Incontinencia urinaria por rebosamiento y 00222 Control de impulsos ineficaz.
- D) 00021 Incontinencia urinaria funcional y 00094 Riesgo de intolerancia a la actividad.

**73.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO se transmite por picadura de garrapatas?:**

- A) Enfermedad de Lyme.
- B) Fiebre recurrente por Borrelia Hispánica.
- C) Dengue.
- D) Fiebre maculosa de las montañas rocosas por Rickettsia Rickettsii.

**74.- ¿En qué posición se debería situar a una paciente para insertarle una sonda nasogástrica?:**

- A) En la que esté más cómoda.
- B) En decúbito supino.
- C) En posición de Fowler.
- D) En decúbito prono.

**75.- ¿Qué tipo de drenaje NO corresponde a un drenaje pasivo?:**

- A) Penrose.
- B) Sonda Foley.
- C) Hemovac.
- D) Gasa o venda orillada.

**76.- En el examen del pie en un paciente diabético se observa infección local que compromete a la piel, al tejido celular subcutáneo y a estructuras profundas presentando un eritema mayor de 4 cm sin ningún signo/síntoma de respuesta inflamatoria sistémica ni descontrol metabólico. La severidad de la infección según la clasificación IDSA (Infectious Disease Society of America) se establecería como:**

- A) Leve.
- B) Moderada.
- C) Severa.
- D) Grave.

**77.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades se puede prevenir con una vacuna de virus atenuados?:**

- A) Rubeola.
- B) Tosferina.
- C) Encefalitis japonesa.
- D) Hepatitis B.

**78.- Al administrar 1000 mg de Metamizol por una de las siguientes vías de administración, ¿en cuál de ellas NO se producirá la absorción del mismo?:**

- A) Intradérmica.
- B) Intravenosa.
- C) Subcutánea.
- D) Intramuscular.

**79.- En la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada durante el embarazo?:**

- A) Vacuna de tétanos.
- B) Vacuna de sarampión.
- C) Vacuna de tosferina.
- D) Vacuna de hepatitis B.

**80.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto al desbridamiento enzimático en una lesión por presión.**

- A) El desbridamiento enzimático no es una alternativa eficaz para la eliminación de material necrótico en lesión por presión de diferentes etiologías.
- B) Un método alternativo al desbridamiento enzimático es el desbridamiento quirúrgico.
- C) Está basado en la aplicación local de enzimas proteolíticas exógenas.
- D) Cuando se utiliza el desbridamiento enzimático es recomendable proteger la piel perilesional con un producto barrera.

**81.- ¿Cuál de los siguientes antisépticos es activo frente a bacterias (Gram + y Gram -)?:**

- A) Hexetidina.
- B) Povidona yodada.
- C) Alcohol etílico de 90°.
- D) Eosina.

**82.- Según la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del dolor, ¿desde qué escalón se recomienda iniciar la pauta de fármacos opiáceos?:**

- A) Primero.
- B) Tercero.
- C) Segundo.
- D) Cuarto.

**83.- Según el Manual de buenas prácticas en eutanasia, publicado por el Ministerio de Sanidad; seleccione la respuesta correcta:**

- A) En la autoadministración vía oral, el procedimiento y medicamentos recomendados como premedicación, los antieméticos son el primer paso preparatorio.
- B) En la autoadministración vía oral, el procedimiento y medicamentos recomendados como premedicación, los ansiolíticos son el primer paso preparatorio.
- C) En la autoadministración vía oral, el procedimiento y medicamentos recomendados como premedicación, los inductores al coma son el primer paso preparatorio.
- D) El paciente debe consumir todo el medicamento en 10 minutos. Se debe recomendar el uso de pajita.

**84.- Indique la respuesta correcta sobre las compresiones de calidad en el adulto, según el Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar (ERC).**

- A) Frecuencia: 100 – 120 compresiones por minuto.
- B) Profundidad: 7 – 9 cm.
- C) Cambiar de reanimador cada 4 minutos.
- D) Respiraciones de rescate <8 sg.

**85.- ¿Cuál de las siguientes Intervenciones (NIC) se recomienda priorizar en el diagnóstico Disfunción Sexual (0005)?:**

- A) Facilitar la autorresponsabilidad.
- B) Asesoramiento Sexual.
- C) Nivel de ansiedad.
- D) Identificación de riesgos.

**86.- Si un test para detectar el deterioro cognitivo mide adecuadamente el mismo, pero sus resultados dependen de las condiciones de administración y del personal que realiza dicho test, se dice que éste es:**

- A) Válido y fiable.
- B) Poco válido y fiable.
- C) Válido pero poco fiable.
- D) Muy fiable pero poco válido.

**87.- Según las dimensiones de la calidad propuestas por A. Donabedian el indicador "Porcentaje de profesionales cualificados para la prestación del servicio", correspondería a:**

- A) Estructura.
- B) Proceso.
- C) Resultado.
- D) Planificación.

**88.- Según el Modelo Transteórico del Cambio (Prochaska y DiClemente), la etapa en la cual las personas no tienen intención de cambiar, de realizar una acción específica de cambio de sus comportamientos de riesgo para la salud, usualmente en el lapso de los siguientes seis meses, se denomina:**

- A) Contemplación.
- B) Acción.
- C) Precontemplación.
- D) Preparación.

**89.- Entre los problemas relacionados con la medicación se encuentran las interacciones farmacocinéticas que son aquellas que:**

- A) Tienen lugar fuera del paciente, en el proceso de preparación y administración del medicamento; habitualmente se deben a reacciones físico-químicas.
- B) Se producen en los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción.
- C) Se producen a nivel del receptor y varían la respuesta del fármaco. La acción del segundo fármaco se modifica en presencia del primero sin alterar su concentración plasmática o tisular.
- D) Ninguna de las anteriores.

**90.- El daño localizado en epidermis o dermis de un neonato, como resultado de presión o presión combinada con rozamiento, corresponde al diagnóstico enfermero NANDA:**

- A) Control del riesgo: herida por presión (úlcera por presión) (1942).
- B) Lesión por presión neonatal (00287).
- C) Hiperbilirrubinemia neonatal (00194).
- D) Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101).

**91.- La codificación del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de un hospital, debe realizarse:**

- A) Con un protocolo "ad hoc".
- B) Exclusivamente con el informe de alta.
- C) Con la historia clínica completa, que se utiliza sistemáticamente.
- D) Pueden usarse indistintamente cualquiera de estos documentos para la codificación clínica.

**92.- La Guía clínica sobre reanimación neonatal de la American Heart Association (AHA, 2020), incluye entre sus recomendaciones:**

- A) El pinzamiento del cordón umbilical no debe retrasarse más de 30 segundos en recién nacidos a término y pretérmino tras un nacimiento no complicado.
- B) La vena basilíca es la vía recomendada para el acceso vascular en lactantes que no han respondido a la respiración con presión positiva y a las compresiones torácicas y que requieren epinefrina, expansores de volumen, o ambos.
- C) Para la administración de epinefrina, utilizar preferentemente la vía intramuscular.
- D) No realizar aspiración oral, nasal, orofaríngea o endotraqueal sistemática para los recién nacidos, incluso los que nacen con líquido amniótico meconial.

**93.- Al realizar un drenaje de secreciones mediante la técnica de percusión o clapping, es cierto que:**

- A) Generalmente se sitúa el pulmón a tratar en supra lateral sin embargo sería idóneo colocarlo infralateral.
- B) Preferentemente se inicia cuando el paciente está en inspiración.
- C) Puede ser efectiva sobre el esternón.
- D) La presencia y situación de las secreciones se detecta por palpación.

**94.- ¿A quién o a quienes se puede aplicar el Proceso de Atención Enfermero?:**

- A) Solamente al individuo y comunidad.
- B) Solamente al individuo y a la familia.
- C) Solamente a la comunidad.
- D) Al individuo, a la familia y a la comunidad.

**95.- NO es una función de la entrevista clínica:**

- A) Establecer una relación asistencial.
- B) Llegar a una percepción clara de los problemas del paciente.
- C) Prescribir o recomendar una pauta de conducta.
- D) Favorecer las relaciones interpersonales.

**96.- Señale la respuesta correcta respecto al Índice de privación:**

- A) Son indicadores sencillos que engloban diferentes determinantes de la salud.
- B) Presenta un patrón geográfico claro.
- C) No se corresponde con el nivel socioeconómico.
- D) Es una herramienta estadística compleja que permite cuantificar las desigualdades integrando información de varios determinantes sociales de salud.

**97.- El efecto preventivo del suicidio en el espectador cuando se exponen ejemplos de personas que inicialmente han pretendido quitarse la vida, pero finalmente no han consumado el suicidio superando el momento y las dificultades, se denomina:**

- A) Efecto Werther.
- B) Efecto Stendhal.
- C) Efecto Estocolmo.
- D) Efecto Papageno.

**98.- Indique de qué modelo de aprendizaje en educación y promoción de la salud, son característicos los factores predisponentes, facilitadores y reforzantes:**

- A) Modelo de Gagné.
- B) Modelo de etapas del cambio.
- C) Modelo PRECEDE-PROCEDE.
- D) Modelo de etapas.

**99.- Entre las precauciones para el cuidado del brazo del lado afecto postmastectomia se indican a los pacientes las siguientes EXCEPTO:**

- A) Evitar todo lo posible las punciones en la vena (análisis de sangre).
- B) Evitar la presión sobre el brazo (mediciones de la presión arterial).
- C) Utilizar dedal para coser.
- D) Depilarse las axilas con cuchillas.

**100.- La Taxonomía NANDA-I se estructura de forma multiaxial sobre 7 ejes, de los cuales el concepto diagnóstico como descripción de la "respuesta humana", corresponde al:**

- A) Eje 7.
- B) Eje 5.
- C) Eje 3.
- D) Eje 1.

**101.- Según el calendario de vacunación de la Comunidad Autónoma de Aragón ¿a qué edad se debe vacunar a los niños de la triple vírica?:**

- A) 2 meses y 12 meses.
- B) 12 meses y 3 años.
- C) 12 meses y 6 años.
- D) 4 meses y 3 años.

**102.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades se encuentra dentro de las enfermedades de declaración urgente?:**

- A) Peste.
- B) Parotiditis.
- C) Tétanos.
- D) Brucelosis.

**103.- En las siguientes complicaciones debidas a la canalización de una vía y su mantenimiento, la actuación enfermera que NO se recomienda es:**

- A) Ante una infección relacionada con un catéter central de inserción periférica, retirar el catéter haya o no afectación sistémica por la infección.
- B) En caso de obstrucción de un catéter central, retirar la vía y no tratar de desobstruirla.
- C) En caso de extravasación, disponer y actuar según protocolos basados en estándares de buenas prácticas.
- D) Ante una trombosis de la vía con un catéter central de inserción periférica, no retirar la vía.

**104.- El indicador 012023: Reflejo de hociqueo, se valora en el NOC:**

- A) 0100 Desarrollo infantil: 2 meses.
- B) 0101 Desarrollo infantil: 4 meses.
- C) 0102 Desarrollo infantil: 6 meses.
- D) 0120 Desarrollo infantil: 1 mes.

**105.- Es una infracción muy grave según el RD 1723/2012 de 28 de diciembre, que regula las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante:**

- A) El incumplimiento de disponer de personal cualificado, instalaciones y equipos apropiados.
- B) El incumplimiento de los requisitos de trazabilidad.
- C) El incumplimiento de los requisitos de etiquetado y transporte de órganos.
- D) La publicidad sobre la necesidad de órganos en beneficio de personas concretas.

**106.- El control de la termorregulación en un paciente donante de órganos NO se hará mediante:**

- A) Calentamiento activo de gases inspirados a unos 40-46°C.
- B) Utilización de focos térmicos.
- C) Administración de fármacos.
- D) Utilización de mantas térmicas.

**107.- Las recomendaciones del Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad incluyen:**

- A) Recomendar terapia de familia o mediación familiar.
- B) Creer el relato de la mujer.
- C) Adoptar una actitud paternalista.
- D) Criticar la actitud o ausencia de respuesta de la mujer.

**108.- De todas las etapas del Proceso de Atención Enfermero, ¿con cuál guarda una relación más estrecha la etapa de evaluación?:**

- A) Ejecución.
- B) Planificación.
- C) Diagnóstico.
- D) Valoración.

**109.- En relación con la valoración funcional de una persona anciana, NO está indicado uno de los siguientes instrumentos de medida:**

- A) Test de Pfeiffer.
- B) Escala de Lawton y Brody.
- C) Índice de Barthel.
- D) Índice de Katz.

**110.- ¿Qué modalidad de entrevista clínica se utiliza para promover cambios de conducta?:**

- A) Entrevista semiológica.
- B) Entrevista motivacional.
- C) Entrevista informativo-deliberativa.
- D) Entrevista de integración

