



PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 1 de diciembre de 2022 (B.O.A. número 245, de 21 de diciembre de 2022)

CATEGORÍA:

ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO (MATRÓN/A)

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **2:00 HORAS**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS

SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluye las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario. De conformidad con el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, indique cuál de las siguientes prestaciones NO forma parte de la cartera común suplementaria:

- A) Transporte sanitario urgente.
- B) Prestación ortoprotésica.
- C) Productos dietéticos.
- D) Prestación farmacéutica.

2.- El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de:

- A) 12 años.
- B) 14 años.
- C) 16 años.
- D) Ninguna respuesta es correcta.

3.- Según el artículo 42 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios serán:

- A) Iguales en todos los servicios de salud.
- B) Diferentes en cada servicio de salud.
- C) Diferentes a las correspondientes a los funcionarios públicos.
- D) Iguales en todos los servicios de salud y diferentes a las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos.

4.- Según el artículo 6 de la ley 55/2003, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, señale la respuesta INCORRECTA, el personal sanitario de titulación universitaria se divide en:

- A) Licenciados universitarios o personal con título equivalente.
- B) Diplomados sanitarios.
- C) Licenciados con título de especialista en Ciencias de la Salud.
- D) Diplomados con título de especialista en Ciencias de la Salud.

5.- Señale cuál de los siguientes derechos de los usuarios y pacientes NO es garantizado en la asistencia sanitaria privada según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón:

- A) Acceso universal garantizado y libre elección de profesional sanitario titulado, servicio y centro.
- B) Obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud.
- C) Atención sanitaria adecuada a las necesidades individuales y colectivas.
- D) Derecho a la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva.

6.- Según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón, indique cuál de las siguientes NO se considera una institución de la Comunidad Autónoma de Aragón:

- A) El Presidente.
- B) El Defensor del Pueblo.
- C) El Gobierno de Aragón.
- D) El Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

7.- Según el Decreto 174/2010, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón, señale cuál de las siguientes líneas asistenciales comprende la atención urgente:

- A) Atención Primaria.
- B) Atención sociosanitaria.
- C) Atención Especializada.
- D) Atención a la salud mental.

8.- Según el artículo 8 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el consentimiento informado:

- A) El consentimiento será verbal por regla general.
- B) El consentimiento será por escrito por regla general.
- C) El consentimiento siempre será verbal.
- D) El consentimiento siempre será por escrito.

9.- Según el artículo 3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, indique cuál NO es un principio general de la actuación de los poderes públicos aragoneses:

- A) La transversalización del enfoque de género en el diseño, implantación y evaluación de todas las políticas públicas.
- B) La limitación de los derechos sexuales y reproductivos.
- C) La protección de la maternidad, con independencia del modelo de familia.
- D) La participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de decisión públicos y privados.

10.- ¿Cuál de los siguientes ríos NO discurre por Aragón?

- A) Turia.
- B) Garona.
- C) Cinca.
- D) Huerva.

11.- Según la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, indique en cuál de las siguientes actividades los profesionales sanitarios NO tendrán la consideración de autoridad pública:

- A) Actividades quirúrgicas realizadas en el interior de los centros sanitarios.
- B) Actividades quirúrgicas que, como consecuencia del ejercicio de las funciones propias, se realicen de manera concertada en empresas privadas.
- C) Actividades realizadas en el interior de los centros sociales.
- D) Actividades que, como consecuencia del ejercicio de las funciones propias, se realicen fuera de los centros sanitarios.

12.- Según el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:

- A) Siempre hay que señalar expresamente a un representante.
- B) Siempre hay que señalar expresamente a un solicitante.
- C) Únicamente con el solicitante que figure en primer término.
- D) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

13.- Según el artículo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, las profesiones sanitarias, tituladas y reguladas:

- A) Están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos.
- B) Su formación pregraduada se dirige de forma general a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud.
- C) No están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos.
- D) Su formación especializada se dirige de forma general a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud.

14.- El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce:

- A) Que los poderes públicos promoverán la investigación científica y técnica.
- B) El acceso a la cultura a la que todos tienen derecho.
- C) El derecho a la protección de la salud.
- D) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

15.- Según el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta INCORRECTA, los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:

- A) Objetividad.
- B) Parcialidad.
- C) Transparencia.
- D) Confidencialidad.

16.- En virtud del artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, señale cuál de los siguientes es un principio general de la acción preventiva:

- A) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
- B) Adoptar las medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- C) Adaptar la persona al trabajo.
- D) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

17.- Según Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). Cuál de las siguientes materias descritas en el apartado 6.2, Rotaciones internas durante el periodo de la práctica clínica, NO se contempla en el programa formativo:

- A) Fisiopatología fetal.
- B) Planificación familiar y contracepción.
- C) Formación en protección radiológica.
- D) Asertividad en la comunicación e información sanitaria.

18.- Según la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su Artículo 7 bis. Atención a la salud reproductiva. Los servicios públicos de salud garantizarán:

- A) La regulación de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer embarazada desde el día primero de la semana 39 de gestación.
- B) La regulación de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer embarazada desde el último día de la semana 39 de gestación.
- C) La regulación de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer embarazada desde el día primero de la semana 40 de gestación coincidiendo con la fecha probable de parto.
- D) La regulación de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer embarazada desde el día primero de la semana 41 de gestación coincidiendo con un embarazo cronológicamente prolongado.

19.- Señale cuál de los siguientes NO corresponde a un eje de acción de la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS:

- A) Empresas saludables, conciliación de la vida familiar y laboral.
- B) Poblaciones priorizadas: < de 15 y >50 en primera fase.
- C) Entornos promotores: comunitario, educativo y sanitario.
- D) Factores: estilos de vida, bienestar emocional y seguridad del entorno.

20.- Señala la contraindicación para un parto instrumentado:

- A) Presentación de cara.
- B) Presentaciones que alcanzan el tercer plano.
- C) Miopía magna materna.
- D) Riesgo de pérdida de bienestar fetal.

21.- Indique cuál es el anglicismo que hace referencia a “intimidades sexuales próximas al coito pero sin llegar a él, pudiendo incluir el orgasmo”.

- A) Stroking.
- B) Petting.
- C) Whispering.
- D) Tickling.

22.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es un factor de riesgo de la Hemorragia Posparto Precoz (HPP)?

- A) Útero contraído.
- B) Primiparidad.
- C) Polihidramnios.
- D) Ausencia de cirugía uterina previa.

23.- Bintou, acude a la consulta de la matrona para la revisión de adherencia al método contraceptivo que le recomendó hace tres meses en la visita de la cuarentena. En la consulta, la paciente le informa de que está muy contenta porque en un mes, viajará junto a su marido y su hija a su país de origen, Mali. ¿Cuál de las siguientes actuaciones, ante el inminente viaje, deberían contemplarse desde el medio sanitario?

- A) Informar a la Embajada Española en Mali del viaje del menor.
- B) Informar y citar con el pediatra del centro para firmar el compromiso de prevención de la mutilación genital femenina.
- C) Entregar a la familia las vacunas correspondientes por calendario de los cuatro meses según la Comunidad de Aragón para que se le administren en el centro de referencia de su ciudad.
- D) Al tratarse de un viaje familiar e informar Bintou del mismo, no es necesario realizar ninguna actuación sanitaria.

24.- En relación a la reanimación cardiopulmonar avanzada en la gestante, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) Se recomienda una relación compresión/ventilación 30/2.
- B) En el medio hospitalario, tras 10 min. De RCP avanzada sin éxito, se realizarán maniobras de cesárea perimortem.
- C) En ausencia de respiración a pesar de una vía aérea libre, se deben comenzar inmediatamente las compresiones torácicas.
- D) Deben canalizarse dos vías periféricas lo antes posible.

25.- Modalidad de parto de vértice que se caracteriza por una hiperflexión forzada de la cabeza fetal desde antes del encajamiento, no produciéndose dicha flexión simultáneamente al descenso de la presentación y se relaciona con pelvis estrechas:

- A) Naegele.
- B) Roederer.
- C) Michaelis.
- D) Boudeloque.

26.- De las siguientes afirmaciones sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) indique la INCORRECTA:

- A) Es la principal causa de anovulación y pudiera ser también la principal causa de infertilidad.
- B) El exceso de andrógenos se manifiesta clínicamente por hirsutismo, acné y/o alopecia.
- C) El sobrepeso es muy común en las mujeres con SOP, casi la mitad de las pacientes cumplen criterios para obesidad.
- D) Las formas más comúnmente observadas de disfunción menstrual en el SOP son la metrorragia y la dismenorrea.

27.- Sobre el Informe del Sistema de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente (SINASP), señale la correcta:

- A) Es una plataforma que solo funciona en Aragón.
- B) Se trata de una plataforma impulsada por el Ministerio de Sanidad.
- C) Es de obligatorio cumplimiento cuando se tiene un incidente con el paciente.
- D) Si el incidente no produce daño en el paciente no se debe notificar nada ya que no ha ocurrido nada grave.

28.- Julia, primigesta de bajo riesgo, ha iniciado trabajo de parto, en la exploración que se acaba de realizar se objetiva la sutura sagital más cerca del promontorio y penetra, por tanto, primero en la pelvis el parietal anterior. Con la información obtenida a través de la exploración, cuál de las siguientes opciones es la cierta:

- A) El descenso de la presentación es de forma sinclítica, con entrada en la pelvis materna el parietal anterior.
- B) El descenso de la presentación es de forma asinclítica, con entrada en la pelvis materna el parietal anterior, siendo un asinclitismo de Litzman.
- C) El descenso de la presentación es de forma asinclítica, con entrada en la pelvis materna el parietal anterior, siendo un asinclitismo de Naegele.
- D) El descenso de la presentación es de forma asinclítica, con entrada en la pelvis materna el parietal anterior, siendo un asinclitismo de Friedman.

29.- ¿Cuál de las siguientes recomendaciones básicas de actuación en una distocia de hombros es INCORRECTA?

- A) Es fundamental el diagnóstico rápido. Pedir ayuda y evitar el nerviosismo.
- B) Vaciar la vejiga.
- C) Indicar pujo materno controlado y realizar tracción sobre la cabeza fetal.
- D) Valorar la necesidad de episiotomía; no es obligatoria.

30.- Al evaluar las primeras tomas de lactancia tras un parto instrumentalizado se observa en el neonato: cianosis circumoral, aleteo nasal, y desaturación de oxígeno, ¿Cuál sería una etiqueta diagnóstica adecuada?

- A) Insuficiente producción de leche materna.
- B) Riesgo de deterioro de intercambio de gases.
- C) Respuesta ineficaz succión-deglución del lactante.
- D) Disposición para mejorar la lactancia materna.

31.- Según el Programa de Atención a la Endometriosis en Aragón ¿cuál de las actuaciones a realizar a nivel de atención primaria (médicos y matronas) es INCORRECTA?

- A) Establecer la sospecha clínica valorando, mediante anamnesis, a las mujeres que acudan al centro de salud con algún síntoma compatible con endometriosis.
- B) Realizar el seguimiento de la mujer con diagnóstico de endometriosis leve o asintomática, en coordinación con el servicio de ginecología de su sector sanitario.
- C) Realizar exploración pelviana: especuloscopia y tacto vaginal.
- D) Atender los aspectos psíquicos-sociales, frecuentemente asociados en enfermedades crónicas, como puede ser la endometriosis.

32.- Un estado, conducta o percepción de una persona, familia o comunidad medido a lo largo de un continuo, en respuesta a una intervención enfermera es:

- A) Una escala.
- B) Un resultado.
- C) Un logro.
- D) Una acción.

33.- Respecto al contacto piel con piel del recién nacido con la madre es cierto que:

- A) No es preciso dejar visible la cara, la nariz o la boca del recién nacido.
- B) El contacto piel con piel siempre es suficiente para la termorregulación del recién nacido.
- C) Favorece la colonización del recién nacido por los gérmenes maternos.
- D) Aumenta el dolor por ingurgitación mamaria.

34.- En la asistencia prenatal, la sobrecarga oral de glucosa de 50 gr. ¿qué tipo de prevención es?

- A) Primaria.
- B) Secundaria.
- C) Terciaria.
- D) Ninguna de ellas.

35.- Según la Guía NICE (National Institute for Health and Care Excellence), respecto a la interpretación de los Registros Cardiotocográficos (RCTG), recomiendan categorizar las deceleraciones de la siguiente manera:

- A) Verde: No deceleraciones o deceleraciones tardías o deceleraciones variables.
- B) Blanco: No aceleraciones o deceleraciones variables repetitivas.
- C) Ámbar: Deceleraciones variables repetitivas con alguna característica preocupantes durante menos de 30 minutos.
- D) Rojo: Deceleraciones variables repetitivas sin factores preocupantes durante más de 30 minutos.

36.- Acude una paciente a la consulta de la matrona para comenzar el uso de un implante de etonogestrel 68mg (Implanon NXT), tras la realización de la historia clínica se sabe que estaba usando preservativo ¿qué día sería el más adecuado para la inserción?

- A) Pasados 7 días de la menstruación y ya no es necesario usar preservativo.
- B) En cualquier momento y sin prueba de embarazo, la mujer ha usado bien el preservativo y yo la creo.
- C) Me dice que justo anteayer se le fue la regla, por tanto, se lo pongo y ya no tiene que usar método de barrera complementario.
- D) En el día dos del ciclo con la menstruación y ya no tiene que usar otro método complementario.

37.- Jennifer, embarazada de 30 semanas, está comiendo en un restaurante, ¿cuál sería el plato, de entre los propuestos, más aconsejable?

- A) Bistec poco hecho.
- B) Tabla de quesos.
- C) Pollo asado.
- D) Salmón ahumado.

38.- El Programa Concordia, un programa cooperativo interterritorial para la donación de sangre de cordón umbilical (SCU), cuenta en Aragón con 3 maternidades adheridas donde se puede realizar la donación. Cuál de las siguientes NO es una de ellas:

- A) Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
- B) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.
- C) Hospital Quirón de Zaragoza.
- D) Hospital Universitario San Jorge de Huesca.

39.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones estarían indicadas realizar al bebé de una mujer diabética pregestacional insulino dependiente por parte de la matrona en el puerperio inmediato?

- A) Separación puntual del piel con piel para realizar pesaje neonatal.
- B) Control de la glucemia neonatal a la hora del nacimiento.
- C) Realizar otoemisiones acústicas en sala de partos por mayor riesgo de malformación.
- D) Contactar con el servicio de neonatología y limitar el contacto piel con piel.

40.- Ante un ratio sFit-1/PIGF con un valor de 90 en mujeres con signos y síntomas de preeclampsia, señale la conducta obstétrica correcta:

- A) Tranquilizar a la paciente no se necesitan más determinaciones.
- B) Valorar el ingreso y vigilancia estrecha.
- C) Visita de seguimiento y repetir la prueba en 1-2 semanas.
- D) Si el embarazo es menos de 34 semanas maduración fetal.

41.- Patricia tiene 16 años, se ha hecho un test de embarazo y es positivo. Acuden a la consulta de la matrona. Según la fecha de la última regla, la matrona calcula que Patricia está embarazada de 8 semanas y 3 días. Según la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿Patricia necesita el consentimiento expreso de algún representante legal para poder interrumpir el embarazo?

- A) Si, es menor de edad por lo que es necesario que su representante legal autorice la interrupción voluntaria del embarazo.
- B) Si, al ser Patricia menor de 18 años, necesitará el consentimiento expreso de al menos uno de sus progenitores sin ser necesario el consentimiento de los representantes legales de su pareja.
- C) No, las mujeres pueden interrumpir su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales.
- D) La ley no especifica la edad de la mujer sino las semanas de embarazo, que debe de ser inferior a 14 semanas de gestación.

42.- Señale la respuesta INCORRECTA. El pensamiento crítico (razonamiento clínico y juicio clínico) en enfermería:

- A) Se basa en los principios del proceso enfermero, la resolución de problemas y el método científico.
- B) Aplica la lógica, la intuición y la creatividad y se ampara en conocimientos, habilidades y experiencia concretos.
- C) Está guiado por normas, políticas, códigos de ética y leyes.
- D) Organiza el conocimiento como hechos separados, se basa principalmente en los recursos (textos, protocolos...) y se centra en los procedimientos y no en la respuesta del paciente.

43.- ¿Cuál de los siguientes componentes de la leche humana NO es un agente antiinfeccioso?

- A) Lisozima.
- B) Peroxidasa.
- C) Amilasa.
- D) Lipasa.

44.- Desde la pandemia Covid19, el gasto sanitario de Aragón modificó ligeramente su financiación. En la actualidad:

- A) Continúa siendo con fondos propios de la Comunidad Autónoma únicamente.
- B) La financiación se realiza por fondos propios y de la Administración Central.
- C) Con la financiación autonómica en sanidad colabora la Administración Central y la Unión Europea.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

45.- ¿Cuál de estos músculos del periné NO se sitúa en el plano superficial?

- A) Esfínter estriado del ano.
- B) Bulbo-cavernoso.
- C) Isquio-coccígeo.
- D) Isquio-cavernoso.

46.- Idealmente ¿cuándo se debe realizar la primera consulta médica cuando la mujer conoce que está embarazada?

- A) Lo antes posible para realizar la primera ecografía tan pronto como se conozca la gestación.
- B) Entre la semana 12 y 14 de embarazo.
- C) Tan pronto como se sospeche el embarazo.
- D) Cuando la mujer comience a notar cambios en su cuerpo, no antes.

47.- Para una buena salud ósea en la menopausia, las recomendaciones diarias de calcio ingerido con la dieta son:

- A) Superior a 2000 mg / día.
- B) 1000-1200 mg/ día.
- C) 300-500 mg/ día.
- D) 600-900mg/ día.

48.- Según la Matroguía del Puerperio publicado por Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) ¿con qué frecuencia es aconsejable realizar las visitas puerperales con la matrona de Atención Primaria durante los primeros días posparto?

- A) Sería beneficioso realizar la primera a las 48-72 horas tras el alta, y mínimo otra a las 6-8 semanas.
- B) Sería beneficioso realizar la primera en la segunda semana tras el alta, y mínimo otra a las 6-8 semanas.
- C) Sería beneficioso realizar la primera antes de las 48 horas tras el alta, y mínimo otra después de las 12 semanas.
- D) Sería contraproducente realizar la primera a las 48-72 horas tras el alta, y mínimo otra antes de las 6 semanas que es cuando se cumple la "cuarentena".

49.- En la enfermería basada en la evidencia, en la etapa donde se valora la calidad de los artículos seleccionados, es decir, si responde a la pregunta estructurada, si le es útil, si cumple desde el punto de vista del rigor metodológico y si los artículos cuentan con la validez interna y externa deseada se denomina:

- A) Búsqueda en la literatura médica.
- B) Formulación de una pregunta clínica.
- C) Análisis crítico de la evidencia.
- D) Aplicación de los resultados.

50.- En el contexto de sala de partos, cuando un recién nacido pretérmino, término o postérmino precise compresiones torácicas como soporte tras el nacimiento, la secuencia de coordinación con las ventilaciones será de:

- A) 3:1 (90 ventilaciones, 30 compresiones por minuto).
- B) 3:1 (90 compresiones, 30 ventilaciones por minuto).
- C) 15:2 (120 compresiones, 16 ventilaciones por minuto).
- D) 15:2 (120 ventilaciones, 16 compresiones por minuto).

51.- Según la Matroguía del Puerperio de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) publicada recientemente, es INCORRECTO que:

- A) El puerperio es una etapa de transición, de duración variable, aproximadamente de 6 a 8 semanas.
- B) El puerperio inmediato corresponde a las primeras 2 horas tras el alumbramiento.
- C) El puerperio clínico es el que transcurre desde el nacimiento hasta el alta hospitalaria.
- D) El puerperio tardío finaliza coincidiendo con la primera menstruación.

52.- En la infección por el papilomavirus humano (VPH) es INCORRECTO:

- A) Los VPH de bajo riesgo se encuentran habitualmente en los condilomas y en las lesiones escamosas de bajo grado. Las variedades más representativas de este grupo son los tipos 6 y 11.
- B) Los VPH de alto grado se asocian frecuentemente con lesiones escamosas de alto riesgo. Los tipos más representativos son los 16 y 18.
- C) El tipo 16 se encuentra, habitualmente en los adenocarcinomas de cuello uterino, mientras que el 18 se asocia, con más frecuencia, con los carcinomas escamosos.
- D) Se ha demostrado que en un porcentaje elevado de casos que se aproxima al 100% se encuentra el HPV en tumores invasores del cuello uterino y en las lesiones premalignas del mismo.

53.-Cuál de los siguientes fármacos, NO se considera seguro como tratamiento de la hipertensión arterial en el puerperio en aquellas mujeres que deseen alimentar a sus hijos con lactancia materna por su posible efecto adverso en el riñón del lactante, especialmente en los casos de prematuridad por debajo de 32 semanas de gestación:

- A) Labetalol.
- B) Nifedipino.
- C) Hidrocloruro de hidralacina.
- D) Enalapril.

54.- Según la Oncoguía cáncer de endometrio publicada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en 2023, ¿qué mujeres cumplen los criterios para la preservación de la fertilidad si presentan cáncer endometrial?

- A) Ausencia de infiltración miometrial.
- B) Hiperplasia típica.
- C) Imposibilidad de seguimiento estrecho.
- D) Mujer con histerectomía previa.

55.- El modelo del Plato saludable de la Universidad de Harvard está formado por tres grandes grupos de alimentos:

- A) 50% proteínas; 25% frutas; 25% grasas.
- B) 50% lácteos; 15% cereales; 35% frutas.
- C) 50% grasas; 25% frutas; 25% proteína.
- D) 50% verduras y frutas; 25% farináceas; 25% proteínas.

56.- El parto puede suponer una situación de estrés para la mujer que conlleve a un trastorno de estrés postraumático. La matrona de Atención Primaria tendrá en cuenta los siguientes aspectos, señale la INCORRECTA:

- A) Reconocer los patrones normales de cambios emocionales (que se resuelven de manera espontánea en 10-14 días, cuando desaparece la tristeza o blues puerperal).
- B) Prestar atención a síntomas de depresión postparto. Se sugiere no continuar con el diagnóstico de depresión postparto si la mujer contesta negativamente a todas las preguntas de la EPDS (Escala de Depresión Postparto de Edimburgo).
- C) Conocer el apoyo familiar y social que tiene y reconocer las posibles disfunciones emocionales de la pareja y/o familia.
- D) Vigilar si tras las 6 semanas del puerperio, persiste la sintomatología como llanto recurrente, sentimientos ambiguos, ansiedad o estado de ánimo bajo, la mujer debe ser valorada para descartar depresión posnatal o un posible trastorno de estrés postraumático.

57.- ¿Qué significado tiene en obstetricia la Curvatura de Carus?

- A) Es la línea que forma el canal óseo y blando del parto.
- B) Es la suma de todos los diámetros de la pelvis menor.
- C) Es una línea que forma el canal blando del parto.
- D) Es el eje que pasa por el borde inferior de la sínfisis de pubis hasta la punta del cóccix.

58.- Con respecto a una distribución normal o de Gauss, es cierto que:

- A) Percentil 25: media + 0'67 desviación estándar.
- B) Percentil 75: media + 0'67 desviación estándar.
- C) Percentil 97'5: media - 2 desviaciones estándar.
- D) Percentil 50: media + 1 desviación estándar.

59.- Según el Programa de Cribado de Cáncer de Mama del Gobierno de Aragón, ¿con qué frecuencia hay que realizar una mamografía?

- A) Entre los 50 y 69 años, cada dos años.
- B) Entre los 45 y 69 años, cada dos años.
- C) Entre los 50 y 69 años, cada año.
- D) Entre los 50 y 70 años, cada dos años.

60.- Según Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). La duración del programa de formativo es de:

- A) 40 semanas.
- B) 364 días.
- C) 2 años.
- D) 1 año, 6 meses y 12 semanas.

61.- Se define como muerte materna:

- A) La defunción de una mujer durante el embarazo o en el transcurso de 42 días desde el final del embarazo.
- B) La defunción de una mujer durante el embarazo o transcurridos 50 días desde el final del embarazo.
- C) La defunción de una mujer durante el tratamiento para la infertilidad.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

62.- María llega a paritorio en período de expulsivo, líquido amniótico meconial fluido y registro cardiotocográfico normal. Su fórmula obstétrica es G2P1, pero ella está muy preocupada porque en su parto anterior no le hicieron episiotomía y tuvo un desgarro perineal de IV grado:

- A) Lo más adecuado es previa infiltración anestésica, en el acmé de la contracción hacer una episiotomía medio-lateral o de Michaelis. Puede ser izquierda o derecha.
- B) Hay evidencia clara que recomienda el uso de la episiotomía tras partos con desgarros de tercer o cuarto grado.
- C) Lo más recomendable es una episiotomía central o de Tarnier ya que es poco sangrante y cicatrizará mejor.
- D) Las respuestas A, B y C son incorrectas.

63.- ¿Cuál de los siguientes estudios se emplea fundamentalmente en la investigación cualitativa?

- A) Ensayo clínico aleatorio.
- B) Estudio de cohortes.
- C) Estudio casos-control.
- D) Estudio exploratorio.

64.- ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de la fase proliferativa del ciclo endometrial?

- A) Bajo la influencia de los estrógenos, las células del estroma y epiteliales proliferan rápidamente.
- B) Abarca desde el día 14 hasta el día 28 en el que vuelve a aparecer la menstruación.
- C) Se produce un crecimiento progresivo de las glándulas endometriales y de nuevos vasos sanguíneos en el interior del endometrio.
- D) La superficie endometrial se reepiteliza completamente de 4 a 7 días tras la menstruación.

65.- Según la clasificación de la pelvis de Caldwell y Moloy, ¿cuál de las siguientes características se corresponde con la tipología de la pelvis ginecoide?

- A) La arcada pubiana está muy abierta.
- B) Espinas ciáticas poco prominentes y arcada pubiana de 90°.
- C) Es la menos favorable para la evolución del parto.
- D) El estrecho superior tiene forma elíptica.

66.- Según la Guía de práctica clínica de técnicas invasivas en diagnóstico prenatal 2022 de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones tras la realización de la técnica invasiva de diagnóstico prenatal amniocentesis es INCORRECTA?

- A) Acudir a Urgencias si: fiebre (> 38 °C), sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico por vagina, dolor abdominal moderado/intenso tipo cólico.
- B) Si la madre es RhD negativa se debe administrar 1.500 UI de gammaglobulina anti-D en dosis única, idealmente de manera inmediata tras el procedimiento, o en su defecto, necesariamente antes de las 24 horas postpunción.
- C) No existe evidencia de que el reposo disminuya las complicaciones de la prueba. Por precaución recomendamos evitar la actividad física intensa durante las 24 horas posteriores.
- D) Se recomienda consulta de asesoramiento genético cualificado en caso de resultado anormal de los estudios genéticos.

67.- ¿Qué producto NO tiene un riesgo alto para la lactancia materna?

- A) Manzanilla.
- B) Poleo menta.
- C) Metamizol.
- D) Ayahuasca.

68.- El Código Deontológico de la Confederación Internacional de Matronas se estructura en cuatro puntos. Indique cuál de los siguientes NO pertenece al mismo:

- A) Ámbito de aplicación.
- B) Práctica de la obstetricia.
- C) Responsabilidades profesionales de las matronas.
- D) Fomento de los conocimientos y la práctica de la obstetricia.

69.- En referencia, a la finalización de la gestación tras una pérdida gestacional, de las siguientes recomendaciones cuál es INCORRECTA:

- A) La vía vaginal debe ser de elección tanto si la presentación es podálica como cefálica.
- B) Tras la evaluación de riesgos de una versión cefálica externa, se debe intentar convertir la situación transversa a una longitudinal.
- C) Cuando la gestante solicite una cesárea electiva por gran ansiedad se le informara de los riesgos de dicha intervención.
- D) Evitar que la gestante se pueda ir a su casa y comenzar la inducción.

70.- ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de la cefalea postpunción dural?

- A) Ocurre típicamente a las 72 horas de la epidural, pero puede ocurrir antes o incluso días después.
- B) Mejora con el decúbito supino.
- C) Se acompaña de fotopsias.
- D) Empeora con movimientos de la cabeza y maniobras que aumentan la presión intracraneal (tosar, estornudar).

71.- Cuál de las siguientes normas deben seguirse para una correcta recogida de muestra de orina para cultivo, solicitado en el caso de una gestante con sospecha de bacteriuria asintomática según la última actualización de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO):

- A) Recoja la primera orina de la tarde.
- B) Utilice un frasco estéril de tapón de rosca.
- C) Es prescindible una rigurosa higiene previa a la recogida de orina.
- D) No es necesario entregar la muestra a la mayor brevedad. Hasta su entrega, se puede conservar a temperatura ambiente.

72.- En el estudio de una pareja con disfunción reproductiva se tienen en cuenta una serie de factores que influyen en conseguir un embarazo. ¿Cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO?

- A) La disfunción ovulatoria ocurre entre 15-40% de los casos de las pacientes estériles y es altamente sugestivo de irregularidad en el ciclo menstrual que revele algún tipo de anovulación.
- B) El factor uterino causa un alto porcentaje de esterilidad.
- C) La permeabilidad tubárica causa aproximadamente un 30-35% de los casos de esterilidad femenina.
- D) El factor cervical es poco frecuente que cause esterilidad.

73.- Mujer en la menopausia que en su control para la osteoporosis ha obtenido en la densitometría un valor de T-Score de -2. ¿Cuál es su significado?

- A) Normal.
- B) Osteoporosis.
- C) Osteoporosis severa.
- D) Osteopenia.

74.- Cuál de las siguientes NO corresponde a una fase de la relación de ayuda con la paciente en una primera entrevista clínica:

- A) Duelo.
- B) Clarificación del problema.
- C) Confrontación y reestructuración.
- D) Programar la acción (resolución).

75.- Según las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesiología sobre el ayuno durante el trabajo de parto en gestantes de bajo riesgo es cierto que:

- A) Se deben administrar antiácidos en todas las gestantes de bajo riesgo para prevenir la posible aspiración pulmonar permitiendo la ingesta de carbohidratos de rápida absorción.
- B) La dieta absoluta de más de 12 horas es la estrategia más segura en estas pacientes.
- C) Parece que la ingesta libre de líquidos durante el trabajo de parto disminuye el riesgo de cetosis.
- D) Solo se permitirá la ingesta libre tras el alumbramiento fetal debido a que es cuando más aumentan las necesidades energéticas maternas.

76.- En relación con las infecciones de la mama relacionadas con la lactancia, ¿cuál es la secuencia correcta del mecanismo de producción de la mastitis?

- A) Inflamación - Estasis de leche - Dolor - Evitación - Disbiosis - Infección.
- B) Inflamación - Dolor - Evitación - Estasis de leche - Disbiosis - Infección.
- C) Infección - Inflamación - Dolor - Evitación - Estasis de leche - Disbiosis.
- D) Infección - Dolor - Evitación - Estasis de leche - Disbiosis - Inflamación.

77.- NO se considera brote de interés supracomunitario:

- A) Brote epidémico que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
- B) Brote en el que se establezca la sospecha de relación con un producto que se comercialice fuera de la Comunidad Autónoma afectada.
- C) Brote cuyas circunstancias hagan temer su extensión fuera de la Comunidad Autónoma implicada.
- D) La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, imputable a causa accidental, manipulación o consumo.

78.- La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) generalmente es de origen polimicrobiano, ¿cuál de los siguientes microorganismos NO es causa de EIP?

- A) Neisseria Gonorrhoeae.
- B) Chlamydia Trachomatis.
- C) Treponema Pallidum.
- D) Escherichia Coli.

79.- Acude una paciente a la consulta de la matrona de forma urgente ya que tuvo relaciones sexuales hace 4 días y se rompió el preservativo, de los siguientes métodos cual sería el consejo más acertado:

- A) Píldora de Levonorgestrel de 1500mg.
- B) Hacerse una prueba de embarazo.
- C) Acetato de Ulipristal 30 mg.
- D) Método Yuzpe.

80.- Cual de las siguientes medidas NO se corresponde con una medida de tendencia central:

- A) Media aritmética.
- B) Moda.
- C) Desviación media.
- D) Mediana.

81.- Señale cuál de las siguientes alteraciones cardiovasculares es INCORRECTA en la tetralogía de Fallot:

- A) Hipertrofia ventricular izquierda.
- B) Comunicación interventricular.
- C) Acabalgamiento de la aorta.
- D) Estenosis pulmonar.

82.- La dimensión de la calidad asistencial que indica si los cuidados necesarios por un paciente se aplican en una secuencia lógica es:

- A) Satisfacción.
- B) Equidad.
- C) Legitimidad.
- D) Continuidad.

83.- ¿Con qué frecuencia hay que realizar el cribado de cáncer de cuello de útero?

- A) Mujeres de 25 a 35 años, cada tres años.
- B) Mujeres de 35 a 65 años, anualmente.
- C) Mujeres de 35 a 65 años, cada tres años.
- D) Mujeres de 25 a 35 años, cada cinco años.

84.- La fase secundaria de la sífilis se caracteriza por lo siguiente. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A) No produce prurito.
- B) Erupciones en la piel, boca, vagina y ano.
- C) Una (o múltiples) úlcera indolora, firme y redondeada.
- D) Otros síntomas: fiebre, dolor de garganta, pérdida de cabello, dolor muscular y fatiga.

85.- El modelo que define Enfermería como aquella profesión basada en la relación entre profesional y el paciente (persona individual) siendo entre las necesidades de los cuidados la más importante de ellas: la necesidad de establecer una correcta relación terapéutica, es:

- A) Modelo de las necesidades básicas de M. Rogers.
- B) Teoría general de déficit de autocuidado de D. Orem
- C) Teoría de las relaciones interpersonales de H. Peplau.
- D) Modelo de adaptación de C. Roy

86.- En Atención Primaria en el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) para el registro de la actividad sanitaria se utiliza mayoritariamente:

- A) Sistema de Información Atención Primaria (SIAP).
- B) Oficina Médica Informatizada para Atención Primaria (OMI-AP).
- C) Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP).
- D) Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).

87.- ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para la gestación?

- A) Infección urinaria de repetición durante la gestación actual.
- B) Índice de Masa Corporal >29.
- C) Hijo previo nacido vivo con lesión neurológica residual.
- D) Esterilidad en tratamiento al menos durante 1 año.

88.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación a las medidas de prevención de la Hemorragia Posparto Precoz (HPP)?

- A) Recientemente se ha descartado en España la carbetocina para la prevención de la atonía uterina tras el parto por cesárea bajo anestesia epidural o espinal.
- B) Identificación de los factores de riesgo.
- C) Uso rutinario de oxitocina tras la salida del hombro anterior reduce el riesgo de HPP en más de un 40%.
- D) La asociación de metilergometría con la oxitocina mejora la eficacia en comparación con el empleo de oxitocina sólo en el manejo activo del alumbramiento.

89.- Para el indicador Años potenciales de vida perdidos (APVP) en 2021 en Aragón señala la INCORRECTA:

- A) Son un excelente indicador para detectar causas de mortalidad prematura.
- B) La cantidad de APVP en mujeres y hombres es similar.
- C) Las causas circulatorias ocupó el segundo lugar por delante de las infecciosas.
- D) El mayor número ha sido causado por los tumores, tanto en hombres como en mujeres.

90.- Las fases de la respuesta sexual humana descritas por W. Master y V. Johnson en 1966 son:

- A) Excitación, Meseta, Orgasmo y Postefectos.
- B) Deseo, Excitación, Orgasmo y Resolución.
- C) Excitación, Meseta, Orgasmo y Resolución.
- D) Deseo, excitación, Orgasmo y Resolución.

91.- Según el protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en relación al Control Prenatal del embarazo normal, cual es la ganancia de peso adecuada para una gestación gemelar cuyo IMC se sitúa entre el 25 y 29,9 Kg/m²:

- A) Entre 7 y 12,5 Kg de peso.
- B) Entre 11 y 19,1 Kg de peso.
- C) Entre 16,8 y 24,5 Kg de peso.
- D) Entre 14,1 y 22,7 Kg de peso.

92.- Entre las recomendaciones durante la fase de dilatación en un parto en el agua, señale la INCORRECTA:

- A) Durante todo el proceso debe tenerse muy en cuenta la temperatura del agua.
- B) Se realizará auscultación intermitente de la FCF cada 30 min. durante la primera hora y periódicamente durante todo el proceso de dilatación.
- C) Tener en cuenta la correcta hidratación de la madre y frecuencia de micción.
- D) El cuerpo de la mujer debe quedar sumergido por debajo de los pechos para favorecer la eliminación de calor corporal.

93.- ¿Cuál de los siguientes NO es un método directo de Educación Sanitaria?

- A) Exposición.
- B) Dramatización y teatro.
- C) Clase magistral.
- D) Dinámicas de grupo.

94.- Valentina, embarazada de 25 semanas, ha sufrido una herida potencialmente tetanígena y según su calendario vacunal tiene puestas 3 dosis. Indica la conducta correcta a seguir según el protocolo de Aragón:

- A) Administrar una dosis si hace más de 5 años de la última.
- B) No hay que poner ninguna dosis independientemente del tiempo de la última.
- C) Hay que empezar de nuevo el calendario vacunal ya que en el embarazo es más peligroso.
- D) Administrar 2 dosis o más si hace más de 2 años de la última dosis administrada.

95.- Amari, mujer afro-americana de 33 años de edad, acude a la consulta de la matrona estando embarazada de 8+3 semanas y un IMC (índice de masa corporal) de 32 kg/ m², nuestra postura frente al cribado de diabetes gestacional será el siguiente:

- A) Solo deberá realizarse entre la 24 y 28 semanas de embarazo.
- B) En mujeres con factores de riesgo no se realiza ningún cribado de diabetes gestacional ya que se diagnostica directamente.
- C) Las mujeres menores de 35 años están exentas de realizar este cribado siempre.
- D) Debido a su raza e IMC esta mujer debería hacérselo en el primer trimestre ya que tiene un riesgo más elevado de diabetes gestacional.

96.- Según Lalonde el nivel de salud de una comunidad estaría influido por cuatro grandes grupos de determinantes:

- A) Biología Humana, medio ambiente, estilos de vida/conductas de salud y sistema de asistencia sanitaria.
- B) Individuales, familiares, sociales y comunitarios.
- C) Biológicos, psicológicos, sociales y espirituales.
- D) Ninguna de las anteriores.

97.- Los Objetivos de la Red de la Escuela de Salud de Aragón (ORDEN SAN/865/2023, de 27 de junio) son los siguientes. Señale la INCORRECTA:

- A) Favorecer el desarrollo de la alfabetización en salud en el Sistema de Salud de Aragón, mediante la cooperación entre profesionales del sistema de salud, asociaciones de pacientes, ciudadanas y sociales y otras entidades interesadas.
- B) Reconocer el papel de los profesionales del sistema de salud y promover la constitución de una Comunidad de Práctica Profesional para el desarrollo de la alfabetización en salud.
- C) Identificar las fortalezas, necesidades y preferencias de alfabetización en salud y promover estrategias de co-diseño que no tengan en cuenta la experiencia del paciente y de la ciudadanía para mejorar las decisiones compartidas, la equidad en salud y la calidad de la atención sanitaria.
- D) Fomentar la innovación para el desarrollo de la alfabetización en salud y contribuir a la mejora de calidad de la atención sanitaria incorporando la experiencia del paciente.

98.- ¿De qué capa germinal procede la cubierta epitelial del conducto auditivo?

- A) Mesodermo.
- B) Endodermo.
- C) Ectodermo.
- D) Mesodermo paraxial.

99.- El Patrón Funcional de M Gordon donde se valora si la persona maneja todo lo relacionado con su salud -respecto a su mantenimiento o recuperación- y la adherencia a las prácticas terapéuticas es:

- A) Rol – relaciones.
- B) Actividad – ejercicio.
- C) Valores – creencias.
- D) Percepción – manejo de la salud.

100.- María ingresa estando embarazada de 24 semanas y 5 días. A los 5 días de ingreso, nace un varón. Teniendo en cuenta las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología. ¿Cuál es la actuación sanitaria a practicar tras el nacimiento del bebé?

- A) Medidas únicamente de confort neonatal.
- B) Individualizar y buscar el consenso de los padres para decidir medidas terapéuticas.
- C) Individualizar y valorar unilateralmente el equipo sanitario las medidas terapéuticas.
- D) Realizar una reanimación activa.

101.- ¿Quiénes son las personas beneficiadas con la prestación: Nacimiento y Cuidado de Menor?

- A) Persona trabajadora por cuenta ajena en situación de excedencia voluntaria antes del momento del nacimiento.
- B) Persona trabajadora por cuenta propia de 19 años de edad sin exigirle ningún periodo mínimo de cotización.
- C) Persona trabajadora que no está al corriente de pago de las cuotas de las que sean responsables directos las personas trabajadoras.
- D) Persona trabajadora por cuenta propia de 28 años de edad sin exigirle ningún periodo mínimo de cotización.

102.- Indica cuál de estas fases NO corresponde al modelo PRECEDE de planificación en Educación para la Salud:

- A) Fase 3 - Diagnóstico conductual.
- B) Fase 4 - Diagnóstico educativo.
- C) Fase 1 y 2 - Diagnóstico epidemiológico y social.
- D) Fase 5 - Diagnóstico administrativo.

103.- Según la "regla de los 3 minutos", ante un evento de hipoxia fetal aguda con presencia de desaceleración prolongada de más de 5 minutos de duración. Una vez diagnosticada la posible causa iatrogénica y realizadas las medidas pertinentes de resucitación fetal, en qué minuto desde el inicio del evento agudo ante la no recuperación de la desaceleración se iniciarán las maniobras para lograr un parto inminente mediante parto instrumental o cesárea:

- A) 6-9 minuto.
- B) 9-12 minuto.
- C) 12-15 minuto.
- D) 15-18 minuto.

104.- ¿Cuál de estas tipologías de pelvis presenta una reducción uniforme de los diámetros del estrecho inferior?

- A) Plana.
- B) De Naegele.
- C) De Robert.
- D) Infundibuliforme.

105.- Sobre la preeclampsia en el primer trimestre, señale la respuesta correcta:

- A) El cribado no está justificado ya que no hay tratamiento posible de forma precoz.
- B) Se ha demostrado que la administración de AAS (Ácido acetil salicílico) a dosis baja antes de la semana 16 reduce la posibilidad de desarrollar la enfermedad antes de la semana 37 de gestación.
- C) Sólo existe un tipo de cribado posible basado en factores de riesgos maternos y no analíticos.
- D) El AAS está totalmente contraindicado en el embarazo incluso a dosis bajas por riesgo elevado de sangrado.

106.- Señale la respuesta INCORRECTA en referencia a la sintomatología que puede provocar en mujeres la bacteria Chlamydia Trachomatis:

- A) Cambios en el color, olor o cantidad de secreciones vaginales.
- B) Sensación de ardor al orinar.
- C) Reglas más cuantiosas o sangrado entre periodos.
- D) Dolor en la parte alta del abdomen.

107.- El tratamiento para un sangrado abundante y/o prolongado en una mujer perimenopausica y que precisa anticoncepción. Indica la correcta:

- A) DIU levonorgestrel.
- B) Ligadura tubárica.
- C) DIU cobre.
- D) Acido traxenamico.

108.- ¿Cuál NO es una recomendación de nivel en la Guía de Práctica Clínica: Lactancia Materna – Fomento y apoyo al inicio, la exclusividad y la continuación de la Lactancia Materna para recién nacidos, lactantes y niños pequeños del Programa BPSO en España?

- A) Facilitar el contacto piel con piel entre la díada lactante inmediatamente tras el parto o cuando estén ambos clínicamente estable.
- B) Apoyar a la díada lactante para lograr que la colocación, el agarre y la transferencia de leche sean efectivos.
- C) Incluir a los miembros de la familia, como parejas y abuelos y abuelas, en la formación y apoyo a la lactancia materna.
- D) Ofrecer formación sobre lactancia materna únicamente en el periodo perinatal pero en distintos entornos y mediante distintos enfoques.

109.- En relación a los factores de riesgo modificables relacionados con la fertilidad y su éxito en los tratamientos de reproducción asistida, se considera INCORRECTO:

- A) Las mujeres con IMC bajo se relacionan con amenorrea y anovulación, que se puede corregir tras normalizar su peso corporal. Presentan mejores tasas de implantación y embarazo clínico en ciclos de reproducción.
- B) Las mujeres con IMC elevado se relacionan con oligoanovulación crónica que favorece una subfertilidad. Presentan menores tasas de implantación en ciclos de ovodonación.
- C) No existe evidencia entre un IMC disminuido en el varón y su fertilidad.
- D) La obesidad se relaciona con menor calidad de los ovocitos y mayor riesgo de aborto.

110.- En relación al Control Prenatal del embarazo normal, ¿cuál de estas infecciones NO se debe cribar de forma universal, independientemente de sus antecedentes o factores de riesgo?

- A) Rubéola.
- B) Hepatitis B.
- C) Sífilis.
- D) Hepatitis A.

