

## PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 1 de diciembre de 2022 de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud

### CATEGORÍA:

#### PEDIATRA DE A. P. EN CENTROS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

### ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **120 MINUTOS**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Cualquier marca en la hoja de respuestas podrá dar lugar a la anulación del examen.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**

**ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

**TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS**

**SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



**1.-"Las variaciones sistemáticas (no aleatorias) en las tasas estandarizadas de un procedimiento (médico o quirúrgico, diagnóstico, terapéutico o preventivo) a un determinado nivel de agregación de la población" son la definición de:**

- A) Aleatorización.
- B) Variaciones en la práctica médica.
- C) Errores sistemáticos.
- D) Errores evitables.

**2.- ¿Cuál de las siguientes premisas es verdadera en relación con la Cartera de Servicios del sistema sanitario público?**

- A) Las Comunidades Autónomas podrán elaborar sus propias carteras de servicios sin la obligación de incluir la común del Sistema Nacional de Salud.
- B) En los anexos del proyecto de Cartera de Servicios no está incluida la prestación ortoprotésica.
- C) En el RD 1030/2006 por el que se establece la Cartera de Servicios comunes del SNS no se establece el procedimiento para su actualización.
- D) Su establecimiento garantiza la equidad y la accesibilidad, así como la efectividad y la seguridad de las técnicas, tecnologías y procedimientos incluidos en ella.

**3.- El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dará cuenta del cumplimiento de los planes de calidad a:**

- A) El Ministro de Fomento.
- B) El Senado.
- C) El Consejo Interpretativo del Sistema Nacional de Salud.
- D) Agencia Territorial de España.

**4.- Señale la respuesta correcta con respecto del régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal en España:**

- A) Sólo están protegidos los datos personales acerca de la orientación política.
- B) Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.
- C) Los funcionarios públicos y los carteros tienen su propia legislación específica sobre protección de datos personales.
- D) Sólo están protegidos los datos personales acerca de la procedencia étnica.

**5.- ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema/modelo de mejora de la calidad?**

- A) Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization.
- B) Modelo de excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM).
- C) Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).
- D) Normas ISO (Organización Internacional de Estandarización).

**6.- ¿Cuál es la definición de medicamento de alto riesgo?**

- A) Aquel que tiene una probabilidad muy elevada de causar daños graves cuando se produce un error en el curso de su utilización.
- B) Aquel que tiene una probabilidad mayor de producir error en su utilización.
- C) Aquel que tiene mayor frecuencia de efectos secundarios leves.
- D) Aquel que presenta baja tasa de adherencia.

**7.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: "El documento de una persona mayor de edad, capaz y libre, que manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente." es:**

- A) Autonomía del paciente.
- B) Instrucciones previas.
- C) Consentimiento informado.
- D) Derecho a la intimidad.

**8.- De acuerdo con la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4 de esta ley, haya valorado las opciones propias del caso. El consentimiento del paciente será:**

- A) Verbal, por regla general.
- B) No se exige consentimiento del paciente.
- C) Se exige sólo el consentimiento mediante poder notarial.
- D) No se legisla nada sobre el consentimiento del paciente.

**9.- La gestión de un servicio de un hospital se realiza en el marco de:**

- A) Microgestión.
- B) Mesogestión.
- C) Macrogestión.
- D) Calidad hospitalaria.

**10.- Señale la respuesta correcta respecto del cómputo de plazos administrativos, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) La Administración siempre elegirá el plazo que más convenga a sus intereses particulares en cualquier tipo de procedimiento administrativo.
- B) Cuando se señalen los plazos en meses, serán siempre inhábiles.
- C) Cuando se señalen los plazos por días, se entiende que son estos hábiles siempre que la Ley o el Derecho de la Unión Europea no señale otro cómputo.
- D) Todo plazo comenzará a contar siempre antes de la notificación.

**11.- En relación a la gingivoestomatitis herpética, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Es la primoinfección producida por el virus Herpes Simple.
- B) Es un cuadro afebril que provoca anorexia y dolor importante.
- C) Se producen lesiones vesiculosas en toda la cavidad oral (labios, encías, lengua y paladar, amígdalas y faringe).
- D) La administración de aciclovir oral en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas reduce la gravedad y la duración de la enfermedad.

**12.- Respecto al consumo de bebidas "energéticas" en la infancia y la adolescencia es FALSO:**

- A) La Consellería de Sanidad de Galicia trabaja en un proyecto de ley de prevención de adicciones en menores que pretende equiparar las bebidas "energéticas" con el alcohol y limitar la venta y consumo a < 18 años.
- B) Su consumo se puede asociar a irritabilidad, insomnio y cefalea.
- C) La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia advierte que el consumo de éstas bebidas puede abrir la puerta a la ingesta de otras sustancias tóxicas.
- D) La adolescencia no es un periodo de vida de especial vulnerabilidad, por lo que no es necesario tomar medidas que contribuyan a la adherencia a estilos de vida saludables.

**13.- De las siguientes afirmaciones respecto a la leucemia infantil, señale la opción INCORRECTA:**

- A) La leucemia es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica.
- B) El dolor osteoarticular no es un síntoma habitual.
- C) La leucemia más frecuente en la edad pediátrica es la leucemia linfoblástica aguda.
- D) El diagnóstico se realiza mediante el análisis morfológico, citogenético y molecular del aspirado de médula ósea.

**14.- Respecto al tratamiento de la fiebre ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- A) Hay que tratarla siempre a partir de 38º.
- B) Las medidas físicas por sí solas no son suficientes y tienen que ir acompañadas de medidas farmacológicas.
- C) Los antitérmicos en niños con antecedentes de convulsión febril reducen el riesgo de recidivas.
- D) El paracetamol es el antipirético de referencia.

**15.- En relación con la tortícolis muscular congénita señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) El 20% de los niños con tortícolis muscular congénita presentan algún grado de luxación congénita de cadera.
- B) Cuanto antes se inicia la intervención terapéutica, menor es la duración del tratamiento y la necesidad de una intervención quirúrgica posterior se reduce significativamente.
- C) En ocasiones hay que hacer diagnóstico diferencial con luxación atlantoaxoidea, hemivértebras o alteraciones neurológicas.
- D) Es más frecuente en el sexo femenino.

**16.- Señale la opción FALSA sobre la salud mental en niños migrantes:**

- A) Debemos estar sensibilizados hacia lo que puede representar el duelo migratorio de los niños y adolescentes y de sus padres, y la adaptación familiar, especialmente de los adolescentes que hayan estado separados de sus padres durante años.
- B) Ya no está estigmatizada, se comprende bien y por ello cada vez se diagnostica más.
- C) Las investigaciones han demostrado que la exposición a por lo menos cuatro experiencias adversas en la infancia está firmemente asociada con la aceptación de riesgos en el ámbito sexual, los trastornos de salud mental y el abuso del alcohol y está aún más firmemente asociada con el uso problemático de drogas, la violencia interpersonal y la violencia contra uno mismo.
- D) Los Menores no Acompañados requieren valoración médica y psicosocial que preferiblemente han de llevarse a cabo cuanto antes.

**17.- Respecto a la inmunización frente al VRS con Nirsevimab en Aragón en la temporada 2023/24, indique la respuesta FALSA:**

- A) Se recomienda a los menores de 6 meses nacidos a partir del 1 de abril de 2023 y hasta 31 de marzo de 2024.
- B) Al igual que las vacunaciones, la inmunización pasiva con Nirsevimab no confiere protección de forma inmediata.
- C) Los niños con diagnóstico clínico de bronquiolitis sin confirmación microbiológica recibirán Nirsevimab.
- D) Niservimab de 50 mg se recomienda para niños <5 Kg.

**18.- ¿Cuál es la afirmación correcta respecto al diagnóstico de retraso del crecimiento?**

- A) Talla por debajo de -2DE (o del percentil 3) y una velocidad de crecimiento normal.
- B) Los antecedentes familiares no son importantes en la anamnesis de retraso del crecimiento.
- C) Talla por debajo de -2DE (o del percentil 3) y una velocidad de crecimiento patológica.
- D) Los antecedentes maternos de hipertensión y diabetes gestacional no son relevantes.

**19.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal.**

- A) Se trata de la causa más frecuente de epífora en el lactante.
- B) En caso de conjuntivitis asociada se debe recoger siempre cultivo para identificar el agente causante.
- C) Se recomienda remitir al oftalmólogo a los 9-12 meses en caso de persistencia.
- D) La obstrucción no complicada precisa habitualmente un tratamiento conservador mediante masaje del saco lagrimal.

**20.- ¿Qué debemos descartar en una niña con alopecia androgénica?**

- A) Nevus sebáceo.
- B) Infecciones fúngicas.
- C) Síndrome ovario poliquístico.
- D) Artritis reumatoide.

**21.- Se considera recién nacido con riesgo de presentar hiperbilirrubinemia significativa todas las siguientes opciones EXCEPTO:**

- A) Edad gestacional menor de 38 semanas.
- B) Niño alimentado con leche maternizada.
- C) Ictericia visible en las primeras 24 h de vida.
- D) Hermano con ictericia que requirió fototerapia.

**22.- Indique la respuesta correcta en relación a las pruebas diagnósticas en Oftalmología Pediátrica:**

- A) Test de Brückner: valora la estereopsis.
- B) En la valoración de la agudeza visual, el mejor rendimiento diagnóstico nos lo proporcionará el método más sencillo que permita el desarrollo del niño.
- C) Test de Lang I y II: valoran el reflejo rojo.
- D) Cover test: Si existe una endotropia o desviación en convergencia, al ocluir el ojo fijador, el ojo contrario llevará a cabo un movimiento de rectificación de dentro hacia afuera.

**23.- En relación con el cálculo de riesgos señale la opción FALSA:**

- A) El riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad.
- B) En los estudios de casos y controles la fuerza de asociación se estima calculando el odds ratio.
- C) El riesgo relativo mide la incidencia de la enfermedad en la población total.
- D) El cálculo del intervalo de confianza del riesgo relativo y el odds ratio es fundamental para realizar el análisis de cualquier estudio.

**24.- Según el documento colaborativo del año 2018, “Orientación comunitaria: hacer y no hacer en Atención Primaria”, del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), ¿qué se recomienda NO HACER en Atención Primaria?**

- A) Incorporar la recomendación de recursos comunitarios y activos para la salud.
- B) Promover el empoderamiento y la participación de las personas en nuestra práctica profesional.
- C) No dejar la orientación comunitaria al voluntariado profesional.
- D) Creer que los profesionales sanitarios son los protagonistas de los procesos comunitarios.

**25.- Respecto a la neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál de los siguientes enunciados es FALSO?**

- A) La ausencia de taquipnea descarta neumonía con alta probabilidad en niños menores de 2 años.
- B) Es recomendable realizar siempre radiografía de tórax.
- C) La clínica puede variar en función de la edad, el agente causal y la gravedad de presentación.
- D) Los lactantes asocian mayor sintomatología general (irritabilidad, insomnio, somnolencia, vómitos, diarrea, rechazo alimentario).

**26.- ¿Cuál es la causa más común de anemia en la población pediátrica?**

- A) Deficiencia de hierro.
- B) Enfermedades genéticas.
- C) Infecciones crónicas.
- D) Traumatismos.

**27.-** Acude a urgencias un lactante de 22 meses que se ha caído del tobogán hace una hora. Su familia no sabe qué ha pasado porque estaba mirando el móvil. Su madre dice que nada más caer no respondía a su llamada y que los ojos se le han quedado en blanco y ha hecho movimientos raros.

A la exploración presenta fontanela abombada y vómitos, está somnoliento y no responde a su nombre. ¿Qué prueba de imagen urgente solicitaría?

- A) Rx cráneo.
- B) TAC.
- C) RNM.
- D) Ninguna, hay que sedarlo y es peligroso.

**28.-** De las siguientes actuaciones, ¿cuál NO está contemplada en la línea estratégica de salud mental infantojuvenil del Plan de Salud Mental 2022-25 de Aragón?

- A) Creación de un programa de transición entre los/las profesionales implicados para facilitar la transición entre USMIJ-USM y la continuidad de cuidados.
- B) Diseñar una vía de atención preferente a menores en situación de protección y/o bajo medida judicial.
- C) Ampliación del número de camas y los espacios terapéuticos en Unidades de Corta Estancia hospitalarias dirigidas a población infantojuvenil.
- D) Creación y apertura de una Unidad de Larga Estancia hospitalaria.

**29.-** La prueba de cribado neonatal requiere las siguientes características EXCEPTO:

- A) Alta sensibilidad de la prueba.
- B) Alta especificidad de la prueba.
- C) Existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos en la prueba.
- D) Aceptable para toda la población de recién nacidos.

**30.-** ¿Cuándo sospecharía de un problema de hipoacusia en un lactante?

- A) Ausencia de reflejo palpebral en el primer mes.
- B) Al mes de vida no reconoce la voz de sus padres.
- C) A los 2 meses no es capaz de girar la cabeza hacia los sonidos.
- D) A los 18 meses no puede localizar sonidos.

**31.-** Señale la respuesta correcta respecto al eritema infeccioso:

- A) Es contagioso hasta que desaparece el exantema.
- B) También es conocido como sexta enfermedad o roséola.
- C) El agente etiológico es el Parvovirus B19.
- D) El exantema característicamente afecta a palmas y plantas.

**32.-** ¿Cuál de estas enfermedades NO es de declaración obligatoria urgente en Aragón?

- A) Paludismo.
- B) Rabia.
- C) Enfermedad meningocócica.
- D) Hepatitis A.

**33.-** La secuencia de sincronización de masaje cardíaco en lactantes y niños es:

- A) 30/2
- B) 15/2
- C) 6/2
- D) 15/4

**34.-** Lo característico de la exploración de una epifisiolisis de cadera es:

- A) Alargamiento de la extremidad.
- B) Limitación a la rotación externa.
- C) Niña delgada.
- D) Marcha con el pie en rotación externa.

**35.- ¿Cuál de las siguientes recomendaciones NO estaría indicada para la prevención del síndrome de la muerte súbita del lactante?**

- A) Fomentar la lactancia materna.
- B) Vacunación.
- C) Posición en prono para dormir.
- D) Recomendación de no usar chupete.

**36.- Niño de 4 años diagnosticado de meningitis meningocócica. ¿En cuál de las siguientes situaciones NO estaría indicada la quimioprofilaxis?**

- A) Hermana de 8 años con quien comparte habitación.
- B) Niña de 4 años que acude a su misma aula.
- C) Niño de 4 años del aula vecina.
- D) Profesora del aula.

**37.- Con respecto a la proteinuria en el paciente pediátrico, indique la respuesta INCORRECTA:**

- A) La proteinuria glomerular es la causa más frecuente de proteinuria en edad pediátrica.
- B) Una orina muy concentrada puede ocasionar falsos positivos, al igual que un pH ácido menor de 4,5.
- C) El 50% de las proteínas eliminadas por la orina de modo fisiológico son secretadas por el epitelio tubular (proteínas de Tamm-Horsfall).
- D) Se considera normal un cociente proteinuria/creatinina en una muestra aislada de orina <0,20 en el niño mayor de 2 años, y <0,50 en niños menores de 2 años.

**38.- Según el IRASPROA, actualizado en noviembre 2023, el tratamiento de elección de la neumonía adquirida en la comunidad en un niño mayor de 3 meses vacunado frente *H. influenzae* es:**

- A) Amoxicilina a 80 mg/kg/día cada 8 horas 7 días.
- B) Amoxicilina a 90 mg/kg/día cada 12 horas 10 días.
- C) Amoxicilina a 90 mg/kg/día cada 8 horas 7 días.
- D) Amoxicilina a 80 mg/kg/día cada 12 horas 10 días.

**39.- Con respecto al hemangioma infantil, señale la respuesta correcta:**

- A) El síndrome PHACES comprende diversas alteraciones asociadas a un hemangioma de gran tamaño localizado en tronco y extremidades superiores.
- B) Previo a su aparición, podemos encontrar una lesión blanquecina localizada, una mácula eritematosa o telangiectasias.
- C) La biopsia de la lesión y la tinción con el marcador GLUT-1 tiene alta sensibilidad para el diagnóstico de hemangioma.
- D) El tratamiento de elección es el propanolol oral a dosis inicial de 0,5 mg/kg/dosis cada 24 horas, según el consenso español.

**40.- En el estudio de un lactante con HNP (Hidronefrosis prenatal) se recomienda realizar CUMS (cistouretrografía miccional seriada) en las siguientes situaciones, EXCEPTO:**

- A) Dilatación ureteral.
- B) Vejiga anómala en el estudio ecográfico.
- C) Hidronefrosis dilatada de grado II.
- D) Niños y niñas con HNP que desarrollen infecciones del tracto urinario.

**41.- Le avisan por teléfono a su consulta por un niño de 7 años que ha sido traído desde el centro escolar tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Es fundamental la repetición periódica de la secuencia ABCDE.
- B) La valoración del paciente se debe realizar de forma protocolizada y secuencial.
- C) La valoración inicial comprende la exploración de cabeza a pies del paciente, por delante y por detrás para detectar posibles lesiones ocultas.
- D) Un valor inferior a 8 en la escala de Glasgow es indicación de intubación orotraqueal.

**42.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la tabla de desarrollo "Haizea-Llevant"?**

- A) Es un instrumento que permite comprobar el nivel de desarrollo cognitivo, social y motor de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad.
- B) En niños nacidos prematuros no es preciso utilizar la edad corregida por debajo de los 18 meses de edad.
- C) Para la correcta evaluación del desarrollo psicomotor el niño no debe estar enfermo, hambriento o con sueño, y debemos asegurar que ve y oye bien.
- D) Para realizar la prueba no es preciso mantener el orden estricto del test.

**43.- En relación con la fractura de clavícula en el RN, señale cuál NO es un factor de riesgo:**

- A) Bajo peso al nacer.
- B) Edad gestacional.
- C) Distocia de hombros.
- D) Instrumentación del parto.

**44.- Respecto a la uretritis/cervicitis gonocócica señale el enunciado FALSO:**

- A) Etiología *N. gonorrhoeae*.
- B) Periodo de incubación de 7 a 14 días.
- C) El exudado es abundante.
- D) Las mujeres con frecuencia son asintomáticas.

**45.- Al objetivar en una analítica anticuerpos antitiroideos aumentados con función tiroidea normal, ¿cómo procederías?**

- A) Repetición de analítica en 5 años según el screening de patología tiroidea.
- B) Poner tratamiento con tiroxina a dosis bajas.
- C) Pensaría en una tiroiditis subaguda granulomatosa.
- D) Ninguna es correcta.

**46.- El Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-Peds) se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:**

- A) Hipoalbuminemia.
- B) Linfocitosis.
- C) Elevación significativa del dímero D.
- D) Hiponatremia.

**47.- ¿Cuál de las afirmaciones sobre la función pulmonar es cierta?**

- A) Todos los niños con asma tienen el FEV1 alterado.
- B) En el niño, FEV1 /FVC se correlaciona mejor con la gravedad del asma que el FEV1.
- C) Es posible obtener espirometrías forzadas fiables en niños a partir de los dos años de edad.
- D) Para que una prueba broncodilatadora se considere positiva, el FEV1 post broncodilatación debe ser mayor del 20% respecto al valor teórico.

**48.- Ante un niño con diabetes que acude al centro de salud (debut hace 5 meses) con hipoglucemia que ha empezado a tratar en casa, pero le marca su sensor continuo de glucosa subcutáneo 50 mg/dl, con flecha estable. El niño está consciente, buen color, prestando atención a lo que haces, ¿qué actuación es la correcta?**

- A) Hacer cetonemia para tratar la hipoglucemia.
- B) Tratar con glucagón intranasal.
- C) Confirmar la cifra de glucemia con glucemia capilar.
- D) Preparar un vaso con azúcar y llamar a una ambulancia para trasladarlo al hospital.

**49.- Indique el vector más probable en Enfermedad de Lyme:**

- A) *Rhicephalus sanguineus*.
- B) *Ixodes ricinus*.
- C) *Hyalomma marginatum*.
- D) *Dermacentor marginatus*.

**50.- ¿Cuál es uno de los criterios de selección de medicamentos para su uso racional?**

- A) Popularidad del medicamento entre los pacientes.
- B) Coste elevado.
- C) Efectividad demostrada en estudios clínicos.
- D) Nombre comercial.

**51.- Respecto a las infecciones osteoarticulares en la infancia, señale la respuesta FALSA:**

- A) La articulación más frecuentemente afectada en la artritis séptica es la rodilla.
- B) El principal agente etiológico en nuestro medio es el *Staphylococcus aureus*.
- C) La *Kingella kingae* se aisla más frecuentemente en niños menores de 3 años.
- D) Estas infecciones son más frecuentes en niños mayores de 5 años.

**52.- Si acude un adolescente con miosis, bradicardia, y respiración superficial, sospecharemos:**

- A) Abuso de plantas con efecto anticolinérgico.
- B) Sobredosis de cocaína.
- C) Sobredosis de heroína.
- D) Sobredosis de anfetaminas.

**53.- ¿Cuál es la causa más frecuente de arritmia en la edad pediátrica?**

- A) Taquicardia Supraventricular Paroxística (TPSV).
- B) Extrasístole Supraventricular.
- C) Síndrome QT largo.
- D) Síndrome de Brugada.

**54.- Respecto a la varicela señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Los pacientes con varicela contagian desde 24-48 horas antes de aparecer el exantema hasta que las vesículas se transforman en costras.
- B) El diagnóstico de la varicela se basa en los hallazgos clínicos.
- C) La neumonía varicelosa es la complicación más frecuente.
- D) El tratamiento con aciclovir no se recomienda de forma sistemática en varicela no complicada en niños sanos.

**55.- Con respecto al Programa de Salud Bucodental de Aragón, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Dentro de la asistencia dental básica están incluidas las extracciones de piezas temporales y permanentes.
- B) Pueden solicitar cita en su Centro de Salud, a través del teléfono de Salud Informa o llamando directamente a la clínica privada elegida.
- C) Para acceder sólo se precisa presentar la tarjeta sanitaria del menor y su Documento Nacional de Identidad.
- D) La atención sanitaria especial incluye tratamientos protésicos por caries de piezas permanentes en niños con enfermedades sistémicas que afecten gravemente al estado de salud.

**56.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?**

- A) El sobrepeso y la obesidad constituyen la patología crónica más prevalente en la edad infantil.
- B) Las enfermedades endocrinas, genéticas y metabólicas constituyen menos del 5% de los casos de obesidad y sobrepeso.
- C) Los antihistamínicos pueden producir aumento de peso.
- D) La prevalencia de obesidad es menor en clases económicamente desfavorecidas.

**57.- ¿Cuál debe ser la primera actuación ante un niño de 2 años con obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, con tos ineficaz e inconsciente?**

- A) Animar a toser.
- B) Alternar 5 golpes interescapulares con 5 compresiones torácicas.
- C) Alternar 5 compresiones abdominales con 5 compresiones torácicas.
- D) Abrir la vía aérea e iniciar RCP.

**58.- En relación con el impétigo señale la opción INCORRECTA:**

- A) En el caso de lesiones leves localizadas el tratamiento de elección es el ácido fusídico tópico.
- B) Los agentes etiológicos más frecuentes son *streptococcus pyogenes* y *staphylococcus aureus*.
- C) En caso de lesiones extensas recidivantes o fallo del tratamiento tópico el tratamiento de elección es cefadroxilo VO a 30 mg/kg/día.
- D) En caso de alérgicos a betalactámicos el tratamiento de elección son los macrólidos VO.

**59.- ¿Cuál de estas enfermedades NO tiene presencia de adenopatías?**

- A) Enfermedad de Kawasaki.
- B) Enfermedad de Kikuchi.
- C) Enfermedad de Castleman.
- D) Enfermedad de Maurizzi.

**60.- En un paciente de 8 años con necesidad de broncodilatador de acción corta más de dos veces al mes, sin síntomas entre crisis y con función pulmonar normal, ¿cuál sería el tratamiento de base?**

- A) Glucocorticoides inhalados a dosis bajas.
- B) No necesita tratamiento de base.
- C) Glucocorticoides inhalados a dosis bajas + inhibidores de los leucotrienos.
- D) Glucocorticoides inhalados a dosis medias + LABA.

**61.- NO es típico de la enfermedad de Scheuermann que:**

- A) Presenta acuñamiento vertebral anterior.
- B) Es una cifosis patológica.
- C) Afecta a una vértebra.
- D) Radiológicamente podemos observar los nódulos de Schmorl.

**62.- Son signos de Lactancia Materna efectiva todos los siguiente EXCEPTO:**

- A) Deglución audible.
- B) Ganancia de peso de 20-25 gr/día a partir del 5º día.
- C) Pérdida de peso superior al 10% en los primeros días de vida.
- D) Micciones frecuentes de color claro o amarillo pálido.

**63.- Respecto al nuevo Programa de Actividades Preventivas de la Infancia y Adolescencia (PAPI) señale la respuesta correcta:**

- A) Nace en formato app para renovar y ampliar el Programa de Salud Infantil (PSI) publicado en el año 2011.
- B) Pretende ser una herramienta útil exclusivamente para las familias.
- C) Para la elaboración del PAPI únicamente se contó con la colaboración de los siguientes grupos de trabajo de AEPap: educación para la salud, pediatría social y comunitaria y PrevInfad.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

**64.- ¿Cuándo NO es necesario hacer estudio microbiológico en una diarrea aguda?**

- A) Caso clínico dentro de un brote epidémico en la guardería, escuela, hospital, reuniones familiares, etc.
- B) Historia de viaje reciente a una zona de riesgo.
- C) Niños con enfermedades crónicas, que tienen mayor riesgo para una evolución desfavorable (neoplasias, inmunodeficiencias, enfermedad inflamatoria intestinal, etc.).
- D) Niños menores de 6 meses.

**65.- Con respecto a la actual Cartera de Servicios de Atención Primaria de Aragón, es cierto que:**

- A) En 2008 se incorporaron en el catálogo de prestaciones farmacéuticas los absorbentes de incontinencia urinaria aptos para niños con discapacidad.
- B) No incluye la atención telefónica con los distintos profesionales del equipo de atención primaria.
- C) No se contemplan actividades dirigidas a la detección e intervención en situaciones de maltrato a ancianos y discapacitados.
- D) Incluye tratamientos reparadores en dentición temporal.

**66.- De las siguientes afirmaciones respecto al cáncer infantil, señale la opción correcta:**

- A) Su incidencia es elevada.
- B) Sus síntomas suelen ser muy específicos.
- C) La leucemia mieloide aguda es la más frecuente en niños.
- D) Es la segunda causa de muerte a partir del primer año de vida.

**67.- Respecto a la Infección del Tracto Urinario es FALSO:**

- A) Tienen gran relevancia clínica y pronóstica en lactante < de 3 meses ya que puede desencadenar un proceso séptico sin apenas sintomatología específica acompañante.
- B) Necesariamente toda ITU febril se acompaña de afectación renal.
- C) Los pacientes con anomalías del sistema colector renal tienen un riesgo más elevado de presentar infecciones recurrentes.
- D) El recuento bacteriano significativo en orina es variable según la técnica de recolección utilizada.

**68.- Respecto a la valoración del crecimiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- A) La medición de la talla de manera aislada es el dato más relevante.
- B) La velocidad de crecimiento es un proceso dinámico y por ello tan relevante o más que la talla.
- C) El primer año de vida es el momento con menor velocidad de crecimiento.
- D) En ambos sexos, antes del brote puberal se produce un aumento de la velocidad de crecimiento.

**69.- ¿Cuál sería un signo de alarma de posible parálisis cerebral infantil congénita?**

- A) Deambulación a los 14 meses.
- B) No se voltea a los 4 meses.
- C) No sujeción de la cabeza al mes.
- D) Coger objetos solo con la mano derecha a los 10 meses.

**70.- Niña de 10 años de edad, procedente de Bolivia, que acude a la consulta de atención primaria por presentar fiebre de hasta 39.4 °C, acompañada de anorexia, vómitos y tinte icterico de la piel y las conjuntivas de 48 horas de evolución. En la anamnesis refiere haber viajado a su país de origen para visitar a su familia hace 20 días y haber consumido agua no embotellada, aunque sí hervida, frutas y verduras frescas.**

Indique la respuesta INCORRECTA en relación al cuadro clínico de la paciente:

- A) En el estudio analítico es probable encontrar elevación de las transaminasas e hiperbilirrubinemia.
- B) La paciente debería haber recibido dos dosis de la vacuna previamente al viaje.
- C) En este caso existe elevado riesgo de cronificación.
- D) Esta infección es la causa más frecuente de fallo hepático agudo en Latinoamérica.

**71.- Todas las siguientes se consideran señales de alerta de maltrato infantil, EXCEPTO:**

- A) Trastornos del sueño en un niño de 5 años.
- B) Escolar de 7 años que presenta dificultades escolares de aparición insidiosa.
- C) Niña de 4 años con fobias leves.
- D) Padres que consultan por hematomas en cara anterior extremidades inferiores en un niño de 7 años.

**72.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al reflujo gastroesofágico del lactante?**

- A) Se manifiesta en los primeros meses de vida y alcanza su punto culminante hacia los 4 meses.
- B) Los síntomas desaparecen espontáneamente en la mayoría de los lactantes a los 12-24 meses.
- C) El tratamiento inicial se basa en la aplicación de medidas conservadoras y cambio de hábitos de vida como las medidas posturales y medidas dietéticas.
- D) Los fármacos utilizados (inhibidores de la bomba de protones, antagonistas H<sub>2</sub>) están indicados desde el primer momento junto con la modificación de los estilos de vida.

**73.- Señale la opción FALSA en los siguientes binomios agente infeccioso – tratamiento de elección:**

- A) *Hymenolepis nana* – Praziquantel.
- B) *Giardia lamblia* – Albendazol.
- C) *Ascaris lumbricoides* – Mebendazol.
- D) *Enterobius vermicularis* – Mebendazol.

**74.- Define un esguince de tobillo grado III todo lo siguiente, EXCEPTO:**

- A) Apoyo imposible por el dolor.
- B) Hematoma inmediato.
- C) Bostezo articular > 5°.
- D) Cajón anterior positivo (> 3 mm).

**75.- Indique cuál NO es un criterio diagnóstico de lupus eritematoso sistémico:**

- A) Eritema malar en alas de mariposa.
- B) Fotosensibilidad.
- C) Ulceras orales o nasales.
- D) Artritis erosiva en al menos 2 articulaciones.

**76.- ¿Cuál es la mayor causa de morbimortalidad en neonatos?**

- A) Infecciones bacterianas.
- B) Hipertensión arterial.
- C) Colestasis neonatal.
- D) Fallo cardiaco.

**77.- Indique la situación en la que NO ESTÁ CONTRAINDICADA la Lactancia Materna:**

- A) Mastitis tuberculosa.
- B) Varicela materna a los 5 días del parto sin lesiones en la mama.
- C) Galactosemia.
- D) Madres infectadas por el virus de la leucemia humana de células T (HTLV tipo 1 o 2).

**78.- Indique de los siguientes enunciados, aquél que se corresponde con el nivel III de la clasificación GMFCS (Gross Motor Function Classification System):**

- A) Camina con limitaciones.
- B) Transportado en silla de ruedas.
- C) Auto-movilidad limitada, es posible que utilice movilidad motorizada.
- D) Camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha.

**79.- En relación con las pruebas para diagnosticar tuberculosis, señale la correcta:**

- A) La sensibilidad de la prueba de tuberculina y los IGRA de forma individual para diagnosticar infección tuberculosa es del 50%.
- B) La sensibilidad de ambas pruebas combinadas supera el 90%.
- C) La prueba de tuberculina es la primera opción diagnóstica en mayores de 5 años.
- D) Si ha sido vacunado de BCG la prueba de la tuberculina no nos da información.

**80.- En relación con la entrevista clínica, señale la opción INCORRECTA:**

- A) Las habilidades de comunicación son fruto del aprendizaje profesional.
- B) La relación asistencial se basa exclusivamente en la formación técnica del médico.
- C) La relación médica de calidad aumenta la eficacia en la detección y resolución de problemas clínicos, la satisfacción con la atención recibida y mejores resultados clínicos.
- D) Las habilidades de comunicación ayudan a tener una relación clínica gratificante para el pediatra, el paciente y sus padres.

**81.- En el cribado neonatal de Aragón NO entra:**

- A) Fibrosis quística.
- B) Síndrome de inmunodeficiencia combinada grave.
- C) Anemia falciforme.
- D) Acidurias orgánicas.

**82.- Respecto a la alimentación y estilos de vida saludables señale la afirmación FALSA:**

- A) En nuestro país a partir de 2005 se puso en marcha la estrategia NAOS.
- B) La estrategia NAOS tenía como objetivo disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso.
- C) El Código PAOS es un código de interrelación entre ejercicio físico y sobrepeso.
- D) El Estudio PASOS es un proyecto de investigación de población infantil que evalúa la actividad física, el sedentarismo, el estilo de vida y la obesidad.

**83.- De las siguientes afirmaciones en relación con los trastornos del comportamiento alimentario señale la opción INCORRECTA:**

- A) Esta entidad se describe de forma excepcional en países subdesarrollados.
- B) Las complicaciones médicas son multiorgánicas.
- C) Son más frecuentes en el varón.
- D) El tratamiento debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar.

**84.- Paciente de 3 años que acude a la consulta por fiebre de 39°C y otalgia derecha de 3 días de evolución. A la exploración física se le diagnostica de OMA derecha. Señale la opción correcta:**

- A) Se le pauta tratamiento antitérmico/analgesico durante 48 horas y posterior reevaluación.
- B) Se pauta amoxicilina a 80-90 mg/kg/día cada 8-12 horas durante 5-7 días.
- C) En caso de que se acompañe de otorrea el tratamiento de elección es cefuroxima oral.
- D) En caso de alergia retardada no grave a penicilina el tratamiento de elección es un macrólido.

**85.- Según la evidencia actual ¿qué recomendación es verdadera respecto al cepillado dental?**

- A) Los cepillos deben ser de cabezal grande y mango corto.
- B) Después del cepillado siempre se debe enjuagar con agua.
- C) El cepillado debe durar unos 2 minutos (en lactantes se acepta menos tiempo).
- D) La concentración de flúor en la pasta de dientes entre los 3-5 años debe ser de 1450ppm.

**86.- En relación al testículo no descendido, señale el enunciado FALSO:**

- A) La criptorquidia puede ser bilateral hasta en un 10% de los casos.
- B) La mayor parte de los testículos no descendidos son intraabdominales.
- C) No es recomendable solicitar una prueba de imagen antes de la derivación, ya que con frecuencia ocurren falsos positivos por estímulo del reflejo cremastérico.
- D) Las complicaciones de la criptorquidia consisten en menor fertilidad y riesgo de malignización.

**87.- NO es criterio de la Escala de Coma de Glasgow:**

- A) Abre los ojos al presionarle en el dedo.
- B) Palabras inadecuadas, irritabilidad/lanto consolable.
- C) Hiperventilación.
- D) No mueve los brazos ni las piernas.

**88.- Con relación a la evaluación del desarrollo psicomotor, indique cuál de los siguientes NO se considera un signo de alerta sino una variante de la normalidad:**

- A) Ausencia de juego simbólico a los 3 años de edad.
- B) Asimetrías en el tono, la postura y el movimiento a cualquier edad.
- C) Ponerse de pie y deambular sin pasar por la fase de arrastre o gateo.
- D) Persistencia después de los primeros meses, de patrones de conducta que deberían haber desaparecido, como el reflejo de Moro.

**89.- En las Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil se atienden pacientes hasta los:**

- A) 14 años
- B) 16 años
- C) 18 años
- D) 21 años

**90.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?**

- A) La proporción es un cociente donde el numerador está incluido en el denominador y expresa la probabilidad de que un suceso ocurra.
- B) La razón es un cociente donde el numerador no está incluido en el denominador.
- C) La tasa es un cociente que lleva incorporado en el denominador la variable de tiempo.
- D) Un tipo especial de proporción es la Odds.

**91.- ¿Cuándo consideraremos una prueba de Mantoux positiva?**

- A) Una induración 3 mm sin contacto activo con caso índice.
- B) Una induración  $\geq 10$  mm. y vacunación de BCG.
- C) Eritema  $\geq 10$  mm e induración  $\geq 2$  mm.
- D) Una induración  $< 5$  mm. y vacunación de BCG.

**92.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las cardiopatías congénitas es verdadera?**

- A) La tetralogía de Fallot es ductus dependiente.
- B) El síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas es una cardiopatía cianosante.
- C) Las cardiopatías congénitas son una malformación poco frecuente en recién nacido.
- D) La Tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianosante.

**93.- Son características del Síndrome de Down todas las siguientes EXCEPTO:**

- A) Surco simiesco.
- B) Hipotonía muscular.
- C) Pelvis displásica.
- D) Occipucio prominente.

**94.- Una niña de 9 años y 3 meses que inicia desarrollo mamario presenta probablemente:**

- A) Pubertad precoz.
- B) Pubertad adelantada.
- C) Pubertad normal.
- D) Desarrollo mamario secundario a consumo de estrógenos en la dieta.

**95.- En relación con los trastornos de ansiedad en la edad pediátrica, señale la opción INCORRECTA:**

- A) Constituyen el primer diagnóstico psiquiátrico en esta edad.
- B) Se asocian a dificultades académicas y sociales, depresión, ideación suicida y consumo de sustancias en el adulto.
- C) El diagnóstico es clínico.
- D) El tratamiento es farmacológico siempre.

**96.- ¿Cuál es un trastorno del desarrollo en la infancia?**

- A) Fiebre tifoidea.
- B) Hipotiroidismo.
- C) Autismo.
- D) Diabetes mellitus.

**97.- ¿Cuál es el principal objetivo de la terapia nutricional en neonatología?**

- A) Prevenir infecciones.
- B) Mejorar la función renal.
- C) Promover el crecimiento y desarrollo adecuado.
- D) Reducir la tensión arterial.

**98.- Las vacunas contra los siguientes gérmenes son vacunas inactivadas EXCEPTO:**

- A) Neumococo
- B) Rotavirus
- C) VPH
- D) Hepatitis B

**99.- ¿Cuál NO es un hallazgo frecuente en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano?**

- A) Déficit de vitamina B12.
- B) Ácido fólico bajo.
- C) Feropenia.
- D) Hipocalcemia.

**100.- La Distrofia Muscular de Duchenne:**

- A) Tiene una herencia autosómica recesiva.
- B) Es la distrofia muscular más frecuente en la infancia.
- C) Su forma más grave es la distrofia muscular de Becker.
- D) Con una exploración minuciosa al recién nacido, se puede diagnosticar en el primer mes de vida.

**101.- La escabiosis es una ectoparasitosis producida por:**

- A) *Acarus Siro*.
- B) *Blomia tropicalis*.
- C) *Sarcoptes scabiei*.
- D) *Demodex spp.*

**102.- En cuanto a los senos paranasales, ¿cuál sería la respuesta correcta?**

- A) En el Recién nacido están neumatizados los senos maxilares.
- B) En el Recién nacido están neumatizados los senos frontales.
- C) En el Recién nacido están neumatizados los senos etmoidales.
- D) En el Recién nacido están neumatizados los senos esfenoidales.

**103.- Niña de 8 años de edad que consulta por presentar una lesión pigmentada en el tercio superior de la espalda, de unos 5 mm de diámetro máximo, que ha desarrollado a su alrededor una zona de menor pigmentación. No presenta prurito y como antecedentes destaca un primo con melanoma intervenido a los 9 años de edad. ¿Cuál sería su diagnóstico?**

- A) Nevus de Meyerson.
- B) Vitílico.
- C) Melanoma maligno en regresión.
- D) Nevus de Sutton.

**104.- En la valoración de la gravedad de un caso de maltrato infantil debemos tener en cuenta todas las siguientes situaciones EXCEPTO:**

- A) La cercanía del incidente que ha provocado el maltrato.
- B) Si se trata de un hecho aislado o de una situación repetida.
- C) Dificultad de acceso del niño a recursos sociales.
- D) Recursos socioeconómicos de los padres.

**105.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el niño con infecciones recurrentes es FALSA?**

- A) Los niños sanos no tienen infecciones recurrentes.
- B) Los niños con perfil atópico tienen más riesgo de infecciones recurrentes.
- C) Las enfermedades crónicas aumentan el riesgo de infecciones recurrentes.
- D) Un niño con infecciones recurrentes puede tener una inmunodeficiencia.

**106.- Señale el enunciado FALSO respecto a los embarazos no deseados de las adolescentes:**

- A) El diagnóstico de gestación suele ser tardío.
- B) Supone un problema de salud con repercusión biológica, psicológica, económica y social, capaz de condicionar definitivamente el estilo de vida de la joven.
- C) El 10% terminan en IVE (interrupción voluntaria del embarazo).
- D) La mejor manera de disminuir las cifras de embarazos no deseados es ofrecer una buena educación sexual y métodos anticonceptivos eficaces.

**107.- Con respecto a los sistemas de retención infantil (SRI), es cierto que:**

- A) Los niños hasta 13 kg deberán usar un SRI tipo 0/0+, siempre en contra de la marcha.
- B) En el SRO Grupo 1 (9-18kg) el niño queda sujeto mediante un arnés de 3 puntos que siempre debe ir bien ajustado al cuerpo.
- C) En niños de 15-36 kg, la banda del cinturón debe ir algo holgada para mayor comodidad del niño.
- D) Las leyes que obligan al uso de SRI dan lugar a una disminución de la mortalidad del 60%.

**108.- ¿Qué técnicas educativas se utilizan desde la consulta de pediatría de atención primaria para promover la educación para la salud?**

- A) Charlas informativas.
- B) Juegos interactivos.
- C) Talleres de manualidades.
- D) Terapia farmacológica.

**109.- ¿Qué es el acoso escolar?**

- A) Una aversión irracional a la escuela.
- B) Un trastorno del desarrollo.
- C) Una conducta agresiva de forma repetitiva y sostenida en el tiempo hacia un alumno.
- D) Un comportamiento agresivo hacia un niño.

**110.- Acude a consulta un recién nacido con antecedente de macrosomía al nacimiento. NO SOSPECHARÍA:**

- A) Diabetes gestacional materna.
- B) Infección intrauterina.
- C) Sd. Weaver.
- D) Sd. Marshall-Smith.

