

EXAMEN B

1.- En el metaanálisis:

- A) La unidad de investigación es el individuo.
- B) La unidad de investigación es el estudio.
- C) La unidad de investigación es el estudio de pares.
- D) La unidad de investigación es el conglomerado.

2.- ¿En cuántos Sectores está distribuido el mapa sanitario de Aragón?

- A) Cinco.
- B) Ocho.
- C) Siete.
- D) Seis.

3.- La presidencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud corresponde a:

- A) No tiene presidente.
- B) El Gerente de Sector Zaragoza II.
- C) El Consejero del Departamento responsable de Salud.
- D) El Consejero del Departamento responsable de Agricultura.

4.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril), corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en la / las siguientes materias:

- A) Biotecnología.
- B) Productos Farmacéuticos.
- C) La Comunidad Autónoma de Aragón no tiene competencias exclusivas.
- D) La Comunidad Autónoma de Aragón sólo tiene competencias exclusivas.

5.- ¿Cuáles de los siguientes son tipos de estudios descriptivos?

- A) Ecológicos y transversales.
- B) Ecológicos y de cohortes.
- C) De una sola cohorte y de doble cohorte.
- D) De casos y controles y de cohortes.

6.- ¿Cuál de los siguientes pasos NO está descrito en el ciclo de Deming en la evaluación continua de la calidad?

- A) Planificar.
- B) Ejecutar.
- C) Controlar.
- D) Facturar.

7.- De los siguientes tipos de estudios señale el que NO es un estudio experimental:

- A) Estudio de casos y controles.
- B) Ensayo clínico.
- C) Ensayo de campo.
- D) Estudio de intervención comunitaria.

8.- La selección del personal Estatutario fijo se efectúa con carácter general a través del sistema de:

- A) Sólo Oposición.
- B) Concurso-Oposición.
- C) Sólo Concurso.
- D) Lo que diga cada convocatoria particular.

9.- Según los criterios de causalidad de Hill, “la magnitud o tamaño del efecto” se denomina:

- A) Fuerza.
- B) Consistencia.
- C) Especificidad.
- D) Temporalidad.

10.- Señale la respuesta correcta con respecto de los deberes del empleado público y su código de conducta, según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- A) El Estatuto entrará en vigor en septiembre de 2025.
- B) Todos los empleados públicos deberán actuar con disciplina marcial.
- C) Los empleados públicos deberán actuar con objetividad e integridad, entre otros principios.
- D) Los empleados públicos deberán actuar con austeridad, rapidez y parcialidad.

11.- Señale la afirmación correcta sobre los trastornos digestivos funcionales:

- A) La aerofagia es más frecuente en niñas sanas.
- B) La rumiación suele ocurrir durante el sueño o cuando el lactante está interactuando con otras personas.
- C) Los episodios de vómitos cíclicos suelen comenzar por la acción de algún agente desencadenante (chocolate, queso, glutamato monosódico, soja, proteínas de leche de vaca y huevo).
- D) La migraña abdominal no se suele acompañar de síntomas vegetativos.

12.- Respecto a la introducción de la alimentación complementaria en los lactantes es verdadero:

- A) A partir de los 6 meses podemos ofrecer frutos secos molidos.
- B) Al introducir el huevo cocido siempre primero la yema y luego la clara.
- C) La introducción de los cereales debe ser primero en polvo mezclados con leche.
- D) A partir de los 6 meses podemos dar salchichas cortadas a rodajas.

13.- En relación con la leucemia infantil, señale la opción INCORRECTA:

- A) La leucemia aguda linfoblástica tiene un pico de incidencia entre 1 y 4 años de edad.
- B) Los pacientes con Sd. de Down tienen más riesgo de padecer leucemia.
- C) Las citopenias y las organomelias no asociadas a infecciones deben de hacer sospechar un proceso linfoproliferativo.
- D) La supervivencia es mayor en la leucemia mieloide aguda

14.- En un niño con infecciones recurrentes, ¿cuándo es necesario descartar causas subyacentes?

- A) Tres o más procesos infecciosos víricos en un año.
- B) Dos o más infecciones graves en un año.
- C) Cuando necesita antibiótico más de dos veces en un año.
- D) Si las infecciones son leves y frecuentes, afectan a distintos sistemas y no afectan al desarrollo.

15.- En relación con la parálisis braquial obstétrica (PBO), señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La inervación de la extremidad superior depende fundamentalmente de las raíces nerviosas C5 a T1 que formarán el plexo braquial.
- B) El signo de Horner indica afectación preganglionar.
- C) El tratamiento se recomienda iniciarlo a partir de los 6 meses de vida.
- D) El diagnóstico, determinación del nivel afectado, la gravedad y la decisión terapéutica de la PBO se basa en la exploración física y no en pruebas complementarias.

16.- Sabemos que los adolescentes con un autoconcepto positivo y alta autoestima muestran una mayor:

- A) Tolerancia al estrés y estabilidad emocional.
- B) Sensibilidad al estrés y variabilidad cognitiva.
- C) Insensibilidad al malestar y el estrés.
- D) Flexibilidad cognitiva.

17.- Se recomendó la administración de vacunación frente a gripe y COVID 19 en la temporada 2023-2024 a los siguientes grupos de población, EXCEPTO:

- A) Personas de 5 años o más de esta edad residentes en instituciones cerradas.
- B) Diabetes mellitus.
- C) Obesidad mórbida con IMC mayor o igual de 25 en adolescentes o igual o más de 2DS en la infancia.
- D) Enfermedad celiaca.

18.-Según la Agencia Europea del Medicamento todas las siguientes patologías tienen indicación de tratamiento con hormona de crecimiento EXCEPTO:

- A) La baja talla idiopática.
- B) Déficit de Hormona de Crecimiento.
- C) Pequeño para la edad gestacional.
- D) Síndrome de Turner.

19.- Neonato de 3 días de vida que presenta secreción purulenta en ambos ojos muy abundante acompañada de edema palpebral y quemosis importante. ¿Cuál sería la causa más probable?

- A) Conjuntivitis por *Chlamydia trachomatis*.
- B) Conjuntivitis por *Neisseria gonorrhoeae*.
- C) Conjuntivitis química.
- D) Conjuntivitis por *Haemophilus influenzae*.

20.- ¿Qué microorganismos son más prevalentes en infecciones cutáneas en niños?

- A) *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*.
- B) *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus agalactiae*.
- C) Hongos y virus.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

21.- De las siguientes afirmaciones señale la opción INCORRECTA:

- A) Al RN hijo de madre con Ag Hbs + se le administrará en las primeras 12 horas de vida la vacuna frente a la hepatitis B IM en un muslo y una dosis de gammaglobulina anti-VHB IM en el muslo contralateral.
- B) Se deben utilizar antisépticos en la cura del cordón umbilical de forma rutinaria.
- C) No se debe retirar inmediatamente la lactancia materna ante infecciones maternas o necesidad de administración de medicamentos sin revisar previamente la evidencia científica al respecto.
- D) Es necesario realizar una valoración psicosocial posnatal en todos los casos de sospecha o certeza de consumo prenatal de sustancias de abuso.

22.- Uno de los siguientes hallazgos es altamente sugestivo del Síndrome del Lactante Zarandeado:

- A) Hemorragia vítrea.
- B) Hemorragias retinianas.
- C) Leucocoria.
- D) Hemorragias conjuntivales.

23.- El cociente entre el número de casos nuevos de una enfermedad ocurridos durante un periodo de tiempo y la suma de todos los tiempos individuales de observación, se denomina:

- A) Prevalencia.
- B) Prevalencia acumulada.
- C) Incidencia acumulada.
- D) Densidad de incidencia.

24.- En cuanto al cribado de la escoliosis del adolescente en la consulta de Atención Primaria, señale la respuesta FALSA:

- A) El grupo Previnfad considera que los riesgos del cribado son mayores que los beneficios y sugiere no realizarlo de forma sistemática.
- B) El test de cribado más empleado en Atención Primaria es el test de Adams.
- C) La prevalencia es similar en niñas y niños en curvas de alrededor de 10°, pero en mayores de 30°, la relación varón/mujer cambia a 10:1.
- D) Los programas de cribado diagnostican gran cantidad de curvas leves.

25.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al nirsevimab administrado para la prevención de la bronquiolitis es correcta?

- A) Es un anticuerpo monoclonal humano de inmunoglobulina G1 kappa (IgG1κ) producido en células de ovario de hámster chino.

- B) La dosis recomendada es una dosis única de 50 mg administrados vía intramuscular para lactantes con peso corporal <10 kg.
- C) Se administra vía subcutánea.
- D) Interfiere en la respuesta inmune activa de las vacunas coadministradas, por lo tanto hay que separar su administración del resto de las vacunas.

26.- ¿Cuál es el trastorno hemorrágico hereditario más común?

- A) Enfermedad de Von Willebrand.
- B) Hemofilia. B
- C) Hemofilia. C
- D) Púrpura.

27.- Es fundamental que los niños y sus familias reciban educación exhaustiva sobre la anafilaxia, y esto incluye todo EXCEPTO:

- A) Limitar la vida escolar y de ocio del niño.
- B) La identificación de los alérgenos desencadenantes, los signos y síntomas de una reacción alérgica.
- C) Aprender a utilizar un autoinyector de adrenalina en caso de emergencia.
- D) Un plan personalizado para el colegio con instrucciones claras sobre cómo reconocer los signos de una reacción alérgica, cuándo y cómo administrar la adrenalina, y los pasos a seguir en caso de emergencia.

28.- La incidencia en expuestos dividido por la incidencia en no expuestos se llama:

- A) Razón de prevalencias.
- B) Riesgo atribuible.
- C) Riesgo relativo.
- D) Riesgo absoluto.

29.- La sensibilidad de una prueba diagnóstica mide:

- A) La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo de la prueba diagnóstica.
- B) La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado positivo de la prueba diagnóstica.
- C) La proporción de pacientes que se someten a la prueba que tienen la enfermedad.
- D) La proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica.

30.- Ante una rinitis crónica, NO deberíamos considerar como una posible patología subyacente:

- A) Infección por Enterovirus.
- B) Fibrosis quística.
- C) Discinesia ciliar.
- D) Desviación del tabique.

31.- ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA?

- A) Eritema infeccioso o quinta enfermedad – Parvovirus B19.

- B) Exantema súbito o sexta enfermedad – Exantema aparece antes que la fiebre.
- C) Sarampión – Manchas de Koplik.
- D) Rubeola – Exantema maculopapuloso descendente.

32.- ¿Cuál de estas enfermedades es de declaración obligatoria urgente en Aragón?

- A) Gripe. A
- B) Hepatitis. B
- C) Tosferina.
- D) Sarampión.

33.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los fármacos intravenosos (iv) utilizados en reanimación cardiopulmonar (RCP) pediátrica?

- A) La amiodarona es el fármaco de elección en RCP.
- B) La dosis de amiodarona administrada es 0,1 ml/kg de la dilución 1:10000 iv.
- C) La adrenalina es el fármaco de elección en RCP.
- D) La dosis máxima de adrenalina a administrar es 10 mg iv.

34.- En cuanto a las Espondilolistesis, ¿cuál es INCORRECTA?

- A) 90 % de los casos son sintomáticas.
- B) Son más frecuentes en L4 o L5.
- C) Hay un defecto de osificación en la pars interarticularis.
- D) Nunca se dan antes de iniciar la marcha.

35.- Respecto a los factores de riesgo de sufrir el síndrome de la muerte súbita del lactante, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) El género masculino tiene más riesgo.
- B) Es más frecuente en los meses cálidos.
- C) Tienen más riesgo los lactantes que han tenido exposición al tabaco prenatal y postnatal.
- D) El estrés térmico es un factor de riesgo extrínseco.

36.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las características de la cefalea tensional:

- A) Es bilateral y de intensidad leve-moderada.
- B) Es pulsátil.
- C) No empeora con la actividad física.
- D) Generalmente está asociada a desencadenantes de tipo psicógeno (estrés).

37.- Ante un niño de 8 años con hematuria de reciente aparición, indique la respuesta correcta:

- A) El tratamiento con metronidazol puede dar lugar a una falsa hematuria de color negro o marrón oscuro.
- B) La proteinuria asociada es frecuente en la hematuria extraglomerular.
- C) La hematuria es uniforme a lo largo de toda la micción en las hematurias extraglomerulares.
- D) En la hematuria glomerular el volumen corpuscular medio (VCM) del hematíe en orina está aumentado.

38.- Según el IRASPROA, respecto al tratamiento de la neumonía típica adquirida en la comunidad en niño mayor de 3 meses, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) La dosis máxima de amoxicilina es 4g/día.
- B) En niños no vacunados frente a H. influenzae el tratamiento de elección es amoxicilina-clavulánico.
- C) Si alergia IgE mediada a amoxicilina el tratamiento de elección es cefuroxima.
- D) Si alergia inmediata a amoxicilina el tratamiento de elección es azitromicina.

39.- Todas las siguientes son características del angioedema EXCEPTO:

- A) Puede simular un abdomen agudo.
- B) Afecta a la dermis profunda y tejido celular subcutáneo.
- C) El ibuprofeno puede desencadenar un episodio agudo de angioedema palpebral.
- D) El angioedema hereditario puede cursar con aumento de niveles del C1 inhibidor.

40.- Indique la respuesta INCORRECTA en relación a las pruebas de imagen en la ITU:

- A) Primer episodio de ITU afebril en lactante <6 meses pedir ecografía.
- B) Ante ITU recurrente pedir ecografía.
- C) Ante ITU febril con antecedentes familiares de reflujo vesicoureteral sería recomendable realizar cistografía.
- D) Cuando se sospecha afectación renal, la gammagrafía renal DMSA se considera la técnica gold standard.

41.- Con respecto a las intoxicaciones medicamentosas en niños, indique la respuesta correcta:

- A) Es importante inducir el vómito para disminuir el contenido gástrico del tóxico lo antes posible.
- B) El carbón activado no es útil en las intoxicaciones causadas por litio y hierro.
- C) El carbón activado se puede mezclar con leche o yogur para mejorar su palatabilidad.
- D) El lavado gástrico no es útil pasadas 4 horas tras la intoxicación por antidepresivos tricíclicos.

42.- ¿Cuál de los siguientes cuestionarios es usado en Atención Primaria para valorar el desarrollo psicomotor y afectivo en todas sus áreas?

- A) Test de Denver II.
- B) Test de Conners.
- C) Test M-Chat.
- D) Test de Jack.

43.- En relación con la displasia de caderas señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La displasia de cadera es la alteración congénita más frecuente en el RN.
- B) La displasia de cadera es la causa más frecuente para implantar una prótesis de cadera en el adulto joven.
- C) La inestabilidad de cadera (maniobras de Barlow y Ortolani) y la dificultad para la abducción son los hallazgos más importantes en la exploración física.
- D) la radiografía simple de caderas es la prueba de elección en menores de 4 meses.

44.- Respecto al uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia señale la respuesta CORRECTA:

- A) La elección del método anticonceptivo debe ser en función de la preferencia del profesional.
- B) Entre los adolescentes hay un buen cumplimiento y una buena adherencia a los métodos anticonceptivos.
- C) Los anticonceptivos hormonales combinados presentan el inconveniente de patrones de sangrado irregulares.
- D) Los métodos naturales no son recomendables en adolescentes.

45.- ¿Cuál de los siguientes NO se considera un criterio de causalidad?

- A) Magnitud de la asociación.
- B) Plausibilidad biológica.
- C) Consistencia.
- D) Impacto en la población.

46.- Señale cuál de las siguientes enfermedades víricas es causa de exclusión escolar:

- A) Eritema infeccioso.
- B) Exantema súbito.
- C) Síndrome de mano, pie y boca.
- D) Sarampión al inicio del exantema.

47.- Cuando hablamos de tos recurrente nos referimos a:

- A) Tos de dos semanas de evolución después de una infección de vías altas.
- B) Tos de 8 semanas de evolución.
- C) Cuando la tos dura más de tres semanas.
- D) Episodios de tos con frecuencia superior a la esperada para su edad y una duración superior a las dos semanas en ausencia de infección respiratoria.

48.- ¿Cuándo sospecharía de un problema de hipoacusia en un lactante?

- A) Ausencia de reflejo palpebral en el primer mes.
- B) Al mes de vida no reconoce la voz de sus padres.
- C) A los 2 meses no es capaz de girar la cabeza hacia los sonidos.
- D) A los 18 meses no puede localizar sonidos.

49.- Indique el vector más probable en Enfermedad de Lyme:

- A) *Rhicephalus sanguineus*.
- B) *Ixodes ricinus*.
- C) *Hyalomma marginatum*
- D) *Dermacentor marginatus*.

50.- ¿Cuál es un indicador de calidad de prescripción de medicamentos?

- A) Prescripción de medicamentos innecesarios.
- B) Cambio frecuente de médico por parte del paciente.
- C) Ausencia de efectos secundarios en el paciente.
- D) Popularidad del medicamento entre los médicos.

51.- Es típico de la fractura en rodete de los niños todo lo siguiente, EXCEPTO:

- A) Afecta frecuentemente al radio.
- B) El mecanismo típico es la caída al suelo con apoyo de la palma de la mano.
- C) Radiológicamente, se aprecia un engrosamiento anular similar a un rodete en el lugar de la fractura.
- D) Son fracturas inestables por lo que precisan inmovilización al menos 4 semanas.

52.- En el tratamiento de la agitación asociada a psicosis, utilizaríamos como primera elección:

- A) Antihistamínicos.
- B) Antieméticos.
- C) Benzodiazepinas.
- D) Neurolépticos.

53.- ¿Cuál de los siguientes soplos se considera patológico?

- A) Sopro vibratorio de Still.
- B) Sopro continuo.
- C) Sopro sistólico en foco pulmonar.
- D) Sopro carotideo.

54.- Indique la respuesta FALSA sobre la Acrodermatitis Papulosa infantil o Síndrome de Gianotti-Crosti:

- A) Se caracteriza por la presencia de pápulas o papulovesículas pequeñas.
- B) Puede afectar a palmas y plantas.
- C) Es más frecuente en adolescentes.
- D) Su distribución es frecuentemente acral, simétrica, afectando a cara, glúteos y extremidades.

55.- Con respecto al Programa de salud Bucodental en Aragón, señale el enunciado INCORRECTO:

- A) Se conoce por sus siglas PABIJ: Programa de Atención Bucodental Infanto-Juvenil.
- B) Se distinguen dos modalidades de prestación: General Continuo y General Discontinuo.
- C) Si el niño no ha utilizado el programa en los 12 meses anteriores a la fecha en que se produce la petición de atención bucodental, su atención corresponderá a la Unidad de Salud Bucodental correspondiente del SALUD.
- D) Pueden acceder al programa los niños sin discapacidad entre 6 y 14 años siempre que se cumplan los 6 años o los 14 años durante el año en curso.

56.- Respecto a la talla baja familiar (TBF) y el retraso constitucional del crecimiento (RCC), cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- A) Ambas se consideran variantes de la normalidad.
- B) En ambas la velocidad de crecimiento suele ser baja.
- C) La talla final en ambas suele ser baja.
- D) La edad ósea en la TBF suele estar retrasada.

57.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la parada cardiorrespiratoria (PCR) en pediatría?

- A) La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea.
- B) La parada cardíaca (PC) más común en Pediatría es la de origen respiratorio y habitualmente cursará con un deterioro previo y progresivo de las funciones respiratorias y circulatorias.
- C) Las PC súbitas o de origen cardíaco y con ritmos desfibrilables son más frecuentes en lactantes que en adolescentes.
- D) El fallo cardíaco primario como causa de PC pediátrica puede ser consecuencia de arritmias cardíacas, descompensación de cardiopatías congénitas y postoperatorias de cirugía cardiovascular.

58.- Paciente de 12 meses diagnosticado de neumonía LID. Como antecedente destaca que el paciente no ha recibido ninguna vacuna por decisión de los padres. Señale la opción terapéutica correcta:

- A) Tratamiento con amoxicilina VO a 90 mg/kg cada 8 h durante 7 días.
- B) Cefuroxima VO a 30-40 mg/kg/día cada 12 h durante 10 días.
- C) Amoxicilina-clavulánico VO a 90 mg/kg/día cada 8 h durante 7 días.
- D) Azitromicina VO a 10 mg/kg/día cada 24 h durante 3 días.

59.- ¿Cuál de estas patologías produce hiperpigmentación cutánea en los niños?

- A) Fenilcetonuria.
- B) Síndrome de Albright.
- C) Enfermedad de Chediak- Higashi.
- D) Esclerosis tuberosa.

60.- ¿Qué afirmación es FALSA respecto al tratamiento de la tos?

- A) No es necesaria la utilización sistemática de fármacos en los cuadros de tos leve.
- B) Mantener la vía nasal desobstruida mediante lavados nasales con suero fisiológico.
- C) Los fármacos antitusivos reportan grandes beneficios.
- D) La Cloperastina actúa a nivel central.

61.- En cuanto a la psicosis en niños, uno de los siguientes NO sería síntoma guía:

- A) Alucinaciones sistematizadas.
- B) Déficit de atención.
- C) Agitación
- D) Alucinaciones complejas.

62.- ¿Cuál de los siguientes fármacos presenta un riesgo bajo para la Lactancia Materna?

- A) Metotrexato.
- B) Metamizol.
- C) Amiodarona.
- D) Metilfenidato.

63.- Según el protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 g o menor de 32 semanas de gestación, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es INCORRECTA?

- A) Para la evaluación del crecimiento tras el alta se recomienda el uso de las curvas de Fenton revisadas hasta las 44 semanas de edad corregida (EC) y posteriormente las curvas de la OMS de acuerdo con la EC.
- B) Se recomienda que los niños de bajo peso para la edad gestacional que a los 2-3 años tengan una talla por debajo de 2 desviaciones estándar en las gráficas de la OMS se remitan al endocrinólogo para completar el estudio y valorar el tratamiento con hormona de crecimiento.
- C) Se recomienda que se alimenten con leche materna suplementada con fortificantes en alguna toma o bien sustituir alguna toma por fórmula de prematuros (siempre después de haber verificado que la técnica de lactancia materna es correcta).
- D) Todos los niños <1500 g o <32 semanas de gestación tienen un riesgo incrementado de alteraciones motoras, por tanto, se recomienda remitirlos a Atención Temprana porque con los programas de intervención precoz se ha mostrado mejoría tanto en la función cognitiva como motora.

64.- ¿Es necesaria la biopsia intestinal para el diagnóstico de enfermedad celiaca en un paciente de 6 años con clínica compatible?

- A) Sí, siempre es necesaria antes de retirar el gluten de la dieta.
- B) No, con valores de AATG-IgA $\geq 10 \times \text{LSN}$ y unos AAE-Ig A positivos.
- C) Sí, cuando HLA-DQ2 y/o DQ8 son negativos.
- D) Sí, para confirmar el diagnóstico y 6 meses después de una dieta exenta de gluten.

65.- Con respecto a la actual Cartera de Servicios de Atención Primaria de Aragón, es cierto que:

- A) En 2008 se incorporaron en el catálogo de prestaciones farmacéuticas los absorbentes de incontinencia urinaria aptos para niños con discapacidad.
- B) No incluye la atención telefónica con los distintos profesionales del equipo de atención primaria.
- C) No se contemplan actividades dirigidas a la detección e intervención en situaciones de maltrato a ancianos y discapacitados.
- D) Incluye tratamientos reparadores en dentición temporal.

66.- En relación con el cáncer en la edad pediátrica señale la opción INCORRECTA:

- A) Los tumores primarios del SNC son los segundos más frecuentes en la infancia.
- B) El 6% de los casos de fiebre de origen desconocido corresponden a neoplasias.
- C) Las masas mediastínicas son poco frecuentes y suelen ser de naturaleza maligna.
- D) La leucocoria es un signo patognomónico de retinoblastoma.

67.- Para diagnosticar y graduar el RVU utilizamos la CUMS (cistouretrografía miccional seriada) y lo estratificamos en grados según la clasificación del International Reflux Study Committee. Señale el grado NO adecuadamente descrito:

- A) Grado I: Sólo llega al uréter sin dilatarlo.
- B) Grado II: Alcanza uréter, pelvis y cálices sin dilatarlo.
- C) Grado III: Produce dilatación de uréter, pelvis y cálices.
- D) Grado IV: Gran dilatación ureteropielocalicilial. Las impresiones papilares no se visualizan.

68.- ¿Cuál es la causa más frecuente de talla baja?

- A) La baja talla familiar.

- B) Retraso constitucional del crecimiento.
- C) Baja talla idiopática.
- D) Déficit de Hormona de Crecimiento.

69.- Se han descrito como factores de riesgo de parálisis cerebral infantil todas EXCEPTO:

- A) Peso bajo al nacer.
- B) Prematuridad.
- C) Madre de 17 años.
- D) Tecnología de reproducción asistida.

70.- Señale cuál de las siguiente NO se considera una posible causa de estreñimiento crónico:

- A) Parálisis cerebral.
- B) Hipertiroidismo.
- C) Enfermedad celiaca.
- D) Tratamiento con Metilfenidato.

71.- Según la Guía de Detección e Intervención en situaciones de Maltrato Infantil desde el Sistema de Salud de Aragón, señale el enunciado INCORRECTO:

- A) El síndrome de Münchausen por poderes está incluido dentro del Maltrato Psicológico.
- B) El absentismo escolar injustificado y prolongado se cataloga como un tipo de negligencia física.
- C) Negligencia emocional: Situar al niño como instrumento en las relaciones familiares conflictivas.
- D) La incapacidad parental de control de la conducta infantil/adolescente es una situación que se produce cada vez con más frecuencia.

72.- En una niña de 7 años que presenta dolor en cuadrante abdominal inferior derecho de dos días de evolución y fiebre 38,5 °C, señale cuál de los siguientes cuadros NO formaría parte del diagnóstico diferencial inicial:

- A) Infección urinaria.
- B) Neumonía.
- C) Invaginación intestinal.
- D) Apendicitis aguda.

73.- Señale la opción VERDADERA respecto a las recomendaciones del grupo Previnfad:

- A) Se recomienda que el profesional de atención primaria ofrezca consejo sobre el uso de sistemas de retención infantil y el uso de casco en bicicletas y ciclomotores, en las visitas de salud y otras ocasiones propicias.
- B) Las campañas de ámbito comunitario no han demostrado eficacia.
- C) En los controles de salud del primer año de vida debe aconsejarse el uso de andadores.
- D) Se recomendarán suplementos de flúor por vía oral a partir de los 2 años.

74.- El agente causal más frecuente de la osteomielitis aguda en nuestro medio es:

- A) *Salmonella sp.*
- B) *Staphylococcus aureus.*

- C) *Streptococcus pyogenes*.
- D) *Kingella kingae*.

75.- Respecto al Eritema Nodoso señale el enunciado FALSO:

- A) Puede asociarse con artralgias.
- B) Es la paniculitis aguda más frecuente.
- C) Puede ser secundaria a infección tuberculosa latente.
- D) El tratamiento de elección son los corticoides sistémicos.

76.- Entre las siguientes, ¿cuál es la causa más común de ictericia neonatal?

- A) Infecciones neonatales.
- B) Traumatismos obstétricos.
- C) Hiperbilirrubinemia.
- D) Trastorno alimentación.

77.- Señale la respuesta FALSA respecto al manejo del frenillo lingual:

- A) Cuando este frenillo es corto y limitante se conoce como anquiloglosia.
- B) El método de Hazelbaker sirve para la evaluación de la función del frenillo lingual.
- C) El motivo más frecuente de abandono de la Lactancia Materna es la presencia de frenillo lingual.
- D) El frenillo tipo 4, según la clasificación morfológica de Coryllos y Kotlowno, no es visible, pero si palpable al estar submucoso y tiene un anclaje fibroso desde la base de la lengua hasta el suelo de la boca.

78.- De las siguientes, señale la enfermedad crónica más frecuente en la población pediátrica:

- A) Diabetes Mellitus.
- B) Asma.
- C) Enfermedad celiaca.
- D) Epilepsia.

79.- Recién nacido varón de 4 días acude a la primera visita del centro de salud. La pediatra observa un mayor vello en su espalda y un foco de fino hundimiento en la piel (fosita pilonidal), reflejos del recién nacido presentes y simétricos. ¿Cuál es la actuación más adecuada?

- A) Es normal, no hay que hacer nada.
- B) Solicitar una ecografía urgente por sospecha de espina bífida oculta y explicar y tranquilizar a los padres.
- C) Solicitar una ecografía normal por sospecha de disrafia espinal y explicar y tranquilizar a los padres.
- D) Solicitar una RNM normal por sospecha de espina bífida oculta y explicar y tranquilizar a los padres.

80.- Dentro de la competencia profesional hemos de considerar los siguientes aspectos, EXCEPTO uno de los siguientes:

- A) Conocimientos médicos.
- B) Habilidades de comunicación.

- C) Manejo de técnicas de exploración.
- D) Realización de pruebas complementarias.

81.- En un recién nacido prematuro con leucomalacia periventricular grado 3, los hallazgos esperables en una ecografía transfontanelar son:

- A) Ausencia de lesiones quísticas.
- B) Lesiones quísticas que se extienden a la región periventricular fronto-parietal.
- C) Lesiones quísticas que se extienden a región córtico-subcortical.
- D) Lesiones quísticas localizadas en ángulo externo del ventrículo lateral.

82.- Indique de los siguientes alimentos cuál es más rico en calcio si consumimos 100 gr:

- A) Leche de vaca
- B) Leche oveja
- C) Higos secos
- D) Almendras

83.- En relación con TDAH señale la opción correcta:

- A) El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo con una prevalencia del 3% en edad escolar.
- B) Los pacientes con TDAH presentan una anomalía en el funcionamiento de los neurotransmisores a nivel frontal, ganglios de la base y cerebelo.
- C) La dificultad para el control de las emociones se incluye dentro de los criterios diagnósticos.
- D) El tratamiento siempre es farmacológico.

84.- En relación con la faringoamigdalitis en niños, señale la opción correcta:

- A) La etiología más frecuente es la bacteriana
- B) Si el paciente cumple tres o más criterios del score clínico Centor no hace falta hacer test de diagnóstico rápido.
- C) El *streptococo pyogenes* es el agente causal más frecuente en menores de tres años.
- D) Si el test de diagnóstico rápido es positivo el tratamiento de elección es penicilina V.

85.- Respecto a los dientes neonatales indique la afirmación FALSA:

- A) Suelen ser incisivos centrales inferiores.
- B) Se extraen si existe riesgo de aspiración.
- C) Están presentes en el momento del nacimiento.
- D) Tienen una escasa raíz.

86.- Llega a su consulta con cita indemorable, un niño de 3 años con dolor intenso de inicio súbito en uno de sus testículos. La palpación es muy dolorosa y a la exploración destaca edema escrotal unilateral, reflejo cremásterico ausente y signo de Prehn negativo. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica?:

- A) Orquitis.
- B) Traumatismo testicular.
- C) Torsión testicular unilateral.
- D) Epididimitis.

87.- De las siguientes afirmaciones señale la opción INCORRECTA:

- A) La marcha en intratorsión puede deberse a una anteversión femoral persistente, a una torsión tibial interna o a un metatarso aducto.
- B) La maniobra de Ortolani y Barlow para la exploración de la cadera tienen valor a partir de los 6 meses.
- C) El hallazgo que define la escoliosis en la exploración física es la existencia de una giba en la prueba de Adams.
- D) En la evaluación del pie plano es fundamental explorar la flexibilidad comprobando la aparición de arco plantar al realizar la prueba de Jack.

88.- ¿Cuál de los siguientes NO es un signo de alarma en el desarrollo psicomotor del lactante?

- A) Ausencia de sostén cefálico a los 3 meses de vida.
- B) Pulgar en aducción en mayores 2 meses de vida.
- C) No dice ninguna palabra a los 16 meses de vida.
- D) Ausencia de reacción de Moro a los 6 meses de vida.

89.- Respecto al Síndrome de Klinefelter, señale la respuesta correcta:

- A) Es menos frecuente que el Síndrome de Turner.
- B) La mitad de los casos presentan ginecomastia a partir de la pubertad.
- C) Es debido a un cromosoma Y añadido (47 XYY).
- D) Es la causa más frecuente de hipogonadismo hipogonadotrópico.

90.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) La proporción es un cociente donde el numerador está incluido en el denominador y expresa la probabilidad de que un suceso ocurra.
- B) La razón es un cociente donde el numerador no está incluido en el denominador.
- C) La tasa es un cociente que lleva incorporado en el denominador la variable de tiempo.
- D) Un tipo especial de proporción es la Odds.

91.- ¿En cuál de los siguientes casos solicitaría una radiografía de tórax?

- A) Niño sano de 3 años con un resultado de Mantoux de 12 mm.
- B) Residente de pediatría sano a quien le acaba de toser sangre un enfermo tuberculoso.
- C) Niño de 6 años asintomático, con antecedente de asma controlada y en tratamiento con bajas dosis de corticoides inhalados, que estaba en la misma clase en la que otro niño acaba de ser diagnosticado de tuberculosis.
- D) Niño de 3 años asintomático, procedente de Camerún, con prueba de tuberculina negativa.

92.- ¿Qué criterio diagnóstico sobre Hipertensión Arterial en pediatría es FALSO?

- A) Pacientes de 1 a 13 años con TAD y/o TAS mayor o igual de p90.
- B) Pacientes de 1 a 13 años con TAD y/o TAS mayor o igual a 110/70 mmHg.
- C) Pacientes de más de 13 años con TA 120/<80 mmHg.
- D) Se deben confirmar las cifras para sexo, edad y talla en 3 visitas.

93.- Respecto al síndrome de Down ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) La valvulopatía más frecuente que puede presentar es la regurgitación aórtica.
- B) La cardiopatía congénita más frecuente que puede presentar es el canal auriculo-ventricular completo.
- C) Casi la mitad de los recién nacidos con S. Down pueden presentar una cardiopatía congénita.
- D) Los adolescentes y adultos jóvenes sin antecedentes de cardiopatía estructural pueden desarrollar una valvulopatía.

94.- Respecto a la pubertad precoz, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) Es la aparición de caracteres sexuales secundarios 2 DE antes de las edades de referencia para una población determinada.
- B) Es 2 veces más frecuente en chicas que chicos.
- C) El bajo peso al nacer seguido de recuperación postnatal rápida y marcada en niñas es un factor de riesgo para desarrollar una pubertad adelantada rápidamente progresiva.
- D) El hamartoma hipotalámico puede ser una de sus causas.

95.- Acude a nuestra consulta una paciente adolescente con sospecha de anorexia nerviosa. De los siguientes síntomas, señale el que NO nos haría pensar en esta entidad:

- A) Realización de dieta hipocalórica.
- B) Periodos de semiayuno alternados con ingesta normal.
- C) Miedo exagerado al sobrepeso o a la ganancia ponderal.
- D) Aceptación de la propia imagen corporal.

96.- ¿Qué se entiende por trastornos del sueño?

- A) Problemas para controlar esfínteres durante la noche.
- B) Dificultad en el aprendizaje.
- C) Alteraciones en el patrón del sueño.
- D) Tics involuntarios nocturnos.

97.- ¿Cuál es la causa de anemia de origen central congénita cuantitativa con afectación exclusiva de la serie eritroide?

- A) Hemoglobinuria paroxística nocturna.
- B) Enfermedad Blackfan-Diamond.
- C) Eritroblastopenia transitoria de la infancia.
- D) Idiopática.

98.- Respecto a la vacuna Nimenrix© señale la opción FALSA:

- A) El polisacárido de *Neisseria meningitidis* de los grupos A, C, W-135 e Y se conjuga con toxoide tetánico como proteína transportadora.
- B) En la primovacunación en lactantes mayores de 6 semanas y menores de 6 meses se deben administrar 2 dosis separadas con un intervalo de 2 meses entre dosis.
- C) En personas con trombocitopenia la administración es intradérmica.
- D) Sólo una dosis para la primovacunación en lactantes mayores de 6 meses.

99.- ¿Cuál de estas enfermedades NO es de declaración obligatoria en Aragón?

- A) Gripe B.
- B) Parotiditis.
- C) Poliomiелitis.
- D) Adenovirus.

100.- ¿Cuál NO es un factor de riesgo en el embarazo para tener un defecto en cierre del tubo neural?

- A) Ingesta de valproato 300mg /día durante el embarazo.
- B) Obesidad en la madre.
- C) Diabetes mal controlada de la madre.
- D) Suplementos de ácido fólico.

101.- Señale el enunciado FALSO respecto a los condilomas acuminados:

- A) El preservativo ofrece protección total
- B) La infección por VPH (virus papiloma humano) es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo.
- C) El diagnóstico es básicamente clínico
- D) Son lesiones papulosas de coloración variada

102.- Con respecto al absceso retrofaríngeo en la infancia, señale la afirmación correcta:

- A) Es más frecuente en lactantes.
- B) Se forma en la pared anterior del esófago y el borde anterior de los cuerpos vertebrales.
- C) Se observa una protuberancia en la pared faríngea anterior.
- D) La Rx de un absceso retrofaríngeo pone de manifiesto disminución en la anchura de los tejidos blandos de delante de los cuerpos cervicales C1-C4 con aumento de la lordosis cervical.

103.- Uno de los siguientes aspectos terapéuticos NO es útil en el cuidado del acné vulgar:

- A) Hay que evitar la excesiva exposición al sol.
- B) Eliminar alimentos del tipo de chocolate, golosinas, y mariscos.
- C) El peróxido de benzoilo puede decolorar el pelo y la ropa.
- D) No se recomienda el uso de antibióticos tópicos en monoterapia.

104.- En relación al síndrome del lactante zarandeado (SLZ), señale la respuesta correcta:

- A) No es posible prevenir estas situaciones.
- B) El sexo femenino o las familias numerosas suponen un factor de riesgo intrínseco de padecer dicho síndrome.
- C) Las hemorragias retinianas son patognomónicas de este tipo de traumatismo.
- D) El motivo más frecuente es un llanto inconsolable y prolongado que provoca la frustración y el enfado del cuidador.

105.- En un lactante entre 3-36 meses con fiebre hasta 39,2º, sin focalidad aparente y aspecto no tóxico, ¿qué afirmación es FALSA?

- A) Los lactantes inmunizados contra neumococo y *Haemophilus influenza b* tienen menor riesgo de bacteriemia oculta.
- B) El riesgo no difiere en función del estrato social.
- C) La utilización de Amoxicilina es eficaz para la prevención de la meningitis.
- D) La respuesta a los antitérmicos no es indicativo de mayor riesgo de bacteriemia oculta.

106.- Señale el enunciado FALSO respecto al consumo de sustancias tóxicas en los adolescentes:

- A) La relación con amigos consumidores de sustancias tóxicas es uno de los factores de riesgo más significativos para el inicio de su consumo.
- B) El cerebro del adolescente se encuentra en proceso de maduración y desarrollo lo que le hace más vulnerable a los efectos neurotóxicos y adictivos de las sustancias tóxicas.
- C) La presencia de comorbilidad psiquiátrica incrementa la probabilidad del consumo.
- D) La presencia de consumo de sustancias tóxicas en el ámbito familiar no es un factor de riesgo. En la adolescencia la influencia queda limitada al grupo de iguales.

107.- Según Previnfad, señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la prevención de accidentes de tráfico en la infancia y adolescencia:

- A) En la consulta de atención primaria la actuación se centrará en el consejo preventivo durante las visitas de salud o en otras ocasiones propicias, tales como la asistencia a niños accidentados.
- B) Se recomienda que el profesional de atención primaria ofrezca consejo sobre el uso de sistemas de retención infantil y el uso de casco en bicicletas y ciclomotores.
- C) Existe suficiente evidencia sobre la eficacia del consejo breve en la consulta sobre educación vial, seguridad del niño y adolescente como conductor, del niño como pasajero de motocicleta y sobre transporte escolar.
- D) Las campañas de ámbito comunitario han demostrado eficacia.

108.- ¿Qué son los equivalentes terapéuticos?

- A) Medicamentos con distintos principios activos pero mismo efecto terapéutico.
- B) Medicamentos genéricos más baratos que los de marca.
- C) Medicamentos que deben evitarse en pacientes pediátricos.
- D) Medicamentos sin eficacia comprobada en estudios clínicos.

109.- ¿Qué es la fobia escolar?

- A) Una dificultad en el control de esfínteres en la escuela.
- B) Un trastorno del desarrollo.
- C) Una aversión irracional a la escuela.
- D) Un trastorno del sueño por problemas escolares.

110.- Ante ictericia de aparición tardía NO deberíamos pensar:

- A) Galactosemia.
- B) Incompatibilidad Rh.
- C) Atresia de vías biliares.
- D) Enfermedad de Gilbert.