

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Convocado por Resoluciones de 3 de abril y de 25 de julio de 2025 de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud

CATEGORÍA:

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 10, ambas incluidas.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

- 1 ¿Cuál es la clasificación internacional diseñada específicamente para Atención Primaria?
 - A: CIE-10-ES.
 - B: CIAP-2.
 - C: DSM-V.
 - D: ICD-O.
- 2 ¿Cuál es el orden correcto de las etapas para diseñar un programa de calidad?
 - A: Diagnóstico inicial – seleccionar indicadores – definir objetivos – idear plan de acción – implantar y seguir el plan – comunicación y participación.
 - B: Diagnóstico inicial – definir objetivos – idear plan de acción – seleccionar indicadores – implantar y seguir el plan – comunicación y participación.
 - C: Diagnóstico inicial – definir objetivos – idear plan de acción – implantar y seguir el plan – seleccionar indicadores – comunicación y participación.
 - D: Diagnóstico inicial – definir objetivos – seleccionar indicadores – idear plan de acción – implantar y seguir el plan – comunicación y participación.
- 3 Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos deberán aplicar las siguientes medidas. Indique la INCORRECTA:
 - A: Principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva.
 - B: Motivar su necesidad para la protección del interés privado.
 - C: Justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen.
 - D: Deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
- 4 ¿Qué garantías otorga la Constitución Española al derecho de protección de la salud, recogidas en el art. 53 de la Constitución Española?
 - A: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela del derecho a la protección de la salud ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
 - B: El derecho de protección de la salud sólo podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.
 - C: El derecho de protección de la salud vincula a todos los poderes públicos.
 - D: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela del derecho a la protección de la salud a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- 5 ¿Qué funciones NO son de un Equipo de Atención Primaria?
 - A: Planificación del transporte sanitario.
 - B: Funcionamiento interno y soporte.
 - C: Docencia e investigación.
 - D: Promoción de la salud.

- 6 ¿Qué buscador de información científica en Inteligencia Artificial NO está disponible en Bibliosalud para los profesionales sanitarios de Aragón?
- A: CONSENSUS.
 - B: ELICIT.
 - C: CHATGPT.
 - D: PERPLEXITY.
- 7 Según el artículo 5 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el titular del derecho a la información asistencial es:
- A: El paciente.
 - B: El paciente y sus familiares de primer grado.
 - C: El paciente y su representante legal.
 - D: El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
- 8 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con las definiciones de "género" y "sexo", se corresponde con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón?
- A: El "género" es una construcción social de roles y comportamientos, mientras que el "sexo" se refiere a las diferencias biológicas.
 - B: El "género" se refiere a las diferencias biológicas y el "sexo" es una construcción social de roles y comportamientos.
 - C: Ambos términos son sinónimos y se usan indistintamente en la ley.
 - D: El "género" es una clasificación gramatical y el "sexo" una condición orgánica.
- 9 ¿Qué organismo actúa como secretaria técnica del Proyecto GuíaSalud?
- A: Ministerio de Ciencias e Innovación.
 - B: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
 - C: Sociedad española de Medicina Interna.
 - D: Consejo general del Colegio de Médicos.
- 10 Respecto a los principios fundamentales de la bioética NO es cierto que:
- A: El principio de no maleficencia obliga a no hacer daño a las personas, es decir, a tratar con igual consideración y respeto a todas las personas en el orden físico.
 - B: El principio de beneficencia obliga a hacer el bien a las personas, procurándoles el mayor beneficio posible. La definición de lo que sea beneficioso lo establecerá el médico, que velará siempre por el paciente.
 - C: El principio de autonomía obliga a considerar que todas las personas son, en principio y mientras no se demuestre lo contrario, capaces de tomar decisiones respecto a la aceptación o rechazo de todo lo que afecte a su proyecto vital.
 - D: El principio de justicia obliga a tratar con igual consideración y respeto a todas las personas en el orden social y a no discriminarlas por ningún motivo, sino a establecer la igualdad de oportunidades.
- 11 ¿En qué grupo socioeconómico es más frecuente y grave la obesidad?
- A: En las rentas altas.
 - B: En las rentas medias.
 - C: En las personas con dificultades socioeconómicas.
 - D: En los menores de 25 años.

- 12 Sobre las pruebas cutáneas para el estudio de hipersensibilidad frente a un antígeno, señale la INCORRECTA:
- A: Las pruebas intradérmicas o intradermorreacción son más sensibles que las pruebas intraepidérmicas o prick test, pero arrojan un mayor porcentaje de falsos positivos.
 - B: Las pruebas epicutáneas en parche o del parche (patch test) son de elección para el diagnóstico de la hipersensibilidad por contacto.
 - C: Las pruebas de lectura inmediata valoran la respuesta inmediata al antígeno mediada por inmunoglobulina E (hipersensibilidad tipo I).
 - D: Las pruebas de lectura tardía valoran la respuesta retardada al antígeno mediada por células (hiperreactividad tipo VI).
- 13 En relación con el paciente dependiente del tabaco existen recursos de ayuda para la prevención y deshabituación tabáquica. Señale de entre las siguientes la INCORRECTA:
- A: Guía "Dejar de fumar" del Gobierno de Aragón.
 - B: Comité nacional para la prevención del tabaquismo.
 - C: Aplicación para dispositivos móviles "S'Acabó" de la Sociedad española de especialistas en tabaquismo.
 - D: Sociedad Española por un Humo Sano (SEHS).
- 14 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el principio de equidad en salud?
- A: Ofrecer los mismos servicios a toda la población, independientemente de sus necesidades.
 - B: Asegurar que todos los ciudadanos paguen la misma cantidad por los servicios sanitarios.
 - C: Priorizar la inversión sanitaria en zonas urbanas para maximizar la eficiencia del sistema.
 - D: Proporcionar atención sanitaria proporcional a las necesidades de salud de cada individuo o grupo.
- 15 En relación con las formas fulminantes de hepatitis vírica, todas las siguientes afirmaciones son correctas, EXCEPTO:
- A: La hepatitis B puede producir hepatitis fulminante, especialmente si se asocia al virus D.
 - B: La hepatitis E puede causar hepatitis fulminante, especialmente en mujeres embarazadas.
 - C: La hepatitis A puede ser fulminante en raros casos, sobre todo en mayores o con hepatopatía previa.
 - D: La hepatitis C es la causa más frecuente de hepatitis fulminante aguda en adultos inmunocompetentes.
- 16 ¿Cuál es la duración máxima en una situación de Incapacidad laboral transitoria según la Ley General de la Seguridad Social, incluyendo prórrogas?
- A: 365 días y una prórroga de 180 días si se presume recuperación.
 - B: 545 días, incluyendo una prórroga de 180 días si se presume recuperación.
 - C: 730 días.
 - D: 365 días sin posibilidad de prórrogas.
- 17 ¿Qué se conoce como prescripción en cascada?
- A: Prescribir varios medicamentos al mismo tiempo para tratar una única enfermedad.
 - B: Prescribir un medicamento genérico tras agotar el stock del medicamento de marca.
 - C: Prescribir un segundo medicamento para tratar un efecto adverso del primer medicamento, interpretando erróneamente el efecto adverso como un nuevo síntoma o enfermedad.
 - D: Prescribir un fármaco que actúa sobre dos o más sistemas orgánicos.

- 18** Varón de 68 años con EPOC moderada, dos agudizaciones leves el último año sin purulencia ni disnea marcada. Vacunado y con buen control clínico. Según el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), ¿cuál es la recomendación más adecuada?
- A: Profilaxis con macrólidos a baja dosis.
 - B: Sin antibiótico; reforzar medidas no farmacológicas (vacunación, abandono tabaco, ejercicio, educación).
 - C: Sustituir el tratamiento inhalado por un esquema combinado con antibiótico oral intermitente.
 - D: Moxifloxacino durante 5 días cada 8 semanas durante todo el año.
- 19** ¿Cuál de los siguientes pacientes con urticaria crónica debe ser derivado a Alergología?
- A: Paciente con urticaria de menos de 6 semanas de evolución.
 - B: Paciente con buena respuesta a antihistamínicos H1.
 - C: Paciente con angioedema recurrente sin causa identificable.
 - D: Paciente con urticaria inducida por estrés emocional.
- 20** Una paciente de 59 años con riesgo cardiovascular moderado aporta una analítica en la que aparece un colesterol LDL de 130 y le pregunta si sería suficiente con tomar un suplemento dietético en lugar de medicación para conseguir su objetivo de LDL. Su recomendación sería:
- A: Los fitoesteroles conseguirían la reducción que necesita.
 - B: La levadura de arroz rojo está limitada en la UE por seguridad.
 - C: Las guías recomiendan el uso de suplementos dietéticos para disminuir el riesgo cardiovascular de manera efectiva.
 - D: El omega-3 es eficaz reduciendo el colesterol LDL.
- 21** En un paciente con ERC G3b tratado con IECA y espironolactona, se detecta potasio de 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la actuación más adecuada en Atención Primaria?
- A: Suspender de inmediato todos los fármacos bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona (RAAS).
 - B: Mantener el tratamiento y reevaluar en un mes.
 - C: Revisar ingesta dietética, suspender diuréticos ahorradores de potasio y repetir control en 1 mes.
 - D: Derivar a urgencias por riesgo inmediato de arritmia.
- 22** Varón de 35 años, conviviente de un caso índice de hepatitis A confirmado. Último contacto estrecho hace 5 días. Sin vacunación previa frente a hepatitis A, ni antecedentes de inmunodepresión. ¿Cuál es la actuación más adecuada?
- A: Vigilancia de síntomas 4 semanas.
 - B: Administrar inmunoglobulina ahora; no precisa vacunación.
 - C: Administrar 1ª dosis de vacuna frente a hepatitis A ahora y programar 2ª dosis a partir de los 6 meses para protección a largo plazo.
 - D: Administrar vacuna combinada frente a hepatitis A y B con pauta 0-1-6 exclusivamente.
- 23** Respecto a las formas de transmisión de los distintos virus de la hepatitis, todas las siguientes afirmaciones son correctas, EXCEPTO:
- A: El virus de la hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal-oral, a través de agua o alimentos contaminados.
 - B: El virus de la hepatitis B se puede transmitir por vía parenteral, sexual y vertical (madre-hijo).
 - C: El virus de la hepatitis C se transmite con mayor frecuencia por vía parenteral, aunque también puede hacerlo por vía sexual o vertical.
 - D: El virus de la hepatitis E se transmite fundamentalmente por vía parenteral, siendo frecuente entre usuarios de drogas intravenosas.

- 24 De las siguientes afirmaciones sobre el parte de lesiones en el caso de violencia de género una de ellas es INCORRECTA:
- A: La emisión de un parte de lesiones en el caso de una mujer maltratada genera en Aragón, automáticamente, una notificación a la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en función del lugar donde haya tenido lugar la agresión a la mujer.
 - B: Si la víctima no deseara presentar denuncia, se le debe explicar que, aunque ella no desee presentar denuncia, es obligatorio para el personal sanitario remitir parte/ informe al Juzgado en caso de sospecha fundada o constatación de violencia.
 - C: Se entregará una copia a la mujer firmada por el médico y sellada, en todas las situaciones, informándole de que es conveniente acompañar el parte de lesiones a la denuncia por malos tratos.
 - D: La ley establece y especifica los casos en que la salvaguarda de la confidencialidad no es una obligación absoluta y debe revelarse el secreto médico, como ante la sospecha de un delito y en caso de ser llamados a declarar en un proceso judicial.
- 25 Tiene en su consulta a una paciente embarazada que relata prácticas sexuales de riesgo y en la que sospecha que podría haber una enfermedad de transmisión sexual. De entre las siguientes, señale cuál es la enfermedad que podría causar ceguera congénita si no se trata durante el embarazo:
- A: Sífilis.
 - B: Herpes genital.
 - C: Tricomoniasis.
 - D: Gonorrea.
- 26 Según el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) el tratamiento antibiótico de primera elección para la sinusitis aguda con síntomas intensos que duran más de 7 días es:
- A: Amoxicilina-ácido clavulánico 500 mg 1 cp cada 8 horas durante 5 días.
 - B: Azitromicina 500 mg 1 cp cada 24 horas durante 3 días.
 - C: Cefditoreno 200 mg 1 cp cada 12 horas durante 7-10 días.
 - D: Amoxicilina 500 mg-1g, 1 cp cada 8 horas, durante 5-7 días.
- 27 Indique cuál de las siguientes NO es una de las indicaciones financiadas con cargo al Sistema Nacional de Salud de los inhibidores de la PCSK9:
- A: Paciente con enfermedad cardiovascular establecida que no alcancen sus objetivos con dosis máximas de estatinas y/o otros fármacos (c-LDL >100).
 - B: Pacientes con hipercolesterolemia familiar no controlados con dosis máximas toleradas de estatinas (c-LDL >100).
 - C: Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o hipercolesterolemia familiar intolerantes a las estatinas o para los que estén contraindicadas y tengan un c-LDL >100.
 - D: Pacientes con riesgo cardiovascular alto que no toleren estatinas y con c-LDL < 100.
- 28 Existe un indicador que mide el valor, en años de vida, de las repercusiones de muertes producidas después del primer año de vida. ¿Cómo se denomina?
- A: Tasa bruta de mortalidad.
 - B: Índice de envejecimiento.
 - C: Tasa de crecimiento natural.
 - D: Años potenciales de vida perdidos.
- 29 ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas es más característico de un vértigo periférico?
- A: Diplopia.
 - B: Nistagmo vertical puro.
 - C: Hipoacusia neurosensorial.
 - D: Inestabilidad progresiva sin sensación de giro.

- 30 ¿Qué se entiende por período de incubación?
- A: El intervalo entre la exposición al agente infeccioso y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
 - B: El tiempo que transcurre desde el diagnóstico hasta la curación clínica completa.
 - C: El intervalo entre la exposición y el momento en que el paciente deja de ser contagioso.
 - D: El tiempo que tarda el sistema inmunitario en producir anticuerpos protectores tras una vacunación.
- 31 Señale la forma y lugar de absorción principal del hierro:
- A: Ferroso, en íleon.
 - B: Ferroso, en duodeno.
 - C: Férrico, en íleon.
 - D: Férrico, en duodeno.
- 32 ¿Cuál de las siguientes opciones NO es causa de anemia megaloblástica?
- A: Gastrectomía.
 - B: Embarazo.
 - C: Dieta pobre en algunos productos de origen animal.
 - D: Metotrexato.
- 33 De los fármacos antituberculosos que se mencionan a continuación, señale cuál produce, en ocasiones, alteraciones oculares:
- A: Isoniacida.
 - B: Rifampicina.
 - C: Etambutol.
 - D: Estreptomina.
- 34 Una mujer de 66 años acude a su centro de salud en Aragón para revisión ginecológica. Ha participado regularmente en el Programa de Cribado de Cáncer de Cérvix, con tres determinaciones de VPH negativas en los últimos 10 años, la última hace 3 años y sin antecedentes de lesiones cervicales de alto grado. Según el programa de cribado poblacional de Cáncer de Cérvix de Aragón, ¿cuál de las siguientes conductas es correcta?
- A: Continuar con el cribado cada 3 años mediante citología hasta los 70 años.
 - B: Repetir la detección del VPH en 5 años y valorar la suspensión a los 70 años si se mantiene negativa.
 - C: Finalizar el cribado al cumplir los criterios de edad y resultados negativos previos.
 - D: Continuar el cribado hasta los 75 años si mantiene vida sexual activa.
- 35 De los siguientes síntomas, ¿cuál es exclusivo de la hiponatremia grave?
- A: Coma.
 - B: Agitación.
 - C: Diarrea.
 - D: Cefalea.
- 36 Está en consulta y tiene que enfrentarse a una situación de agresividad verbal por parte del paciente. ¿Qué conducta se recomienda evitar?
- A: Controlar las emociones propias.
 - B: Contrabalanceo emocional.
 - C: Reeducación por objetivos.
 - D: Excusarse, dar explicaciones.

- 37 ¿Cuál es el objetivo principal de los estudios descriptivos en epidemiología?
- A: Determinar relaciones causales entre factores de riesgo y enfermedad.
 - B: Describir la frecuencia y distribución de los eventos de salud en una población.
 - C: Evaluar la eficacia de una intervención sanitaria.
 - D: Controlar los factores de confusión mediante aleatorización.
- 38 Respecto al seguimiento del embarazo en Atención Primaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- A: Solo se realiza en el tercer trimestre.
 - B: Incluye control de tensión arterial, peso y analíticas.
 - C: No se recomienda en embarazos normales.
 - D: Debe ser gestionado exclusivamente por obstetricia.
- 39 En relación a la sensibilidad de una prueba diagnóstica ¿Cuál es la definición más correcta?
- A: Probabilidad de padecer la enfermedad dado un resultado positivo.
 - B: Probabilidad de obtener un resultado positivo entre los pacientes con la enfermedad.
 - C: Proporción de sanos con resultado negativo.
 - D: El resultado del calculo de 1 menos el valor predictivo positivo.
- 40 Según la información oficial de la Estrategia Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y Optimización del uso de Antibióticos (IRASPROA) en Aragón, ¿cuál de estos roles se incluye típicamente en los equipos multidisciplinares IRASPROA?
- A: Solo puede estar formada por Médicos de Atención Primaria.
 - B: Pueden formar parte especialistas en Microbiología, Farmacia, Medicina de Familia y Comunitaria, Enfermería, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, entre otros.
 - C: Están formados por personal de las direcciones y jefes de servicio, además de personal administrativo.
 - D: Es una comisión formada en exclusiva por profesionales expertos en enfermedades infecciosas.
- 41 En el protocolo del Código Ictus Aragón, ¿cuál de los siguientes criterios NO constituye una exclusión automática para la activación del código en fase prehospitalaria?
- A: Hora de inicio desconocida del ictus.
 - B: Paciente con dependencia severa previa (Escala Rankin modificada > 2).
 - C: Desarrollo de síntomas durante el sueño ("wake-up stroke") sin hora precisa.
 - D: Edad mayor de 90 años.
- 42 Según el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y la European Association Urology (EAU) 2024, respecto al manejo de la infección urinaria en el varón, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- A: Toda infección urinaria en el varón debe considerarse complicada y requiere urocultivo previo al tratamiento.
 - B: Si el varón es joven y sin comorbilidades, puede manejarse sin necesidad de cultivo.
 - C: Se recomienda tratamiento empírico con fosfomicina monodosis como en la mujer.
 - D: El uso de quinolonas es de primera elección incluso sin confirmación bacteriológica.

- 43** Sobre la audiometría, señale la expresión correcta:
- A: En una audiometría manual se considera normal en niños y adultos la audición con intensidad de 60 decibelios de los tonos de frecuencias 1000, 2000 y 4000.
 - B: En una audiometría tonal liminar el individuo (adulto y niño) explorado oye en todas las frecuencias entre los 0 y los 30 dB.
 - C: En una audiometría manual se considera que hay hipoacusia en mayores de 65 años, cuando se necesitan intensidades mayores de 80 dB.
 - D: En una audiometría manual se considera que hay hipoacusia en adultos y niños, cuando se necesitan intensidades mayores de 60 dB.
- 44** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según las Guías Europeas de Prevención Vascular y el sistema SCORE2?
- A: El cálculo del riesgo vascular (RV) solo se recomienda en pacientes mayores de 65 años.
 - B: Los factores de riesgo vascular mayores incluyen la hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus, tabaquismo y obesidad.
 - C: El cálculo del RV debe realizarse únicamente en pacientes con antecedentes cardiovasculares.
 - D: El sistema SCORE2 no contempla diferencias por edad ni sexo en la estimación del riesgo.
- 45** En el cuadro de mandos de Farmacia de OMI-AP en Aragón, el indicador denominado "Triple Whammy" se considera un indicador de:
- A: Eficiencia.
 - B: Seguridad.
 - C: Adecuación terapéutica.
 - D: Calidad asistencial global.
- 46** Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ¿cuál ha sido la causa más frecuente de muerte en mujeres en 2023 en España?
- A: Demencia.
 - B: Enfermedades cerebrovasculares.
 - C: Cáncer de mama.
 - D: Cardiopatía isquémica.
- 47** Según las Guías KDIGO 2024, ¿cuál de los siguientes pacientes presenta un riesgo alto (color naranja) de progresión de enfermedad renal crónica (ERC) y de eventos cardiovasculares, en la tabla pronóstica combinada G-A?
- A: TFG 75 mL/min/1,73 m² (G2) y ACR 20 mg/g (A1).
 - B: TFG 52 mL/min/1,73 m² (G3a) y ACR 250 mg/g (A2).
 - C: TFG 58 mL/min/1,73 m² (G3a) y ACR 30 mg/g (A1).
 - D: TFG 38 mL/min/1,73 m² (G3b) y ACR 40 mg/g (A1).
- 48** Pueden ser catalogadas como enfermedades profesionales las siguientes, EXCEPTO:
- A: Necrosis maxilar por fósforo.
 - B: Polineuropatía debida a otro agente tóxico por mercurio.
 - C: Síndrome del túnel carpiano por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: parálisis de los nervios debidos a la presión.
 - D: Cáncer de testículo por compresión de vestimenta de seguridad.

- 49 ¿Qué test valora la adherencia terapéutica a un tratamiento?
- A: Morisky-Green.
 - B: CAGE.
 - C: Richmond.
 - D: Goldberg.
- 50 Acude a su consulta un paciente que ha sufrido caída accidental desde 2 metros de altura. Refiere dolor torácico izquierdo, disnea intensa y progresiva, taquicardia, taquipnea, cianosis, hipotensión e ingurgitación yugular. En la auscultación se aprecia hipoventilación e hiperinsuflación en hemitórax izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de entre los siguientes?
- A: Taponamiento cardíaco.
 - B: Neumotórax a tensión.
 - C: Mediastinitis.
 - D: Fractura de diafragma.
- 51 Paciente de 45 años acude a consulta por cefalea intensa, de inicio súbito, que describe como "el peor dolor de cabeza de su vida". No presenta fiebre ni signos meníngeos. ¿Cuál es la actitud diagnóstica más adecuada?
- A: Administrar analgésicos y observar evolución.
 - B: Derivar a Urgencias para TAC craneal urgente.
 - C: Derivar a consulta de neurología.
 - D: Iniciar tratamiento empírico para migraña.
- 52 Señale la respuesta INCORRECTA en referencia al tiempo de retirada de la sutura por regiones anatómicas:
- A: Miembros superiores 10-12 días.
 - B: Cuero cabelludo 7 días.
 - C: Cara 7-10 días.
 - D: Extremidades inferiores y dorso 10-14 días.
- 53 En el manejo de la ideación suicida en Atención Primaria, ¿qué NO es apropiado?
- A: Preguntar directamente.
 - B: Valorar riesgo y plan.
 - C: Aplazar entrevista por incomodidad.
 - D: Derivar/activar recursos si riesgo.
- 54 ¿Cuál es la definición de enfermedad terminal según la OMS?
- A: Paciente con pronóstico de vida inferior a 6 meses con progresión irreversible.
 - B: Edad avanzada con dependencia para las actividades básicas de la vida diaria.
 - C: Paciente crónico con necesidad de cuidados en domicilio continuos.
 - D: Enfermedad que cause dolor crónico refractario.

- 55 En un paciente con dolor torácico intenso de 1 hora de evolución, el ECG muestra descenso del ST en V1-V3 con ondas R altas y simétricas, sin elevación del ST en las derivaciones precordiales estándar. ¿Cuál es la interpretación correcta?
- A: Infarto anterior subendocárdico por oclusión de la descendente anterior.
 - B: Infarto posterior por oclusión de la arteria circunfleja o de la coronaria derecha dominante.
 - C: Isquemia lateral alta por oclusión de la arteria diagonal.
 - D: Infarto inferior con extensión al ventrículo derecho.
- 56 Respecto a los fármacos utilizados para tratar la infección por tuberculosis, señale la opción correcta:
- A: La neuropatía periférica causada por la Isoniacida, no se previene con suplementos de Piridoxina (vitamina B6).
 - B: Si las transaminasas se elevan 5 veces su valor normal o la fosfatasa alcalina 3 veces, se considerará suspender el tratamiento con Isoniacida.
 - C: Un efecto secundario frecuente de la Piracinamida es la disminución de la función vestibular y auditiva, incluso llegando a ser irreversible.
 - D: Es habitual que el Etambutol aumente los niveles de ácido úrico, por lo que está contraindicado en pacientes gotosos.
- 57 Respecto a los distintos tipos de insulina utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus, todas las siguientes afirmaciones son correctas, EXCEPTO una:
- A: La insulina lispro es un análogo de acción rápida con inicio en 10-15 minutos y duración de 3 a 5 horas.
 - B: La insulina glargina es un análogo de acción prolongada sin pico definido, con duración aproximada de 24 horas.
 - C: La insulina NPH es una insulina humana de acción intermedia, con duración de entre 12 y 18 horas.
 - D: La insulina regular es un análogo de acción rápida con inicio en 5-10 minutos y duración menor de 3 horas.
- 58 Dentro de las estructuras y patrones que se observan en la dermatoscopia de una lesión melanocítica, ¿cuál indica benignidad de la lesión?
- A: Crisálidas.
 - B: Proyecciones radiales.
 - C: Retículo periférico con hiperpigmentación central.
 - D: Vasos atípicos.
- 59 Señale la afirmación INCORRECTA con respecto al pronóstico de la meningitis bacteriana aguda:
- A: La frecuencia de las secuelas neurológicas está aproximadamente en un 20-40% de los casos.
 - B: La mortalidad se sitúa en torno al 10-20% de los casos.
 - C: Una de las secuelas más importantes es la incontinencia urinaria.
 - D: Son factores de riesgo de mal pronóstico las crisis comiciales y las neuropatías craneales.
- 60 Según el Programa de Atención a la Mujer del Servicio Aragonés de Salud (2023), ¿cuál de las siguientes determinaciones serológicas forma parte del cribado rutinario en el primer trimestre de embarazo?
- A: VIH, sífilis, hepatitis B y toxoplasma.
 - B: VIH, sífilis, hepatitis A y citomegalovirus.
 - C: VIH, sífilis, rubéola y varicela.
 - D: VIH, hepatitis C, toxoplasma y virus de Epstein-Barr.

- 61 Para investigar los posibles factores de riesgo por los que se produce un determinado tipo de cáncer poco frecuente, se debe realizar:
- A: Estudio de casos-control.
 - B: Estudio de cohortes.
 - C: Ensayo clínico.
 - D: Serie de casos.
- 62 ¿Cuál de estos hallazgos NO suele observarse en la hipocalcemia?
- A: Espasmos musculares.
 - B: Convulsiones.
 - C: Acortamiento del intervalo QT en el ECG.
 - D: Papiledema.
- 63 ¿Cuál es el principal objetivo de la intervención breve sobre el consumo de alcohol en Atención Primaria?
- A: Conseguir la abstinencia total inmediata en todos los pacientes.
 - B: Identificar consumos de riesgo o perjudiciales y motivar al cambio hacia patrones de bajo riesgo o abandono.
 - C: Derivación a unidad de Salud Mental.
 - D: Iniciar tratamiento con naltrexona.
- 64 Según las guías europeas de riesgo cardiovascular (SCORE2/SCORE2-OP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la clasificación del riesgo estimado a 10 años?
- A: En adultos de 50-69 años, un SCORE2 del 4% se considera riesgo alto.
 - B: En personas menores de 50 años, un SCORE2 $\geq 7.5\%$ se clasifica como riesgo muy alto.
 - C: En mayores de 70 años, un SCORE2-OP del 12% se considera riesgo bajo a moderado.
 - D: En adultos ≥ 70 años, se utiliza SCORE2 y se considera muy alto si es $\geq 10\%$.
- 65 ¿Cuál de las siguientes NO corresponde al concepto de doble ciego en un ensayo clínico?
- A: Paciente y evaluador desconocen la asignación.
 - B: Reduce sesgos de expectativa.
 - C: Dificulta evaluar algunos efectos adversos.
 - D: Garantiza el mismo tratamiento para todos.
- 66 Según el Programa de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) en Atención Primaria y el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), ¿en cuál de los siguientes casos NO está indicado el uso de antibióticos orales?
- A: Infección urinaria baja no complicada en mujer, con clínica típica y tira reactiva positiva.
 - B: Impétigo localizado sin signos de gravedad.
 - C: Absceso cutáneo drenado adecuadamente y con celulitis asociada.
 - D: Otitis media aguda en menor de 2 años con fiebre y mal estado general.
- 67 ¿Qué es lo que evalúa el índice de Lawton & Brody?
- A: Actividades instrumentales de la vida diaria.
 - B: Actividades basales de la vida diaria.
 - C: Riesgo de desarrollar úlceras por presión.
 - D: Grado de incapacidad física.

- 68 Atiende en el área de urgencias a un varón de 21 años que viene por fiebre, dolor de garganta, malestar general, cefalea, lesiones papulosas en tronco y condilomas planos en zona perianal. Hace unas 6 semanas tuvo una úlcera en la base del prepucio no dolorosa que se fue espontáneamente y a la que no dio importancia. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la enfermedad de este paciente?
- A: Doxiciclina 100mg/12h vía oral durante 21 días.
 - B: Ciproloxacino 500mg/12h vía oral durante 7 días.
 - C: Azitromicina 500mg/ 24h vía oral durante 3 días.
 - D: Penicilina G benzatina 2,4 millones intramuscular en dosis única.
- 69 En cuanto a la escala Frail, señale la respuesta correcta:
- A: No es una escala validada.
 - B: Consta de 10 preguntas sencillas relativas cada una de ellas a un dominio.
 - C: Evalúa 5 ítems: fatigabilidad, resistencia, deambulación, comorbilidad y pérdida de peso.
 - D: La ausencia de cada ítem se valora con 1 punto y el resultado total se obtiene mediante la suma de los puntos.
- 70 Según la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 5.4, 2023), respecto al diagnóstico funcional de asma, señale la opción INCORRECTA:
- A: Se considera una broncodilatación significativa un aumento del $FEV_1 \geq 12\%$ y ≥ 200 mL respecto al valor basal.
 - B: Una prueba broncodilatadora positiva puede expresarse también como un aumento $> 10\%$ del valor teórico de referencia del FEV_1 o FVC.
 - C: Un FEV_1 reducido confirma la obstrucción, contribuye a establecer su gravedad e indica un mayor riesgo de exacerbaciones.
 - D: La ausencia de reversibilidad en una única espirometría excluye el diagnóstico de asma si el paciente no está en tratamiento broncodilatador.
- 71 Acude a un servicio de atención continuada del sector Calatayud un varón de 40 años con diabetes tipo 2 de 5 años de evolución con buena adherencia terapéutica. Refiere debilidad, palidez, sudoración, discreta confusión e irritabilidad según corrobora su acompañante. Hace unos 30 minutos ha finalizado una carrera urbana de 10 kilómetros. Usted sospecha una hipoglucemia y en sangre capilar obtiene una glucemia de 45 mgr/dl. Sobre esta situación indique la respuesta correcta:
- A: La palidez, sudoración y temblores son síntomas por glucopenia neurológica.
 - B: La confusión, debilidad e irritabilidad son síntomas de origen autónomo.
 - C: La hipoglucemia por sulfonilureas a menudo es prolongada, requiere tratamiento y vigilancia durante 24 h o más.
 - D: Los síntomas de hipoglucemia aparecen en todos los pacientes cuando su glucemia plasmática es inferior a 50 mgr/dl.
- 72 En cuanto a los determinantes de salud, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El estilo de vida es el factor que más influye en el estado de salud.
 - B: El sistema sanitario es el factor que menos influye en el estado de salud.
 - C: El sistema sanitario no recibe porcentaje de gasto en salud.
 - D: El estilo de vida es el factor que recibe menos porcentaje de gasto en salud.

- 73** Varón de 45 años con antecedentes de consumo moderado de alcohol y síntomas persistentes de ansiedad generalizada tratados previamente con ISRS durante 8 semanas sin respuesta significativa. El paciente presenta insomnio de conciliación y tendencia al uso intermitente de benzodiazepinas. Según la Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada en Atención Primaria, ¿cuál sería la estrategia terapéutica más adecuada en este escenario?
- A: Incrementar la dosis del ISRS hasta el máximo tolerado y mantener al menos 4 semanas más antes de valorar cambios.
 - B: Suspender el ISRS y sustituirlo por benzodiazepinas de acción corta como tratamiento principal.
 - C: Combinar el ISRS con benzodiazepinas de forma prolongada por su efecto sinérgico.
 - D: Añadir pregabalina o cambiar a un IRSN con soporte psicoterapéutico estructurado (TCC).
- 74** Indique la afirmación INCORRECTA sobre estudios experimentales:
- A: Pueden ser no aleatorizados.
 - B: Permiten inferir causalidad.
 - C: Incluyen ensayos comunitarios.
 - D: No permiten controlar la confusión.
- 75** Le consulta una chica de 17 años por presentar múltiples lesiones comedogénicas en cara que no mejoran con las cremas cosméticas que utiliza. El tratamiento de elección para esta situación es:
- A: Ácido retinoico en aplicación nocturna.
 - B: Clindamicina tópica al 1% por la noche.
 - C: Doxíciclina oral 100 mg cada 12h durante 10 días y peróxido de benzoilo tópico.
 - D: Todas son falsas.
- 76** Según los Estándares de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2024, ¿cuál de las siguientes combinaciones permite diagnosticar síndrome metabólico en un varón europeo?
- A: Perímetro abdominal de 92 cm, triglicéridos 160 mg/dL y presión arterial 128/82 mmHg.
 - B: Perímetro abdominal de 96 cm, cHDL 38 mg/dL y glucemia en ayunas de 102 mg/dL.
 - C: Perímetro abdominal de 100 cm y glucemia de 98 mg/dL.
 - D: Triglicéridos 155 mg/dL, cHDL 45 mg/dL y presión arterial 125/80 mmHg.
- 77** Dentro de un estudio de una prueba diagnóstica, se decide desde el equipo investigador comparar a enfermos graves, respecto a controles sanos sin comorbilidades. ¿Qué sesgo puede presentarse en relación a la sensibilidad y especificidad de la prueba?
- A: Sesgo de publicación.
 - B: Sesgo de selección de participantes.
 - C: Sesgo de efecto umbral.
 - D: Sesgo de espectro.
- 78** Señale la respuesta INCORRECTA sobre la hiperprolactinemia:
- A: El aumento fisiológico de la prolactina se presenta durante el embarazo y la lactancia.
 - B: La cabergolina es el tratamiento de elección pero presenta una mayor tasa de efectos adversos que la bromocriptina.
 - C: En mujeres puede manifestarse con síntomas como amenorrea, galactorrea y esterilidad.
 - D: En los varones la galactorrea es infrecuente.

- 79 Son signos y señales de maltrato infantil frecuentes en adolescentes todos ellos, EXCEPTO:
- A: La inclusión en pandillas y grupos que practican violencia extrema.
 - B: Fugas del domicilio.
 - C: Trastornos psicosomáticos.
 - D: Consumo de alcohol/drogas.
- 80 El Programa de Atención a Enfermos Crónicos Dependientes en Aragón tiene como enfoque terapéutico uno de los siguientes:
- A: Ingresos hospitalarios prolongados.
 - B: Protocolos estandarizados comunes sin adaptación individual.
 - C: Atención centrada en el paciente con un enfoque multidisciplinar.
 - D: Derivación directa a los Equipos de Soporte en Atención Domiciliaria (ESAD) para control crónico de estos pacientes para descongestionar Atención Primaria.
- 81 Según las instrucciones para el acceso a la atención de salud bucodental infantil y juvenil de los niños con discapacidad publicadas en el portal SaludInforma del Gobierno de Aragón, los niños discapacitados que sean atendidos por los dentistas de la Unidades de Salud Bucodental del SALUD o dentistas privados habilitados y que por sus necesidades especiales superen las posibilidades de tratamiento en los mismos deberán ser derivados:
- A: A la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza mediante informe de derivación.
 - B: A la Unidad Bucodental del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a través de un informe de derivación.
 - C: A la Unidad Bucodental del hospital de referencia correspondiente a su zona de salud mediante informe de derivación.
 - D: Al Servicio de Otorrinolaringología del hospital de referencia a través de un informe de derivación.
- 82 Varón de 58 años con antecedentes de sífilis que acude por parestesias en miembros inferiores, inestabilidad al caminar, disminución de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva, y dolor lancinante en las piernas. Durante la exploración neurológica se observa una pupila pequeña, irregular, que no responde a la luz pero sí a la acomodación. ¿Cuál de los siguientes hallazgos pupilares presenta este paciente?
- A: Pupila de Marcus Gunn.
 - B: Pupila tónica de Adie.
 - C: Pupila de Argyll Robertson.
 - D: Pupila de Hutchinson.
- 83 La sobrecarga del cuidador resulta de la combinación del trabajo físico, presión emocional, restricciones sociales y demandas económicas que surgen por el cuidado del enfermo. ¿Con cuál de las siguientes escalas se valora?
- A: Escala de Karnofsky.
 - B: Escala de Filadelfia.
 - C: Escala de Zarit.
 - D: Escala de Lawton y Brody.
- 84 Señale la opción generalmente compatible con la lactancia materna;
- A: Amiodarona.
 - B: Quinolonas.
 - C: Penicilina.
 - D: Warfarina.

- 85 ¿Cuál de las siguientes opciones se considera un coste indirecto en economía de salud?
- A: Coste de hospitalización.
 - B: Coste de medicamentos.
 - C: Gastos en equipos médicos.
 - D: Pérdida de productividad laboral por enfermedad.
- 86 ¿Cuál de los siguientes fármacos antipalúdicos utilizados en profilaxis está contraindicado en pacientes con un historial de epilepsia o trastornos psiquiátricos severos?
- A: Mefloquina.
 - B: Atovacuona/Proguanil.
 - C: Doxiciclina.
 - D: Cloroquina.
- 87 Según las Recomendaciones para el Programa de Cribado de Cáncer de Cérvix en Aragón, ¿cuál es la prueba e intervalo recomendados para una mujer de 37 años que se realizó una citología hace 4 años con resultado negativo?
- A: Citología cada 3 años.
 - B: Co-test (citología+VPH) cada 5 años.
 - C: Test de VPH-AR cada 5 años.
 - D: Citología anual.
- 88 ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos apoya más el diagnóstico de tendinopatía del manguito rotador frente a la capsulitis adhesiva?
- A: Dolor con arcos dolorosos y movilidad pasiva conservada.
 - B: Dolor nocturno intenso y rigidez marcada.
 - C: Limitación global de la movilidad activa y pasiva.
 - D: Dolor que mejora con el reposo absoluto.
- 89 Paciente varón de 45 años de edad y en tratamiento con anticoagulantes orales por cardiopatía valvular. Una vez asesorado y siguiendo las indicaciones clínicas de su médico podrá optar por los siguientes modelos de control del TAO, EXCEPTO:
- A: Control en hematología hospitalaria.
 - B: Control en Atención Primaria.
 - C: Autocontrol en domicilio.
 - D: Control por su farmacéutico comunitario.
- 90 Mujer de 84 años, independiente para actividades básicas. Sufre caída desde su propia altura en el domicilio y refiere dolor intenso en ingle derecha con incapacidad para ponerse de pie. A la exploración: extremidad derecha acortada y en rotación externa, dolor a la movilización pasiva de cadera, pulsos distales presentes y sin déficit neurológico distal. Constantes hemodinámicas estables. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la actuación inicial en Atención Primaria?
- A: Contusión de cadera; AINE y observación domiciliaria.
 - B: Fractura proximal de fémur derecha; analgesia, inmovilización, evitar deambulación y derivación urgente al hospital.
 - C: Luxación posterior de cadera; analgesia, inmovilización, evitar deambulación y derivación urgente al hospital.
 - D: Radiculopatía L3-L4; reposo relativo y revisión en 48-72 horas.

- 91 Está recomendado hacerse la prueba del VIH cuando se encuentre en alguno de estos casos, EXCEPTO uno:
- A: Si es pareja sexual de una persona con infección por *Trichomonas vaginalis*.
 - B: Si ha tenido relaciones sexuales sin protección con personas de países de alta prevalencia de infección por VIH.
 - C: Si es una persona heterosexual con más de una pareja sexual y/o prácticas de riesgo en los últimos doce meses.
 - D: Si procede de algún país de alta prevalencia de VIH (>1%).
- 92 En relación con el paciente dependiente del tabaco que acude a una consulta de Atención Primaria, debería realizarse una intervención breve, sistematizada y estructurada en cinco pasos. Señale la respuesta correcta:
- A: Averiguar, Aconsejar, Acordar, Ayudar, Asegurar.
 - B: Averiguar, Asesorar, Apremiar, Auxiliar, Acordar.
 - C: Averiguar, Adiestrar, Apremiar, Ayudar, Acordar.
 - D: Advertir, Averiguar, Aconsejar, Ayudar, Acordar.
- 93 En relación con los efectos adversos descritos en los ensayos clínicos con agonistas del receptor GLP-1 (arGLP-1), señale la opción correcta:
- A: Los efectos adversos más frecuentes fueron gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea.
 - B: Los arGLP-1 no se han asociado a pancreatitis ni a otros efectos digestivos.
 - C: Los abandonos del tratamiento fueron más frecuentes en el grupo placebo.
 - D: No se observaron efectos adversos graves en los ensayos clínicos.
- 94 ¿Cuál de las siguientes intervenciones NO es prioritaria según el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) 2024 en la mujer?
- A: Prevención y lucha contra el tabaquismo.
 - B: Cribado densitométrico en mujeres menores de 60 años.
 - C: Detección del alcoholismo.
 - D: Detección de la hipertensión arterial.
- 95 De las siguientes expresiones sobre causas de dolor abdominal crónico según la localización del dolor, señale la INCORRECTA:
- A: Litiasis biliar y cuadrante superior derecho.
 - B: Pancreatopatías y cuadrante superior izquierdo.
 - C: Neoplasia de colon izquierdo y cuadrante inferior izquierdo.
 - D: Neoplasia de ovario y cuadrante superior izquierdo.
- 96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el proceso diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) según el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) 2024?
- A: La presión arterial tomada en consulta no es útil para el cribado de HTA.
 - B: Una presión arterial $\geq 140/90$ mmHg en consulta confirma el diagnóstico de HTA sin necesidad de otras pruebas.
 - C: La presión arterial elevada en consulta debe confirmarse mediante MAPA o AMPA cuando estén disponibles.
 - D: La automedida de la presión arterial (AMPA) solo se utiliza en pacientes con HTA grado 3.

- 97 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre reservorio y vector?
- A: El reservorio transmite activamente el agente infeccioso entre huéspedes, mientras que el vector solo lo alberga sin transmitirlo.
 - B: El reservorio es el hábitat donde el agente se mantiene y multiplica, mientras que el vector es el ser vivo que lo transporta desde el reservorio o un huésped infectado hacia otro susceptible.
 - C: El reservorio es siempre un animal vertebrado, mientras que el vector es un microorganismo intracelular.
 - D: El reservorio es el objeto inanimado que mantiene el agente, mientras que el vector es el medio físico (agua, aire) por el que se propaga.
- 98 Respecto al tratamiento farmacológico y no farmacológico de la bronquitis aguda en un paciente sin signos de alarma ni comorbilidades relevantes, señale la opción INCORRECTA:
- A: Si no hay signos de alarma ni comorbilidades, están indicados los antibióticos en presencia de esputo purulento.
 - B: El consumo crónico de vitamina C no ha demostrado reducir la frecuencia de bronquitis aguda.
 - C: Los mucolíticos no han mostrado beneficios clínicamente relevantes, por lo que no se recomiendan de forma rutinaria.
 - D: Es recomendable abordar las expectativas del paciente explicando el curso natural y la duración habitual de la tos.
- 99 Una mujer de 63 años, con antecedentes de hipermetropía, acude a urgencias por dolor ocular intenso, cefalea, náuseas, visión borrosa y halos coloreados alrededor de las luces. A la exploración, presenta ojo rojo con córnea edematosa, midriasis media fija y globo ocular muy duro al tacto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A: Uveítis anterior.
 - B: Conjuntivitis aguda bacteriana.
 - C: Queratitis vírica.
 - D: Glaucoma agudo de ángulo cerrado.
- 100 Atiende en la consulta a un paciente víctima de una agresión que le dice que no quiere que haga parte de lesiones. Señale la respuesta correcta respecto a esta situación.
- A: No lo realiza porque no hay consecuencias legales por no realizar este parte.
 - B: Lo realiza igualmente dado que puede incurrir en responsabilidad penal por omisión del deber.
 - C: No lo hace pero debe indicar en la historia que el paciente se niega a realizarlo.
 - D: Lo hace y se lo entrega en exclusiva al paciente para que decida si más adelante quiere presentarlo en el juzgado.
- 101 Acude a su consulta un paciente con signos de fiebre de origen desconocido. Dice haber consultado con varios doctores previamente y refiere ansiedad por esa fiebre. ¿Cuál sería la conducta recomendada?
- A: Debe iniciarse tratamiento antimicrobiano empírico dada la demora en el diagnóstico.
 - B: Debe solicitarse una prueba de imagen para adelantar el diagnóstico lo antes posible.
 - C: Debe realizarse una anamnesis inicial completa.
 - D: Debe derivarse a un centro hospitalario lo antes posible para no demorar más el diagnóstico.
- 102 Según el Protocolo del Ministerio de Sanidad para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, en un adulto con sospecha clínica la pruebas que solicitarías inicialmente:
- A: Antiendomiso IgG + anti-gliadina IgA.
 - B: Antitransglutaminasa tisular IgA (tTG-IgA) + IgA total sérica.
 - C: Anti-gliadina IgA + IgA total sérica.
 - D: Antitransglutaminasa IgG + IgG total sérica.

- 103** Hablando de los anticoagulantes orales anti-vitamina K señale la respuesta INCORRECTA de entre las siguientes:
- A: Los más utilizados en nuestro país son el Acenocumarol y la Warfarina.
 - B: El efecto anticoagulante de la Warfarina no se alcanza hasta los 2-3 días de su administración.
 - C: Se realizan controles del grado de anticoagulación mediante el cociente internacional normalizado.
 - D: La aparición de hemorragias impone aumentar la dosis semanal del anticoagulante.
- 104** Varón de 66 años con cáncer pancreático avanzado. Dolor basal actualmente bien controlado con morfina oral de liberación prolongada 30 mg cada 12 h. Presenta crisis de dolor incidental en curas domiciliarias. Según el Protocolo de tratamiento en Cuidados Paliativos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos de 2023, si decides pautar dosis de rescate de morfina oral de liberación inmediata ¿qué dosis indicarías?
- A: 5 mg por toma, a demanda.
 - B: 10 mg por toma, a demanda.
 - C: 15 mg por toma, a demanda.
 - D: 20 mg por toma, a demanda.
- 105** La Odds Ratio es una medida de:
- A: Asociación.
 - B: Frecuencia.
 - C: Prevalencia.
 - D: Impacto.
- 106** Según datos de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) 2024, la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas en los últimos 12 meses se situó en 2024 en el 14,7%. De entre las siguientes, ¿cuál es la verdadera?
- A: Atendiendo al sexo, con independencia del tramo de edad, las borracheras tienen una mayor prevalencia entre las mujeres que entre los hombres.
 - B: Las intoxicaciones etílicas agudas son más habituales entre la población adulta, aumentando a medida que lo hace la edad.
 - C: El binge drinking (consumo de alcohol en atracón), consiste en consumir cinco o más bebidas alcohólicas en un intervalo de aproximadamente 2 horas.
 - D: Los combinados o cubatas son, en todos los tramos de edad, la bebida cuyo consumo está más extendido.
- 107** Acude a su consulta una mujer de 50 años que refiere hipoacusia del oído derecho desde hace más de 6 meses, además refiere que en los últimos años ha presentado al menos cinco episodios de vértigos asociando náuseas, vómitos y sudoración precedidos de acúfenos en el oído derecho. A la exploración física presenta otoscopia con conductos auditivos externos y tímpanos normales, con la audiometría se confirma hipoacusia de tipo neurosensorial con mayor pérdida en frecuencias graves. Aporta una resonancia magnética cerebral que es normal. ¿Qué diagnóstico considera más acertado?
- A: Enfermedad de Ménière.
 - B: Vértigo posicional paroxístico benigno.
 - C: Otosclerosis.
 - D: Neuronitis vestibular derecha.

- 108 Según la guía de práctica clínica de la Asociación Española de Gastroenterología de manejo de la dispepsia, en un paciente de 40 años con dispepsia no investigada ¿cuál de los siguientes es un síntoma de alarma que justifica la solicitud de una endoscopia digestiva alta?
- A: Meteorismo posprandial aislado.
 - B: Pirosis esporádica.
 - C: Pérdida de peso significativa no intencionada.
 - D: Saciedad precoz leve y fluctuante.
- 109 Respecto a los fármacos empleados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál de los siguientes NO ha demostrado beneficios cardiovasculares adicionales más allá del control glucémico?
- A: Empagliflozina.
 - B: Liraglutida.
 - C: Dapagliflozina.
 - D: Sitagliptina.
- 110 De las siguientes afirmaciones sobre actividades preventivas en Atención Primaria, señale la INCORRECTA:
- A: La vacunación de la gripe es prevención primaria.
 - B: La planificación familiar es prevención primaria.
 - C: El cribado de diabetes mellitus es prevención primaria.
 - D: La promoción de hábitos saludables es prevención primaria.

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

[illegible]