

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución 03/04/2025 y 25/07/2025 (B.O.A. 11/08/2025)

CATEGORÍA:

ODONTOESTOMATÓLOGO

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 10, ambas incluidas.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS

SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



ODONTOESTOMATOLOGO

- 1 Conforme al vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las funciones del Gobierno de Aragón:
 - A: El Gobierno de Aragón ejerce la potestad legislativa en el ámbito de las competencias autonómicas.
 - B: El Gobierno de Aragón responde políticamente ante las Cortes de Aragón de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.
 - C: El Gobierno de Aragón ostenta la representación ordinaria del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma.
 - D: El Gobierno de Aragón sólo puede ejercer la potestad reglamentaria mediante autorización previa de las Cortes de Aragón.
- 2 Señale la respuesta correcta. Conforme al artículo 4 de la vigente Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ¿cómo deben organizar las acciones sanitarias el Estado y las Comunidades Autónomas?
 - A: Independientemente, sin coordinación.
 - B: Dentro de una concepción integral del sistema sanitario.
 - C: Solo el Estado organiza las acciones sanitarias.
 - D: Solo las Comunidades Autónomas organizan las acciones sanitarias.
- 3 ¿Quién informa, con carácter preceptivo, los proyectos de reales decretos que establecen los títulos de profesiones sanitarias?
 - A: El Ministerio de Sanidad.
 - B: La Comisión Nacional de la especialidad.
 - C: El Consejo de Universidades.
 - D: La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
- 4 Respecto a la gestión clínica en las instituciones sanitarias, ¿cual es INCORRECTA?
 - A: El desempeño de funciones de gestión clínica será objeto del oportuno reconocimiento.
 - B: El ejercicio de funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación del desempeño y de los resultados. Tal evaluación tendrá carácter periódico.
 - C: Únicamente tienen la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales.
 - D: Será el gobierno quién establezca las características y los principios generales de la gestión clínica.
- 5 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Comité de Bioética de España?
 - A: Un órgano ejecutivo dependiente directamente de las Cortes Generales.
 - B: Una entidad privada financiada por el Ministerio de Sanidad.
 - C: Un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Sanidad.
 - D: Una asamblea legislativa autonómica con competencias en bioética.

- 6 ¿Qué modelo de gestión de calidad se utiliza como referencia en el Servicio Aragonés de Salud?
- A: Modelo Lean Healthcare.
 - B: Modelo EFQM de Excelencia.
 - C: Modelo Six Sigma.
 - D: Modelo Balanced Scorecard.
- 7 Para la imposición de sanciones por faltas leves, ¿es preceptiva la previa instrucción de un procedimiento?
- A: No, salvo el trámite de audiencia al interesado.
 - B: Siempre es preceptiva la instrucción de un procedimiento administrativo.
 - C: La instrucción del procedimiento queda a criterio del órgano que instruye.
 - D: Ninguna de las anteriores es correcta.
- 8 ¿Qué tipo de normativa se utiliza predominantemente para realizar las actualizaciones en la Cartera de Servicios Sanitarios del Sistema de Salud de Aragón?
- A: Decretos del Gobierno de Aragón.
 - B: Resoluciones del Servicio Aragonés de Salud.
 - C: Órdenes del Consejero/a de Sanidad.
 - D: Leyes aprobadas en las Cortes de Aragón.
- 9 Según lo establecido en el Decreto 39/2024, de 28 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, ¿cuál de estos órganos NO forma parte de los órganos centrales que componen el Servicio Aragonés de Salud?
- A: Gerencia única de Atención Primaria.
 - B: Dirección de Área de Enfermería.
 - C: Dirección General de atención a pacientes y familiares.
 - D: Dirección de Área de Recursos Humanos.
- 10 Según las ventajas que aporta una odontostomatología basada en la evidencia, ¿qué afirmación es INCORRECTA?
- A: Integración de la experiencia clínica individual con mejor evidencia externa disponible.
 - B: Considera las preferencias del paciente informado.
 - C: Pérdida relativa del pensamiento fisiopatológico.
 - D: Fomenta y organiza el autoaprendizaje.
- 11 Son tiempos quirúrgicos todos, EXCEPTO:
- A: Incisión.
 - B: Manejo de tejidos.
 - C: Hemostasia.
 - D: Anestesia.
- 12 En referencia a la obturación de conductos, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El objetivo principal es conseguir el sellado tridimensional de todo el espacio conseguido con la preparación del conducto.
 - B: Son válidas tanto la condensación lateral como la vertical, si se usan correctamente, en unos casos puede estar más indicada una técnica que otra.
 - C: El cemento sellador no endurece, lo que facilita la obturación de conductos.
 - D: La forma de uso de los espaciadores digitales consiste en hacer pequeños movimientos de rotación horaria y antihoraria a la vez que se impulsa el espaciador.

- 13** En el paciente diabético es INCORRECTO:
- A: Frecuente periodontitis.
 - B: Xerostomía habitual.
 - C: Índice de inclusiones dentarias elevado.
 - D: Cicatrización retardada.
- 14** Señale la respuesta INCORRECTA.
- A: Caries es una enfermedad infecciosa transmitida al lactante principalmente por la madre.
 - B: La bacteria más importante al inicio de la caries es el *Estreptococo mutans*.
 - C: El *Estreptococo mutans* puede colonizar cualquier diente en una placa madura.
 - D: La sacarosa facilita la adherencia del *Estreptococo mutans* a la superficie dental.
- 15** La osteomielitis crónica esclerosante de Garré se caracteriza por:
- A: Necrosis ósea extensa con supuración y secuestros.
 - B: Osteolisis difusa con trayectos fistulosos.
 - C: Reacción periosteal proliferativa sin secuestros.
 - D: Ser siempre bilateral y simétrica.
- 16** En relación a la lengua negra vellosa, indique la respuesta INCORRECTA:
- A: Se produce por hipertrofia o elongación de las papilas fungiformes.
 - B: Un factor etiológico es la toma de corticoides.
 - C: La primera línea de tratamiento es eliminar los factores etiológicos y mejorar la higiene lingual.
 - D: Suele ser asintomática aunque puede provocar halitosis y sensación urente.
- 17** Respecto a las Neuralgias del trigémino señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Es más frecuente en pacientes de más de 50 años.
 - B: La afectación es más frecuente unilateral.
 - C: El dolor es tipo eléctrico - punzante.
 - D: Puede cursar con déficit sensitivo-motor.
- 18** Llega a consulta un paciente anciano, edéntulo y paladar con coloración rojiza, ¿cuál sería su diagnóstico más habitual y actuación?:
- A: Eritroplasia y tomo muestra para biopsia.
 - B: Estomatitis protética y trato.
 - C: Eritroplasia y remito a los médicos especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial.
 - D: Sospecho de pénfigo e instauró tratamiento.
- 19** Respecto al uso de óxido nítrico en odontopediatría:
- A: Contraindicado en asma.
 - B: No interfiere en vitamina B12.
 - C: De elección en niños con infección respiratoria alta.
 - D: Opción razonable en niños con asma controlada.

- 20** La clasificación de Tarnow y Fletcher de involucración de la furca, mide:
- A: La pérdida horizontal del defecto óseo a partir de la tabla vestibular.
 - B: La pérdida horizontal del defecto óseo a partir de la superficie radicular.
 - C: La pérdida vertical del defecto óseo a partir del techo de la furca hasta apical.
 - D: La pérdida vertical del defecto óseo a partir de la cresta interproximal.
- 21** En relación a la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck:
- A: Es una lesión benigna asociada a virus Coxsackie A.
 - B: Es una lesión benigna asociada a virus VPH 13 y 32.
 - C: Es una lesión benigna asociada a virus ECHO.
 - D: Es una lesión benigna asociada a virus HSV-2.
- 22** ¿A qué tipo de injerto pertenece el injerto cerámico?
- A: Injerto alogénico.
 - B: Injerto autólogo.
 - C: Injerto heterólogo.
 - D: Injerto aloplástico.
- 23** Respecto a la etiología de la enfermedad pulpar señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El empleo de material rotatorio sin refrigeración adecuada puede resultar en una causa térmica o mecánica.
 - B: Un traumatismo agudo puede ser una causa física de enfermedad pulpar.
 - C: La radioterapia es una causa frecuente de lesiones pulpares por necrosis de los odontoblastos.
 - D: Las variaciones bruscas de presión no afectan a la pulpa.
- 24** Entre las complicaciones que pueden aparecer sobre los dientes que han padecido un traumatismo previo, señale la respuesta INCORRECTA
- A: Contacto prematuro con el antagonista.
 - B: Anquilosis dental.
 - C: Reabsorción radicular
 - D: Granulomas.
- 25** En la Clasificación de Kennedy junto con la modificación Applegate, qué clase representa ausencias de los dientes 34, 36, 37, 38, 46, 47 y 48:
- A: Clase I, modificación 1.
 - B: Clase I, modificación 2.
 - C: Clase II, modificación 1.
 - D: Clase II, modificación 2.
- 26** Señale la respuesta INCORRECTA en cuanto a los monómeros de resina para uso indirecto.
- A: Baja contracción de polimerización.
 - B: Bajo peso molecular.
 - C: Estabilidad química.
 - D: Alta reactividad.

- 27 Dentro de los pacientes con fisura labiopalatina, ¿cuál de las siguientes intervenciones quirúrgicas se hace cronológicamente en primer lugar?
- A: Queiloplastia.
 - B: Palatoplastia.
 - C: Cirugía ortognática.
 - D: Alveoloplastia.
- 28 Ante una lesión ulcerada en suelo de boca, que NO esperaría encontrar:
- A: Dolor.
 - B: Hemorragia.
 - C: Diplopia.
 - D: Adenopatías cervicales.
- 29 Señale la respuesta INCORRECTA. En el tratamiento de la desmineralización y/o lesiones por caries prematuras:
- A: Está indicada la microabrasión.
 - B: Está indicado el blanqueamiento.
 - C: Está indicada la megaabrasión.
 - D: Está indicada la infiltración de resina.
- 30 Según la clasificación de la OMS, ¿qué hallazgo radiográfico permite diferenciar una fractura radicular cervical de una fractura alveolar localizada cuando ambos cursan con movilidad del diente?
- A: No se distinguen radiográficamente, solo mediante exploración clínica.
 - B: En la fractura radicular cervical hay desplazamiento de varios dientes en bloque; en la fractura alveolar, solo de uno.
 - C: En la fractura radicular cervical hay afectación del ligamento periodontal, pero sin línea radiolúcida.
 - D: En la fractura radicular cervical se observa una línea radiolúcida que afecta solo a la raíz; en la fractura alveolar se observa una línea que involucra el hueso alveolar adyacente.
- 31 ¿Cuál de los siguientes NO es una indicación de exodoncia?
- A: Caries severa que no permite su restauración.
 - B: Necrosis pulpar en dientes no susceptibles de tratamiento endodóntico.
 - C: Motivos ortodónticos.
 - D: Cáncerofobia.
- 32 ¿Cuál de las siguientes pruebas radiológicas NO es efectiva para diagnosticar una fractura dentoalveolar?
- A: TAC.
 - B: Radiografía periapical.
 - C: Radiografía oclusal.
 - D: Proyección de Waters.
- 33 ¿Hacia dónde se laterodesvía el mentón en una elongación hemimandibular?
- A: Hacia el mismo lado.
 - B: Hacia el lado contralateral.
 - C: El sobre crecimiento se produce en el plano vertical.
 - D: No hay laterodesviación ni sobrecrecimiento.

- 34 Son manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca todas ellas EXCEPTO:
- A: Piel pálida y fría.
 - B: Sudoración.
 - C: Disnea de esfuerzo.
 - D: Sialorrea.
- 35 ¿A partir de qué cantidad de flúor en agua aparece fluorosis endémica que altera la estructura del esmalte?
- A: Una parte por millón (ppm).
 - B: 2 ppm.
 - C: 5 ppm.
 - D: 8 ppm.
- 36 Señale la respuesta INCORRECTA en cuanto a la adhesión dentaria.
- A: La adhesión a dentina se perjudica cuando se contamina con un agente hemostático.
 - B: El uso de eugenol interfiere en la adhesión de espigas radiculares.
 - C: La adhesión disminuye después del blanqueamiento con peróxido de carbamida.
 - D: La adhesión tiene una interferencia aún mayor con el perborato sódico respecto al peróxido de carbamida.
- 37 Respecto a la promoción de la salud como primer nivel de prevención, señale la respuesta correcta:
- A: Son actividades dirigidas a prevenir una enfermedad en particular.
 - B: Es un nivel inespecífico.
 - C: Consiste en el diagnóstico y tratamiento precoz.
 - D: Su fin es limitar el grado de incapacidad producida por la enfermedad.
- 38 Según la clasificación de Angle de las maloclusiones, ¿qué clase se relaciona, en ocasiones, con una alteración en la deglución?
- A: Clase I.
 - B: Clase II.
 - C: Clase II. División 2.
 - D: Clase III.
- 39 En cuanto a la preparación del diente tallado, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Durante la preparación de un diente pilar se produce una agresión definitiva de su integridad.
 - B: La excesiva reducción del muñón con exposición pulpar o un excesivo incremento de la presión y temperatura durante el tallado son factores que afectan la vitalidad pulpar.
 - C: La contaminación bacteriana puede afectar la vitalidad pulpar.
 - D: El contraángulo multiplicador (de anillo rojo) genera mayor incremento de temperatura que la turbina.
- 40 Paciente con antecedente de toma de bifosfonato, se encuentra asintomático, pero con hueso expuesto. Según la Sociedad Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales (AAOMS) corresponde grado:
- A: Grado 0.
 - B: Grado 1.
 - C: Grado 2.
 - D: Grado 3.

- 41 Un signo de toxicidad sistémica por anestésico local es:
- A: Aumento de la presión intraocular.
 - B: Convulsiones.
 - C: Hipoglucemia severa.
 - D: Hiperuricemia.
- 42 Respecto al síndrome de Sjögren, es cierto:
- A: Es una enfermedad aguda de origen infeccioso.
 - B: Es una enfermedad aguda de origen autoinmune.
 - C: Es una enfermedad crónica de origen infeccioso.
 - D: Es una enfermedad crónica de origen autoinmune.
- 43 ¿A qué se denomina Síndrome de Eagle?
- A: Síntomas generados por la elongación exagerada del proceso estiloides.
 - B: Daño vascular primario y necrosis del hueso medular condíleo.
 - C: Malformación mandibular que implica cambios tanto en el tamaño como en la morfología del cuello y la cabeza del cóndilo.
 - D: Enfermedad degenerativa no inflamatoria de la articulación temporomandibular.
- 44 Al realizar una radiografía de "aleta de mordida", ¿cuándo podemos utilizar una resina de baja viscosidad?
- A: En esmalte profundo E2 y esmalte superficial E1.
 - B: En D1 lesión dentina superficial.
 - C: En lesión esmalte profundo E2.
 - D: En lesión esmalte superficial E1.
- 45 El feto urémico, con disgeusia, puede ser manifestación oral de:
- A: Fracaso renal.
 - B: Hipertiroidismo.
 - C: Pacientes que toman warfarina.
 - D: Glaucoma.
- 46 El orden de la incidencia de las inclusiones dentarias según Pifarre es:
- A: Tercer molar inferior, tercer molar superior, canino superior, premolares inferiores, canino inferior, premolares superiores, incisivo central, lateral superior.
 - B: Canino superior, tercer molar inferior, tercer molar superior, canino inferior, premolares superiores, premolares inferiores, incisivo central, incisivo lateral.
 - C: Tercer molar inferior, tercer molar superior, canino superior, canino inferior, premolares superiores, premolares inferiores, lateral superior, incisivo central.
 - D: Canino superior, tercer molar superior, tercer molar inferior, premolares inferiores, canino inferior, premolares superiores, incisivo central, lateral superior.
- 47 Tras una luxación dentaria, la necrosis pulpar y la reabsorción radicular, son más frecuentes en:
- A: Dientes intruidos con formación radicular incompleta.
 - B: Dientes intruidos con formación radicular completa.
 - C: Dientes con luxación vestibular.
 - D: Dientes con luxación lateral.

- 48 En los criterios ICDAS II para la detección de caries en esmalte y dentina, una microactividad en esmalte seco < 0,5 mm corresponde a un ICDAS II:
- A: 1.
 - B: 2.
 - C: 3.
 - D: 4.
- 49 En paciente con parálisis cerebral espástica sometido a atención bucodental, ¿cuál es el principal reto clínico?
- A: Riesgo de aspiración por hipersalivación y reflejo deglutorio alterado.
 - B: Dificultad de anestesia infiltrativa.
 - C: Predisposición a infecciones respiratorias.
 - D: Mayor incidencia de displasia ósea craneofacial.
- 50 En cuanto a los materiales de obturación de conductos radiculares, deben cumplir las siguientes características EXCEPTO:
- A: Estables dimensionalmente, asegurando una buena contracción tras su introducción.
 - B: Impermeables, sin solubilizar en medio húmedo.
 - C: Con capacidad bacteriostática.
 - D: Radiopacos.
- 51 ¿Cual de los siguientes NO es un objetivo de la epidemiología en odontología?
- A: Describir la distribución y magnitud de las enfermedades orales y sus factores de riesgo.
 - B: Estudiar la historia natural y el pronóstico de la enfermedad.
 - C: Evaluar nuevas formas preventivas y terapéuticas.
 - D: Entorpecer el desarrollo de políticas públicas y decisiones normativas dirigidas a la protección de la salud de las poblaciones.
- 52 ¿En qué Orden del Departamento de Sanidad se recoge que, el Departamento competente en materia de salud garantiza la asistencia bucodental a toda la población infantil y juvenil protegida por el Sistema Público Sanitario de Aragón y cuya edad esté comprendida entre los 6 y los 13 años, ambos inclusive o entre los 6 y los 16 años, si presentan alguna discapacidad definida en los términos establecidos en el artículo sexto?
- A: Orden de 28 de marzo de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prestación de la atención sanitaria bucodental a la población infantil y juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 - B: Orden de 21 de diciembre de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la que se actualiza la cartera de servicios sanitarios del Sistema Aragonés de Salud en materia de atención bucodental a la población infantil y juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 - C: Orden SAN/286/2022, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden de 28 de marzo de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prestación de la atención sanitaria bucodental a la población infantil y juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 - D: Orden SND/606/2024, de 13 de junio, por la que se crea el Comité Asesor para la Cartera Común de Servicios en el Área de Genética, y por la que se modifican los anexos I, II, III, VI y VII del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

- 53 ¿Qué cantidad de calcio para evitar la decalcificación o pérdida de los dientes debe de tomar la embarazada además de las necesidades nutricionales generales?
- A: 1.000 mg/día.
 - B: 500 mg/día.
 - C: 1.500 mg/día.
 - D: La toma de calcio es completamente injustificada por este motivo.
- 54 ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en la patología de la articulación temporomandibular?
- A: Dolor, acufenos y limitación en la apertura oral.
 - B: Dolor, chasquido y limitación en la apertura oral.
 - C: Crepitación, dolor y latero desviación.
 - D: Acufenos, chasquidos y crepitación.
- 55Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA acerca de la clasificación de las maloclusiones de Angle:
- A: En la clase I la cúspide mesiovestibular del primer molar superior coincide con el surco mesiovestibular del primer molar inferior.
 - B: En la clase II la mandíbula está en relación distal respecto al maxilar superior.
 - C: En la clase II división 2 los incisivos superiores están protruidos.
 - D: En la clase III la oclusión mandibular está en relación mesial con respecto al maxilar superior.
- 56 Presentan diascopia positiva (palidece a la presión), las siguientes lesiones por modificación del color de la mucosa oral. Señala la respuesta INCORRECTA:
- A: Angioma.
 - B: Equimosis.
 - C: Teleangiectasias.
 - D: Varicosidades linguales.
- 57 ¿Cuál de los siguientes NO es un tiempo de la exodoncia?
- A: Impulsión.
 - B: Tracción.
 - C: Elevación.
 - D: Prehensión.
- 58 Un paciente acude a consulta con lesiones orales crónicas indoloras en la mucosa bucal y fiebre. Se sospecha tuberculosis oral. Respecto a las pruebas complementarias, indique la respuesta correcta:
- A: La prueba de Mantoux positiva indica infección activa por Mycobacterium tuberculosis, mientras que el VDRL positivo confirmaría coinfección con Treponema Pallidum.
 - B: La tinción de Ziehl-Neelsen en la biopsia de la lesión oral, es esencial para identificar bacilos ácido-alcohol resistentes.
 - C: La serología treponémica (FTA-ABS) es suficiente para diagnosticar tuberculosis oral y diferenciarla de sífilis.
 - D: La radiografía de tórax tiene un valor diagnóstico exclusivo para sífilis oral, siendo irrelevante para tuberculosis.

- 59 La aparición de ulceraciones orales y genitales, inflamación de cartílagos (policondritis recidivante) y artritis es característica de:
- A: Síndrome de Sweet.
 - B: Síndrome de Sutton.
 - C: Artritis reactiva (Síndrome de Reiter).
 - D: Síndrome de MAGIC.
- 60 Señale el cemento o base cavitaria que inhibe el crecimiento bacteriano:
- A: Cemento de silicato.
 - B: Cemento de policarboxilato.
 - C: Cemento de fosfato de zinc.
 - D: Cemento de resina.
- 61 Indique la opción correcta:
- A: El número de glándulas salivares menores en cavidad oral oscila entre 2.000-3.000.
 - B: El conducto excretor de la glándula submaxilar se llama conducto de Rivinus.
 - C: El estímulo parasimpático (efecto colinérgico) aumenta la secreción salival.
 - D: El interior de la glándula submaxilar discurre el nervio facial.
- 62 En un paciente tratado con acenocumarol, cuál de los siguientes fármacos es el más prudente para el manejo del dolor dental:
- A: Ibuprofeno.
 - B: Paracetamol.
 - C: Ketorolaco.
 - D: Naproxeno.
- 63 En relación a la mucosa oral, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El estrato espinoso es una de las capas que forman el corion de la mucosa oral.
 - B: La membrana basal está formada por la lámina basal y la lámina reticular.
 - C: La lámina propia o corion, está formada principalmente por tejido conectivo.
 - D: La mucosa masticatoria suele carecer de submucosa, lo que le otorga mayor resistencia mecánica.
- 64 ¿Cuál no es una complicación postoperatoria?
- A: Equimosis.
 - B: Infección.
 - C: Alveolitis seca.
 - D: Perforación sinusal.
- 65 ¿Cuál de los siguientes periodos no forma parte del proceso de osteodistracción?
- A: Osteotomía.
 - B: Periodo de latencia.
 - C: Periodo de pseudoartrosis.
 - D: Periodo de distracción.

- 66** En cuanto al paciente con insuficiencia renal crónica, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Las tartrectomías periódicas, raspados y alisados radiculares, pueden tener un efecto positivo oral y sistémico siempre que estén indicadas.
 - B: Para la hiposialia/xerostomía está indicado el uso de caramelos sin azúcar de sabores ácidos, chicles sin azúcar sustitutos salivales.
 - C: Para la halitosis (fedor urémico) no existe un tratamiento específico y hay que descartar otras causas (caries, gingivitis, periodontitis).
 - D: El tratamiento dental se debe realizar el día previo a la diálisis.
- 67** Paciente tratada de cáncer de mama con radioterapia hace 5 meses, no otros datos significantes. ¿Cuánto tiempo debo esperar para realizar extracciones dentales?
- A: Debo esperar 6 meses.
 - B: Puedo realizar la extracción.
 - C: Debo esperar 12 meses.
 - D: Realizo interconsulta a su médico especialista en Oncología Radioterápica para que me autorice realizar la extracción.
- 68** ¿Cuál NO es una indicación para las exodoncias quirúrgicas?
- A: Intento infructuoso de exodoncia simple.
 - B: Pacientes mayores de 50 años.
 - C: Reabsorción dentinaria.
 - D: Dientes endodonciados.
- 69** ¿Cuánto tiempo debe conservarse la Historia Clínica del paciente?
- A: Como mínimo 5 años desde la primera visita del paciente.
 - B: Como mínimo 5 años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial.
 - C: Como mínimo 10 años desde la primera visita del paciente.
 - D: Como mínimo 10 años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial.
- 70** En cuanto a los sistemas de prevención de infecciones, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El desinfectante ideal debe ser de amplio espectro, de acción rápida y NO corrosivo.
 - B: El cloro es recomendado para superficies duras, es inestable y corroe.
 - C: El glutaraldehído al 2 % destruye virus, bacterias y hongos.
 - D: Los fenoles son de elección para material quirúrgico por su eficacia contra la materia orgánica.
- 71** Respecto al épulis, indique la respuesta INCORRECTA:
- A: El épulis del embarazo suele regresar espontáneamente tras el parto.
 - B: El épulis del embarazo se desencadena por la hiperestrogenia del segundo trimestre gestacional.
 - C: El épulis fisuratum es causado por una irritación continuada de la encía por llevar una prótesis mal ajustada.
 - D: El épulis del niño suele aparecer a los 6-7 años de edad, durante el periodo de dentición transicional.
- 72** En la histopatología de la caries dental, señale la respuesta correcta:
- A: La zona traslúcida es el frente de avance de la caries.
 - B: La zona superficial es una capa de remineralización a partir de iones de la zona oscura.
 - C: La zona oscura es el núcleo real del proceso carioso.
 - D: La zona central es una zona remineralizada con una porosidad del 10 % - 25 %.

- 73** ¿Qué es un diente de Turner?
- A: Un "dens invaginatus".
 - B: Un diente permanente que erupciona fuera de su lugar.
 - C: Un diente con dentinogénesis imperfecta tipo II.
 - D: Un diente permanente con defecto en el esmalte por infección o traumatismo.
- 74** ¿Qué tipo de diseño epidemiológico es experimental y analítico?
- A: Los transversales.
 - B: Los Casos Controles.
 - C: Los Cohortes.
 - D: Los Ensayos.
- 75** Con respecto al diagnóstico diferencial entre enfermedad pulpar y periodontal señale la respuesta INCORRECTA:
- A: En la enfermedad pulpar la vitalidad es negativa.
 - B: En la enfermedad periodontal la vitalidad es positiva.
 - C: En la enfermedad periodontal siempre hay una bolsa única y estrecha.
 - D: En la enfermedad pulpar NO hay pérdida de hueso vertical.
- 76** En niño con hipomineralización incisivo-molar (HIM), según el protocolo de la SESPO, señale la respuesta correcta:
- A: La recomendación de aplicación de barniz de flúor de 22.600 ppm es de una vez al mes.
 - B: El dentífrico fluorado se recomienda como mínimo de 2.450 ppm.
 - C: Los colutorios de clorhexidina no se recomiendan.
 - D: Existe la recomendación de selladores de fisuras.
- 77** ¿Qué trastorno endógeno NO está asociado a retraso en la erupción dentaria?
- A: Enfermedad de Crohn.
 - B: Síndrome de Down.
 - C: Hipotiroidismo.
 - D: Síndrome de Gardner.
- 78** Durante una extracción de tercer molar superior, se luxa el diente accidentalmente hacia la fosa pterigopalatina. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado en la consulta dental?
- A: Intentar extracción inmediata con pinzas rectas y espejo nasal.
 - B: Realizar una incisión transmaxilar para acceder al diente desde el vestíbulo.
 - C: Indicar antibióticos y esperar reabsorción espontánea.
 - D: Derivar al hospital para evaluación radiológica avanzada y tratamiento quirúrgico.
- 79** Paciente de edad avanzada en tratamiento con Simvastatina, Hidroferol, Fenitoína y Morfina acude a consulta con encías de tamaño mayor al habitual. Señale la INCORRECTA:
- A: La hiperplasia gingival en casos como el del paciente suele detectarse en sector anterior.
 - B: La combinación de buena higiene oral y reducción de factores irritativos disminuye la severidad.
 - C: El hidroferol se asocia a tratamiento de déficit de vitamina D.
 - D: Planteo cirugía periodontal como tratamiento definitivo.

- 80** Las causas más frecuentes de una fractura vertical son todas las siguientes EXCEPTO:
- A: En la masticación, al morder un alimento muy duro.
 - B: Durante el tratamiento periodontal.
 - C: En la preparación para pernos.
 - D: Por un traumatismo.
- 81** ¿Cuál es la dosis máxima segura recomendada de mepivacaína al 2 % con vasoconstrictor (1:100.000) para un adulto sano de 70 kg, para evitar toxicidad sistémica?
- A: 350 mg (9,7 carpules).
 - B: 480 mg (13,3 carpules).
 - C: 140 mg (3,8 carpules).
 - D: 210 mg (5,8 carpules).
- 82** Según las recomendaciones de la Guía de Sociedad Europea de Cardiología 2023, ¿qué pauta de profilaxis antibiótica se considera más adecuada para la prevención de endocarditis infecciosa en un paciente adulto, con historia de angioedema por uso de ampicilina, que va a someterse a cirugía oral?
- A: Cefalexina 2 gramos oral, dosis única 30 min - 60 min antes de la cirugía.
 - B: Clindamicina 600 mg. oral, dosis única 30 min - 60 min antes de la cirugía.
 - C: Azitromicina 500 mg oral, dosis única 30 min - 60 min antes de la cirugía.
 - D: Amoxicilina 2 gramos oral, dosis única 30 min - 60 min antes de la cirugía.
- 83** Respecto al quiste dentígero, es correcto:
- A: Es un quiste odontogénico del desarrollo o quiste verdadero.
 - B: Está asociado a la raíz del diente.
 - C: Está asociado a la corona de un diente erupcionado.
 - D: Es más frecuente en maxilar superior.
- 84** ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre la Historia Clínica es INCORRECTA?
- A: Constituye un documento médico que permite ser evaluado en el tiempo.
 - B: Es un elemento concluyente en la investigación clínica.
 - C: Es un documento médico legal.
 - D: No permite evaluar la calidad de la atención a través de auditorías.
- 85** ¿Cuáles de las siguientes NO es una indicación básica de la cirugía periapical?
- A: Fracaso del tratamiento convencional de conductos.
 - B: Si la lesión es menor de 5 mm.
 - C: Cuando es imposible realizar el retratamiento de una endodoncia fracasada.
 - D: Si se requiere una biopsia de la lesión.
- 86** ¿Cuál de los siguientes NO es un Síndrome Doloroso cuasante de Algias Oro-Maxilofaciales?
- A: Síndrome de Mevullegar.
 - B: Síndrome de Trotters.
 - C: Síndrome de Eagle
 - D: Síndrome de Horton.

- 87 ¿Cuál es el tratamiento de la luxación de la ATM?
- A: Maniobra de Nelaton.
 - B: Artrocentesis.
 - C: Artroscopia.
 - D: Analgesia y relajantes musculares.
- 88 El tratamiento inicial más importante ante una infección odontógena apical es:
- A: Antibiótico.
 - B: Drenaje.
 - C: Clorhexidina y analgesia.
 - D: Corticoide.
- 89 De los siguientes virus hepatotropos señale cuál de ellos es un virus ADN:
- A: Virus hepatitis A.
 - B: Virus hepatitis B.
 - C: Virus hepatitis C.
 - D: Virus hepatitis D.
- 90Cuál de los siguientes antisépticos bucales presenta mayor sustentividad sobre superficies dentarias y tejidos blandos:
- A: Povidona yodada.
 - B: Triclosan.
 - C: Peróxido de hidrógeno al 2 %.
 - D: Clorhexidina.
- 91 Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la caries de fosas y fisuras.
- A: El ataque suele producirse a partir de la zona infundibular periférica.
 - B: La profundidad de la fisura posee efecto directo sobre la susceptibilidad dental.
 - C: La caries de fisura es la lesión mas frecuente entre los niños y los adolescentes.
 - D: Si no se realiza una intervención adecuada, la progresión es inevitable.
- 92 Indique la respuesta INCORRECTA en relación a las compresiones torácicas durante una reanimación cardiopulmonar básica en un adulto (European Resuscitation Council ERC 2021):
- A: La frecuencia adecuada es 80 - 100 por minuto.
 - B: La profundidad sugerida es 5 - 6 cm.
 - C: La zona de aplicación es la mitad inferior del esternón (centro del pecho).
 - D: La relación de compresión/ventilación es 30:2.
- 93 Debe realizar una extracción dental a última hora de la mañana, por patología infecciosa del paciente. ¿Qué fármaco pensaríamos que toma nuestro paciente?
- A: Tenofovir (TARGA).
 - B: Formoterol (Agonista Beta 2).
 - C: Captopril (IECA).
 - D: Denosumab (Anticuerpo Monoclonal).

- 94 En la interpretación de una resonancia magnética de la región mandibular, un hallazgo de señal alterada en el espacio pterigomandibular sugiere sospecha de absceso profundo. ¿Cuál es el signo característico que apoyaría ese diagnóstico?
- A: Engrosamiento uniforme de los músculos mastoideos.
 - B: Realce periférico tras gadolinio, con centro hipointenso en T1, brillante en T2 en imagen de edema circundante.
 - C: Hiperseñal en T1 sin contraste.
 - D: Ausencia de cambio en T2.
- 95 La leucoplasia oral vellosa, se trata de una lesión de mucosa yugal asociada a:
- A: Treponema pallidum.
 - B: Virus Epstein-Barr.
 - C: VHA.
 - D: VHD.
- 96 Indique la respuesta correcta:
- A: El cáncer de la mucosa yugal supone el 10 % de todos los tumores intraorales.
 - B: Si existe afectación de la musculatura masticatoria por una lesión maligna es habitual que el paciente asocie trismus en la apertura mandibular.
 - C: El 20 % de los cánceres epidermoides en cavidad oral se presentan bajo la forma: vegetante, verrucosa y ulcerada.
 - D: Entre los factores etiopatogénicos más frecuentes de cáncer oral se encuentra el papiloma y el mucocele.
- 97 En pacientes con Trastornos del Espectro Autista ¿Qué estrategia sería INCORRECTA?
- A: Priorizar rapidez de tratamiento.
 - B: Mantener estructura de cita predecible.
 - C: Reducir estimulación sensorial.
 - D: Usar pictogramas o fotografías.
- 98 Si se sospecha al explorar a un paciente de una posible GUNA interdental, ¿qué técnica de cepillado manual indicaríamos?
- A: Método de Bass.
 - B: Método de Charters.
 - C: Método de Stillman.
 - D: Técnica de Starkey.
- 99 Causa más frecuente de traumatología dentaria:
- A: Choque deportivo.
 - B: Caída.
 - C: Agresión.
 - D: Accidente de tráfico.
- 100 ¿Cuál es una razón para usar resonancia magnética en lugar de radiografía o CBCT en un paciente con sospecha de masa blanda en espacio sublingual?
- A: Porque la RM tiene mayor resolución del esmalte dental.
 - B: Porque evalúa tejidos blandos sin exposición a radiación ionizante.
 - C: Porque siempre da diagnósticos más económicos.
 - D: El CBCT no permite ver hueso.

- 101** En la dentina, ¿dónde se encuentra la concentración de flúor más intensa?
- A: Parte periférica.
 - B: Parte interna.
 - C: Parte media.
 - D: No hay diferencia en su distribución.
- 102** Respecto a la Leucoplasia, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Se asocia al consumo de alcohol.
 - B: El hábito más relacionado en su aparición es el tabaquismo.
 - C: Se ha visto relación con el *Treponema pallidum*.
 - D: Es más frecuente en hombres.
- 103** ¿Qué antibiótico puede utilizarse durante todo el embarazo?
- A: Tetraciclina.
 - B: Neomicina.
 - C: Espiramicina.
 - D: Gentamicina.
- 104** En cuanto a la retención y estabilidad entre el diente tallado y la restauración, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: La retención es la unión física entre el diente y la restauración, que impide la separación de ambos, siguiendo el eje longitudinal del diente.
 - B: La retención viene condicionada por el paralelismo entre las paredes opuestas de un mismo diente y entre las de un diente pilar con otro diente pilar de un puente.
 - C: Las formas que se oponen al giro como los ángulos rectos, agudos y las rieleras mejoran la retención.
 - D: A mayor longitud de paredes mayor retención.
- 105** Al realizar un Índice Gingival nos encontramos que presenta una inflamación moderada con enrojecimiento, hinchazón, sangrado al sondaje y a la presión. Esto nos sugiere una puntuación de este Índice de:
- A: 0.
 - B: 1.
 - C: 2.
 - D: 3.
- 106** En relación con las ampollas intraepiteliales en la mucosa oral, señale la opción correcta:
- A: Se producen por acantólisis, es decir, pérdida de cohesión entre queratinocitos.
 - B: Se localizan siempre en la lámina propia.
 - C: Son características exclusivas del pénfigoide ampolloso.
 - D: Suelen contener líquido hemorrágico y aparecen únicamente en pacientes con enfermedad sistémica grave.
- 107** En el diagnóstico radiográfico de un tercer molar, ¿qué hallazgo NO sugiere mayor riesgo de lesión del nervio dentario inferior?
- A: Ápice radicular bífido y de radiopacidad disminuida.
 - B: Banda de opacidad aumentada en raíces del tercer molar, coincidiendo con el canal.
 - C: Interrupción de la continuidad de la línea radiopaca de la cortical del canal mandibular al cruzar la raíz.
 - D: Estrechamiento de la banda radiolúcida del canal mandibular al cruzar las raíces del tercer molar.

108 Indique la respuesta INCORRECTA respecto al hemangioma:

- A: El síndrome de Mafucci se trata de hemangiomas y condromas situados en piel y mucosa oral.
- B: El síndrome de Sturge-Weber se caracteriza por la triada: nevo flamígeo distribuido por las tres ramas del nervio trigémino, angiomas a nivel de corteza cerebral y alteraciones oculares.
- C: El síndrome de Sturge-Weber se caracteriza por la triada: nevo flamígeo distribuido por las tres ramas del nervio trigémino, angiomas a nivel de corteza cerebral y alteraciones auditivas.
- D: El síndrome de Rendu-Osler corresponde a la telangiectasia familiar hereditaria.

109 La mejor forma de favorecer actitud positiva de un niño ante futuras consultas:

- A: Tratamientos complejos en la primera visita.
- B: Separar al niño de los padres.
- C: Visitas preventivas tempranas no asociadas a dolor.
- D: Aplazar contacto hasta erupción de piezas permanentes.

110 ¿Cuál es la relación de la mandíbula con respecto al maxilar superior, si el complejo cóndilo disco está correctamente alineado y se encuentra en la posición más posterosuperior contra el tubérculo articular?

- A: Relación céntrica.
- B: Máxima intercúspidación.
- C: Oclusión borde a borde.
- D: Sobremordida.

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

[illegible]