

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resoluciones de 3 de abril de 2025 y 25 de julio de 2025 de la Gerencia del Servicios
Aragones de Salud

CATEGORÍA:

PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número **1 a 10**, ambas incluidas.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA

- 1 En el Plan Integral para la Gestión de la Diversidad Cultural de Aragón 2022-2025 se establecen 3 líneas estratégicas, señale la respuesta FALSA:
 - A: Inclusión y acogida
 - B: Convivencia intercultural
 - C: Ciudadanía activa y refuerzo institucional
 - D: Discusión socio-política
- 2 ¿Cuál de las siguientes premisas es verdadera en relación con la cartera de servicios del sistema sanitario público?
 - A: Las Comunidades Autónomas podrán elaborar sus propias carteras de servicios sin la obligación de incluir la común del Sistema Nacional de Salud.
 - B: En los anexos del proyecto de cartera de servicios no está incluida la prestación ortoprotésica.
 - C: En el RD 1030/2006 por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes del SNS no se establece el procedimiento para su actualización.
 - D: Su establecimiento garantiza la equidad y la accesibilidad, así como la efectividad y la seguridad de las técnicas, tecnologías y procedimientos incluidos en ella.
- 3 Acerca del Consentimiento Informado (CI), señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
 - A: El CI es de conformidad libre, voluntario y consciente de un paciente, en pleno uso de sus facultades y después de recibir información adecuada, para que tenga lugar una aceptación que afecta a su salud.
 - B: La información recibida por el paciente debe entenderse como un proceso gradual y continuado a lo largo de todo el proceso asistencial.
 - C: El CI persigue, como principales finalidades, dejar constancia documental y servir de medio de apoyo para facilitar la transmisión de información del paciente.
 - D: El documento de CI exonera de responsabilidad al profesional en el desarrollo de sus actuaciones.
- 4 ¿Qué característica de las siguientes NO describe el Atlas de Variaciones de la práctica médica?
 - A: Es una iniciativa de investigación liderada por el grupo de ciencia de datos para la investigación en servicios sanitarios y políticas del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
 - B: En él se “cartografía” el desempeño de los cuidados sanitarios para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
 - C: Se representa la efectividad, calidad, seguridad y eficiencia del SNS español.
 - D: Describe las variaciones justificadas.
- 5 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el consentimiento en el tratamiento de datos personales es correcta según la Ley Orgánica 3/2018?
 - A: El consentimiento puede ser tácito si el interesado no se opone expresamente.
 - B: El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco.
 - C: El consentimiento puede ser sustituido por el interés comercial del responsable del tratamiento.
 - D: El consentimiento no es necesario si los datos se obtienen de redes sociales.

- 6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo común es correcta según la Ley 39/2015?
- A: Todos los plazos administrativos se computan en días naturales.
 - B: Si el último día del plazo es inhábil, el plazo se prorroga automáticamente al siguiente día hábil.
 - C: El mes de agosto se considera inhábil en todo procedimiento administrativo.
 - D: Los plazos por meses se computan desde el día 1 del mes siguiente a la notificación.
- 7 El número de protocolos asistenciales de un centro sanitario es un indicador de calidad asistencial de:
- A: Estructura
 - B: Proceso
 - C: Resultados
 - D: Eficiencia
- 8 ¿Qué se entiende por eficiencia de un servicio sanitario?
- A: La medida en que un servicio sanitario mejora el estado de salud de la población al menor coste posible.
 - B: La posibilidad que un sujeto tiene de ser atendido por el sistema sanitario independientemente de su condición social, sexo o lugar de nacimiento.
 - C: La mejora del estado de salud de la población obtenida por un servicio sanitario en condiciones habituales o reales de actuación.
 - D: La medida en que un servicio sanitario alcanza sus objetivos de mejora del estado de salud de la población a la cual atiende.
- 9 Sobre los principios de la potestad disciplinaria del personal estatutario de los servicios de salud, señale la afirmación correcta:
- A: Existirá la debida proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción impuesta.
 - B: No es necesaria ninguna proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción impuesta.
 - C: La potestad disciplinaria corresponde al Ministerio Fiscal.
 - D: Sólo corresponde al Ministerio Fiscal fijar la debida proporcionalidad entre infracción y sanción.
- 10 ¿Qué es cierto en relación con los Valores Predictivos de una prueba?
- A: El valor predictivo positivo de una prueba se define como la probabilidad de que un enfermo sea negativo en el resultado de la misma.
 - B: En la estimación del valor predictivo positivo influye la prevalencia.
 - C: El valor predictivo de la prueba negativa se define como la probabilidad de que un resultado negativo corresponda a un enfermo.
 - D: No son de interés en la valoración de la eficacia de una prueba diagnóstica.
- 11 El soplo eyectivo pulmonar se caracteriza:
- A: Por ser un soplo sistólico vibratorio, de Still.
 - B: Se ausculta con mayor intensidad en foco aórtico.
 - C: Suele oírse en adolescentes delgados con anomalías torácicas como cifoescoliosis, o pectus excavatum.
 - D: Es exclusivamente diastólico.

- 12** En el abordaje del asma de difícil control en pediatría, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la más adecuada?
- A: La presencia de buena adherencia terapéutica y de técnica inhalatoria adecuada permiten descartar la necesidad de investigar comorbilidades o diagnósticos alternativos.
 - B: Antes de considerar que un niño tiene asma de difícil control, es esencial descartar diagnósticos alternativos, revisar la adherencia al tratamiento y los factores ambientales.
 - C: Los fármacos nunca pueden ser causantes del mal control.
 - D: El sobrepeso mejora la evolución clínica.
- 13** Niño de 5 años con fiebre, eritema facial tipo "mejillas abofeteadas" y exantema reticulado en brazos y piernas. Madre embarazada de 12 semanas. Indica la medida más correcta:
- A: Aislamiento respiratorio del niño hasta resolución del exantema.
 - B: Administrar inmunoglobulina específica a la madre.
 - C: Explicar que el niño ya no es contagioso y realizar seguimiento serológico materno.
 - D: Iniciar profilaxis antiviral con aciclovir a la madre.
- 14** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Síndrome de Klinefelter es correcta?
- A: Se trata de una enfermedad rara con una prevalencia inferior a 5 casos por cada 10.000 habitantes.
 - B: El cariotipo más frecuente es el 47,XXY.
 - C: Más del 90% de los pacientes desarrollan ginecomastia.
 - D: Cursa con talla alta y testículos de tamaño pequeño.
- 15** ¿Qué enfermedad sospecharía ante un lactante con fiebre de origen desconocido, en presencia de exantema eritematodescamativo similar a una dermatitis seborreica, pancitopenia, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías y una lesión osteolítica en cráneo?
- A: Sarcoma de Ewing.
 - B: Leucemia mieloide.
 - C: Histiocitosis de Langerhans.
 - D: Lupus eritematoso sistémico.
- 16** ¿Cuál de los siguientes indicadores se utiliza para evaluar la calidad de la prescripción antibiótica en Atención Primaria?
- A: Número de visitas al centro de salud.
 - B: Porcentaje de prescripciones con antibióticos de reserva.
 - C: Porcentaje de prescripciones con antibióticos en infecciones víricas.
 - D: Porcentaje de prescripciones ajustadas a guías clínicas.
- 17** De los siguientes tumores, el que tiene mayor tendencia a diseminarse por el líquido cefalorraquídeo es:
- A: Astrocitoma pilocítico
 - B: Ependimoma
 - C: Meduloblastoma
 - D: Craneofaringioma

- 18** Respecto a la talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (RCCD), señale la respuesta correcta:
- A: Los pacientes afectos de talla baja familiar tienen un ritmo madurativo normal (edad ósea y pubertad normal) con velocidad de crecimiento disminuida en edad puberal y talla final normal.
 - B: Los pacientes con RCCD tienen una maduración lenta, con velocidad de crecimiento disminuida a partir de los 7-8 años, edad ósea retrasada y la mayoría alcanza una talla adulta normal y acorde a la talla familiar.
 - C: En los pacientes con RCCD se considera una edad ósea retrasada aquella con un retraso mayor o igual a un año la edad cronológica.
 - D: Los pacientes con talla baja familiar tienen una talla baja al nacimiento, edad ósea normal y velocidad de crecimiento normal.
- 19** El modelo más adecuado para abordar la entrevista clínica en Pediatría es:
- A: Modelo biomédico
 - B: Modelo paternalista
 - C: Modelo biopsicosocial
 - D: Modelo directivo
- 20** Niña de 8 años de edad que consulta por presentar una lesión pigmentada en el tercio superior de la espalda, de unos 5 mm de diámetro máximo, que ha desarrollado a su alrededor una zona de menor pigmentación. No presenta prurito y como antecedentes destaca un primo con melanoma intervenido a los 9 años de edad. ¿Cuál sería su diagnóstico?
- A: Nevus de Meyerson.
 - B: Vitíligo.
 - C: Melanoma maligno en regresión.
 - D: Nevus de Sutton.
- 21** Sobre la taquicardia de QRS ancho, ¿qué pensaríamos?
- A: Podría ser una Taquicardia Supraventricular.
 - B: Si predominan las ondas P sobre los complejos QRS pensaríamos en Taquicardia ventricular.
 - C: La taquicardia supraventricular ectópica de la unión responde a Cardioversión.
 - D: La taquicardia supraventricular de reentrada nodal no responde a Cardioversión.
- 22** Con respecto al Programa de Salud Bucodental de Aragón, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Dentro de la asistencia dental básica están incluidas las extracciones de piezas temporales y permanentes.
 - B: Pueden solicitar cita en su Centro de Salud, a través del teléfono de Salud Informa o llamando directamente a la clínica privada elegida.
 - C: Para acceder se precisa presentar la tarjeta sanitaria del menor y su Documento Nacional de Identidad.
 - D: La atención sanitaria especial incluye tratamientos protésicos por caries de piezas permanentes en niños con enfermedades sistémicas que afecten gravemente al estado de salud.
- 23** Señale cual de estas recomendaciones es INCORRECTA para el tratamiento del acné:
- A: Acné comedónico: tratamiento tópico en monoterapia con adapaleno o peróxido de benzoilo.
 - B: Acné leve - moderado inflamatorio: Combinación tópica Adapaleno/isotretinoína + eritromicina.
 - C: Acné leve - moderado inflamatorio: Combinación tópica de peróxido de benzoilo + adapaleno.
 - D: Acné moderado: Combinación tópica de adapaleno con clindamicina + doxiciclina oral a dosis de 50 - 100 mg cada 24 horas, durante 3-6 meses.

- 24 Según las recomendaciones de PrevInfad sobre la profilaxis con vitamina K en el recién nacido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- A: Todos los recién nacidos deben recibir 1 mg de vitamina K intramuscular, sin excepciones por peso.
 - B: La pauta oral alternativa consiste en una dosis única de 2 mg al nacimiento.
 - C: La vía intravenosa está contraindicada por riesgo de hemorragia intracraneal.
 - D: La pauta oral alternativa requiere de 3 dosis de 2mg.
- 25 En la aproximación diagnóstica de las Inmunodeficiencias primarias ¿qué signo de alarma se considera fundamental para sospechar inmunodeficiencia humoral?
- A: Fiebre alta persistente sin foco
 - B: Infecciones respiratorias bajas de repetición
 - C: Diarrea crónica
 - D: Pérdida ponderal
- 26 Indique la repuesta correcta respecto a la pubertad precoz:
- A: Edad de comienzo en niñas entre 8 y 9 años.
 - B: La edad ósea en la pubertad precoz es acorde a la edad cronológica.
 - C: La pubertad precoz de origen central es la causa más frecuente en ambos sexos.
 - D: La causa más frecuente de pubertad precoz en niñas es el hamartoma hipotalámico.
- 27 Respecto a la Campaña de vacunación 25/26 contra la gripe en Aragón indique la opción FALSA:
- A: Se recomienda a la población infantil entre 6 meses y 7 años.
 - B: Se inicia campaña de vacunación escolar para niños de primero a tercero de educación infantil.
 - C: En las cohortes de niños de 6 y 7 años se usará la vacuna intranasal prioritariamente.
 - D: En prematuros < 32 semanas, entre los 6 y 24 meses de edad, no vacunados previamente, la pauta será de una dosis.
- 28 Según la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 5.5), se considera factor asociado a la aparición de asma:
- A: Hipercolesterolemia.
 - B: Muy bajo peso al nacer < 1500 gramos.
 - C: Ibuprofeno.
 - D: Consumo de alcohol durante la gestación.
- 29 Referente a la meningitis bacteriana aguda en nuestro medio, ¿cuál de las siguientes correlaciones acerca de etiología más frecuente según la edad NO es cierta?
- A: En lactantes menores de un mes la etiología más frecuente incluye *S. agalactiae*, *E. coli* y *L. monocitogenes*.
 - B: En edades entre 3 y 10 años la etiología más frecuente se debe a *N. meningitidis* y bacilos gramnegativos.
 - C: En la franja de edad de 3 meses a 3 años los agentes causales más frecuentes son *N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, *S. agalactiae* y bacilos gramnegativos.
 - D: En la franja de edad entre 10 y 19 años el agente causal más frecuente es *N. meningitidis*.
- 30 Indique el enunciado FALSO respecto a los embarazos no deseados en adolescentes:
- A: La educación sexual y el asesoramiento sobre métodos anticonceptivos son la mejor prevención.
 - B: El diagnóstico suele ser tardío.
 - C: El centro escolar debe ser la principal fuente de educación afectiva y sexual.
 - D: En la consulta ante una paciente con amenorrea deberíamos realizar un test de embarazo.

- 31** En cuanto a las Espondilolistesis, ¿qué opción NO es correcta?
- A: 90 % de los casos son sintomáticas.
 - B: Son más frecuentes en L4 o L5.
 - C: Hay un defecto de osificación en la pars interarticularis.
 - D: Puede producir lordosis.
- 32** ¿Cuál es el tratamiento más recomendado para la agitación en la psicosis?
- A: Antihistamínicos.
 - B: Antieméticos.
 - C: Benzodiacepinas.
 - D: Haloperidol.
- 33** Indique de los siguientes alimentos cuál es más rico en calcio si consumimos 100 gramos:
- A: Leche de vaca
 - B: Leche oveja
 - C: Higos secos
 - D: Almendras
- 34** Señale la respuesta correcta respecto a la sinovitis transitoria de cadera:
- A: Es la causa no traumática más común de cojera en los niños menores de 3 años.
 - B: Es un cuadro de inicio insidioso de cojera con una duración de 3 semanas habitualmente.
 - C: En la ecografía siempre encontraremos derrame articular y en ocasiones también hipertrofia de la sinovial.
 - D: La exploración de la cadera es normal o presenta leve limitación de la abducción y/o de la rotación interna de la cadera.
- 35** Señale la INCORRECTA en cuanto al tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad:
- A: El tratamiento ambulatorio de elección de la neumonía típica no complicada en paciente correctamente vacunado frente al H. influenzae tipo b es la amoxicilina vo (80 - 90 mg/Kg/día cada 8 horas), 5 días.
 - B: El tratamiento ambulatorio de elección de la neumonía atípica es la azitromicina vo (10 mg/Kg/día cada 24 horas), 3 días.
 - C: El tratamiento ambulatorio de elección de la neumonía típica en pacientes con alergia a betalactámicos sin haber presentado anafilaxia es la azitromicina vo (10 mg/Kg/día cada 24 horas), 3 días.
 - D: El tratamiento de elección de la neumonía típica con criterios de ingreso o derrame pleural no complicado es la ampicilina iv seguida de amoxicilina vo hasta completar 7-10 días.
- 36** ¿Cuál es la prueba más utilizada para evaluar el retraso del desarrollo intelectual en pediatría?
- A: Test de Stroop
 - B: Escala de Wechsler para niños (WISC)
 - C: Test de Rorschach
 - D: Escala de Hamilton

- 37 En relación a las recomendaciones elaboradas por PrevInfad y su graduación según la calidad de la evidencia, señale la INCORRECTA:
- A: Se recomienda que el profesional de atención primaria ofrezca consejo sobre el uso de sistemas de retención infantil (SRI) y el uso de casco en bicicletas y ciclomotores. Grado de la recomendación B.
 - B: Se sugiere hacer consejo en atención primaria dirigido a la promoción de la actividad física y disminución del sedentarismo. Recomendación débil a favor.
 - C: Dada la falta de disponibilidad de una herramienta de cribado útil, fácil de aplicar en atención primaria y validada en población adolescente española, en la actualidad no es posible evaluar el balance entre los beneficios y los riesgos del cribado de la depresión en los adolescentes. Grado de recomendación I.
 - D: No se recomienda realizar el cribado de alteraciones visuales (ambliopía, estrabismo y errores de refracción) hasta los 6 años. Grado de la recomendación B.
- 38 Según los principios de la comunicación en salud, ¿cuál es el aspecto más determinante para lograr una relación educativa eficaz entre el pediatra y la familia?
- A: La cantidad de información científica transmitida.
 - B: El uso de un lenguaje técnico que refuerce la autoridad profesional.
 - C: La empatía, escucha activa y adecuación del mensaje al nivel de comprensión de la familia.
 - D: El control del tiempo de la consulta para evitar interrupciones.
- 39 En la actual Cartera de Servicios de Atención Primaria de Aragón, es cierto que:
- A: Con relación a la Salud Bucodental, está excluida la extracción de supernumerarios erupcionados.
 - B: No están incluidos los procedimientos diagnósticos de anatomía patológica ni electromiograma.
 - C: No puede incluir servicios diferentes a la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud.
 - D: Incluye la educación y promoción para la salud en centros educativos por parte del médico de familia, pediatra, enfermera, enfermera de pediatría, matrona y odontología.
- 40 Todos los criterios siguientes forman parte del diagnóstico de anorexia nerviosa según el DSM-5, EXCEPTO:
- A: Restricción de la ingesta energética
 - B: Miedo intenso a ganar peso
 - C: Amenorrea durante 3 ciclos menstruales
 - D: Alteración en la percepción del peso corporal
- 41 ¿Qué característica distingue la depresión infantil de la del adulto?
- A: Presencia de delirios
 - B: Irritabilidad en lugar de tristeza
 - C: Conducta alimentaria restrictiva
 - D: Euforia persistente
- 42 Respecto a la tuberculosis en edad pediátrica, señale cual de las siguientes afirmaciones es FALSA:
- A: Se consideran en situación de infección tuberculosa latente los niños y adolescentes que se infectan por contacto con enfermo bacilífero sin desarrollar enfermedad activa y evolucionan a un estado de infección latente asintomática.
 - B: Según las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica se recomienda iniciar profilaxis post exposición a todos los menores de 5 años.
 - C: En ausencia de contacto con enfermo bacilífero conocido y sin factores de riesgo, el antecedente de vacunación BCG con prueba de tuberculina positiva e Interferon Gamma Release Assay (IGRA) positivo se interpreta como efecto de la BCG.
 - D: En recién nacidos de madres bacilíferas la lactancia materna no está contraindicada, salvo en mastitis tuberculosa.

- 43 Niño que presenta un exantema maculopapular confluyente y generalizado asociado a fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$, adenopatías y eosinofilia en la analítica de sangre. Antecedente de toma de amoxicilina hace 3 semanas. ¿Qué patología sospecharías?
- A: DRESS.
 - B: Exantema viral.
 - C: Urticaria medicamentosa.
 - D: Eritema infeccioso.
- 44 ¿Cuál de los siguientes parámetros se considera más útil para valorar el crecimiento?
- A: Velocidad de crecimiento.
 - B: Edad ósea.
 - C: Talla media parental.
 - D: Longitud al nacimiento.
- 45 ¿Cuál de estos hallazgos acompaña habitualmente a una parálisis facial periférica (de Bell) en un niño?
- A: No puede arrugar la frente.
 - B: Disminución del reflejo pupilar.
 - C: Desviación de comisura bucal hacia el lado afecto.
 - D: Parálisis del músculo elevador del párpado superior.
- 46 En el seguimiento del recién nacido prematuro en atención primaria, ¿cuál de los siguientes signos requiere derivación a neuropediatría?
- A: Reflejo de Moro persistente a los 3 meses de edad corregida
 - B: Retraso en sonrisa social a los 3 meses de edad corregida
 - C: Hipertonía persistente en miembros inferiores
 - D: Dificultad para el agarre al pecho
- 47 Según PrevInfad, señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la prevención de accidentes de tráfico en la infancia y adolescencia:
- A: En la consulta de atención primaria la actuación se centrará en el consejo preventivo durante las visitas de salud o en otras ocasiones propicias, tales como la asistencia a niños accidentados.
 - B: Se recomienda que el profesional de atención primaria ofrezca consejo sobre el uso de SRI (sistema de retención infantil) y el uso de casco en bicicletas y ciclomotores.
 - C: Existe suficiente evidencia sobre la eficacia del consejo breve en la consulta sobre educación vial, seguridad del niño y adolescente como conductor, del niño como pasajero de motocicleta y sobre transporte escolar.
 - D: Las campañas de ámbito comunitario han demostrado eficacia.
- 48 ¿Cuáles es el principal factor de riesgo para la sepsis neonatal precoz?
- A: Edad gestacional mayor de 40 semanas
 - B: Prematuridad
 - C: Uso de antibióticos en el embarazo
 - D: Historia de infecciones en la madre

- 49 ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos son los más frecuentemente implicados en las intoxicaciones no voluntarias en pediatría?
- A: Psicofármacos
 - B: Antitérmicos
 - C: Anticatarrales y antitusivos
 - D: Intoxicaciones polimedicamentosas
- 50 En relación a la fotoprotección infantil, ¿qué radiación es la más responsable del eritema cutáneo tras exposición solar?
- A: UVA
 - B: UVB
 - C: UVC
 - D: Infrarrojo
- 51 Respecto a la enfermedad de Duchenne, ¿cuál de las siguientes NO es correcta?
- A: La clínica suele comenzar en torno a los 2-5 años de edad.
 - B: La pérdida de la marcha suele acontecer en la edad adulta.
 - C: Está clasificada como una distrofia muscular de cintura.
 - D: Es la distrofia muscular infantil más frecuente.
- 52 Respecto a las endotropías acomodativas, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto?
- A: Se asocia con miopía y empeora con el crecimiento.
 - B: Se producen por un exceso de convergencia secundario a hipermetropía.
 - C: Requieren casi siempre cirugía en la edad escolar.
 - D: Son secundarias a hipoplasia del músculo oblicuo inferior.
- 53 Indique el enunciado FALSO respecto a las vacunas combinadas:
- A: Disminuye el número de inyecciones.
 - B: Aumenta la exposición a excipientes.
 - C: Reduce los efectos secundarios.
 - D: Mejora las coberturas vacunales.
- 54 ¿De cuál de las siguientes enfermedades de declaración obligatoria en Aragón NO ha de realizarse la declaración de manera urgente?
- A: Fiebre recurrente por piojos
 - B: Paludismo
 - C: Fiebre recurrente por garrapatas
 - D: Sarampión
- 55 ¿Qué prueba de cribado de desarrollo madurativo se utiliza en el seguimiento de niños nacidos con peso menor de 1500 gramos o con una edad gestacional menor de 32 semanas?
- A: M-CHAT.
 - B: Test de Jack.
 - C: ASQ.
 - D: Escala EDAH.

- 56 ¿Cuál es la causa más frecuente de diarrea crónica en el lactante y niño pequeño?
- A: Diarrea funcional
 - B: Síndrome postenteritis
 - C: Infecciones de repetición
 - D: Giardiasis
- 57 Señale en qué consiste la estrategia MART (Maintenance And Reliever Therapy) como opción terapéutica del asma:
- A: Uso combinado de Glucocorticoides inhalados + Salbutamol.
 - B: Uso combinado de Glucocorticoides inhalados + Formoterol.
 - C: Uso combinado de Glucocorticoides inhalados + Salmeterol.
 - D: Uso combinado de Glucocorticoides inhalados + Terbutalina.
- 58 Los resultados de un ensayo clínico donde se estudia un nuevo fármaco muestran que en el grupo intervención (experimental) mueren un 10% y en el control un 15%. El NNT (número de pacientes necesarios a tratar para reducir un evento) del nuevo fármaco será:
- A: 5
 - B: 20
 - C: 75
 - D: 150
- 59 ¿Cuál es uno de los indicadores de calidad de prescripción más valorados en pediatría según el estudio "Indicadores de calidad de prescripción seleccionados mediante una técnica de consenso"?
- A: Proporción de prescripción de antibióticos de elección / total antibióticos.
 - B: Número de medicamentos de marca frente a genéricos.
 - C: Cantidad de envases prescritos por consulta.
 - D: Coste medio del tratamiento sin tener en cuenta eficacia.
- 60 Indique la principal causa de mortalidad infantil en países desarrollados, durante el primer año de vida, excluyendo el período neonatal:
- A: Maltrato infantil.
 - B: Enfermedades respiratorias.
 - C: Síndrome muerte súbita del lactante.
 - D: Cardiopatías.
- 61 En un escenario de parada cardiorrespiratoria pediátrica con equipo y monitor, ¿cuál es el siguiente paso después de las primeras compresiones en caso de ser un ritmo desfibrilable (FV/TV sin pulso)?
- A: Continuar con las compresiones y ventilaciones a ritmo 15/2.
 - B: Administrar un choque (desfibrilación) tan pronto como esté disponible.
 - C: Realizar 2 minutos de RCP antes de desfibrilar.
 - D: Administrar adrenalina antes del choque.
- 62 Según la Guía de Detección e Intervención en situaciones de Maltrato Infantil desde el Sistema de Salud de Aragón, señale el enunciado INCORRECTO:
- A: El síndrome de Münchausen por poderes está incluido dentro del maltrato psicológico.
 - B: El absentismo escolar injustificado y prolongado se cataloga como un tipo de negligencia física.
 - C: Negligencia emocional: Situar al niño como instrumento en las relaciones familiares conflictivas.
 - D: La incapacidad parental de control de la conducta infantil/adolescente es una situación que se produce cada vez con más frecuencia.

- 63 ¿Cuál es el microorganismo más frecuentemente implicado en la artritis séptica según la edad del paciente? Indique la respuesta correcta:
- A: Menores de 3 meses: *S pyogenes*.
 - B: Mayores de 5 años: *S pneumoniae*.
 - C: En todas las edades: *S aureus*.
 - D: Ninguna es correcta.
- 64 En psoriasis infantil, ¿qué forma es más frecuente en niños?
- A: Psoriasis guttata
 - B: Psoriasis inversa
 - C: Psoriasis pustulosa generalizada
 - D: Psoriasis eritrodérmica
- 65 ¿Cuál de los siguientes NO se considera factor de riesgo en el maltrato infantil?
- A: Nacimiento prematuro
 - B: Enfermedad crónica del niño
 - C: Hijos de diferentes parejas
 - D: Apego especial hacia los adultos
- 66 El principal riesgo neurológico en hijos de madre con hipotiroidismo no tratado durante el primer trimestre del embarazo es:
- A: Epilepsia neonatal
 - B: Retraso psicomotor
 - C: Parálisis cerebral
 - D: Microcefalia
- 67 Según el algoritmo de Reflujo Gastroesofágico (RGE) de AEPap, ¿cuál es la intervención inicial recomendada ante la sospecha de enfermedad por RGE (ERGE) en lactantes?
- A: Inhibidores de la bomba de protones de entrada.
 - B: Prueba de supresión de proteínas de la leche de vaca.
 - C: Derivar al gastroenterólogo pediátrico.
 - D: Solicitar una pHmetría.
- 68 Son factores predisponentes en una adolescente a padecer leucorrea por *Candida albicans* todos EXCEPTO:
- A: Ropa sintética ajustada
 - B: Diabetes
 - C: Dislipemia
 - D: Uso de corticoides

- 69 Acude a consulta un escolar de 7 años con tos y dificultad respiratoria de 24 horas de evolución. En la exploración física presenta una frecuencia respiratoria de 45 rpm y sibilancias al final de la espiración sin uso de músculos accesorios en la respiración. La saturación de oxígeno es del 96%. ¿Cuál es la respuesta correcta?
- A: Según la escala Pulmonary Score se trata de una bronquitis leve, por lo que el tratamiento consistirá en salbutamol y bromuro de ipratropio inhalado en cámara.
 - B: Según la escala Pulmonary Score se trata de una bronquitis leve, por lo que el tratamiento consistirá en salbutamol inhalado en cámara y si no hay respuesta inmediata y completa, se pautará corticoide oral.
 - C: Según la escala Pulmonary Score se trata de una bronquitis moderada, por lo que el tratamiento consistirá en salbutamol y bromuro de ipratropio inhalado en cámara y se pautará corticoide oral.
 - D: Según la escala Pulmonary Score se trata de una bronquitis moderada, por lo que el tratamiento consistirá en salbutamol y bromuro de ipratropio nebulizado y según la respuesta se pautará corticoide oral.
- 70 En un estudio de cohortes calcularemos:
- A: Odds ratio
 - B: Prevalencia
 - C: Número necesario a tratar
 - D: Fracción atribuible
- 71 Respecto a las recomendaciones para el tratamiento inicial de infección del tracto urinario (ITU) bajo en > 12 años indique la opción correcta:
- A: Cefuroxima-axetilo a 50 mg/Kg/día en 2 dosis
 - B: Amoxicilina-clavulánico a 60-70 mg/Kg/día en 3 dosis
 - C: Fosfomicina cálcica a 40-50 mg/Kg/día en 2 dosis
 - D: Fosfomicina-trometamol 1 sobre de 3 gramos en dosis única
- 72 Lo característico del metatarso adducto es:
- A: Su tratamiento requiere cirugía.
 - B: No asocia ninguna otra deformidad en el recién nacido.
 - C: No existe retracción del tendón de Aquiles.
 - D: No tiene relación con el metatarso varo.
- 73 Según la última guía de la ESPGHAN 2020 de celiaquía, cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta:
- A: En niños con sospecha de enfermedad celiaca debe realizarse la determinación de Ac antitransglutaminasa IgA y niveles de IgA total, tras comprobar que el niño consume una cantidad normal de gluten.
 - B: En niños con valores de Ac antitransglutaminasa IgA positivos pero con valor <10 veces respecto al límite superior de la normalidad debe realizarse siempre una biopsia intestinal confirmatoria para evitar errores y falsos diagnósticos.
 - C: La determinación del HLA y los síntomas son un criterio obligatorio para poder establecer el diagnóstico basado en serología y sin biopsia.
 - D: No es necesario determinar HLA en pacientes con Ac antitransglutaminasa IgA positivos en los que debe realizarse biopsia intestinal.

74 Señale la afirmación correcta respecto a las gráficas de crecimiento:

- A: Los estudios longitudinales se obtienen efectuando un corte en la población en un momento dado y permiten incluir un elevado número de sujetos para cada grupo de edad y sexo.
- B: Los estudios transversales estudian a una población desde el nacimiento hasta la edad adulta.
- C: Los estudios longitudinales son los más adecuados para evaluar el desarrollo puberal.
- D: Las gráficas de la OMS serían idóneas para su uso en lactantes alimentados preferentemente con lactancia materna desde los 0 a los 12 años.

75 Indique la respuesta correcta respecto al manejo de la fiebre en lactantes.

- A: La probabilidad de infecciones bacterianas graves (IBG) aumenta con la edad.
- B: El estado general tiene un elevado valor predictivo para predecir la enfermedad grave cuando está alterado, pero no ocurre a la inversa.
- C: El principal objetivo del tratamiento es alcanzar la normotermia.
- D: El Ibuprofeno muestra una eficacia superior al Paracetamol para disminuir la temperatura.

76 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la anquiloglosia es cierta?

- A: Se diagnostica por la apariencia del frenillo.
- B: No existe relación entre anquiloglosia y dolor materno.
- C: La frenotomía está indicada ante cualquier frenillo visible, aunque la lactancia sea eficaz.
- D: Los frenillos tipo 4 de Coryllos suelen pasar desapercibidos por ser submucosos.

77 Respecto al tratamiento con insulinoterapia de la Diabetes Mellitus tipo 1, indique la respuesta INCORRECTA:

- A: Los análogos de acción rápida (AAR) tienen un pico de acción a las 1-2 horas y una vida media de unas 3-5 horas.
- B: La insulina detemir (Levemir®) tiene un pico de acción a las 6 horas y una vida media es de unas 12 horas.
- C: La insulina glargina (Lantus®) proporciona un aporte constante de insulina y tiene una vida media de unas 22 horas.
- D: La insulina degludec (Tresiba®) tiene una vida media de más de 25 horas y duración de acción de más de 42 horas.

78 La maduración de las vías auditivas en el recién nacido se produce:

- A: A partir de los 12 meses de vida.
- B: Durante los primeros 3 meses de vida.
- C: Hacia los 3 años de edad.
- D: Ninguna es correcta.

79 Con respecto a los sistemas de retención infantil (SRI), es cierto que:

- A: Los niños hasta 13 kg deberán usar un SRI tipo 0/0+, siempre en contra de la marcha.
- B: En el SRI Grupo 1 (9-18kg) el niño queda sujeto mediante un arnés de 3 puntos que siempre debe ir bien ajustado al cuerpo.
- C: En niños de 15-36 kg, la banda del cinturón debe ir algo holgada para mayor comodidad del niño.
- D: La leyes que obligan al uso de SRI dan lugar a una disminución de la mortalidad del 60%.

80 ¿Cuál es la prevalencia aproximada estimada de inmunodeficiencias primarias en recién nacidos vivos?

- A: 1 de cada 5000
- B: 1 de cada 1200
- C: 1 de cada 10 000
- D: 1 de cada 100

81 Respecto a la alimentación en el deportista pediátrico señale la afirmación FALSA:

- A: El niño tiene menor dependencia del aporte de hidratos de carbono exógeno y utiliza los lípidos en mayor proporción en comparación a los adultos.
- B: La proporción de macronutrientes en la dieta del deportista pediátrico es diferente a la proporción de macronutrientes en la dieta de los niños que no practican deporte.
- C: El déficit de energía puede desencadenar una entidad clínica conocida como síndrome de déficit relativo de energía en el deporte.
- D: Entre el 30-35% del aporte calórico diario debe provenir de las proteínas.

82 En las disfonías funcionales de la edad pediátrica:

- A: Podrían considerarse como causa los nódulos laríngeos.
- B: Los quistes epidermoides entrarían como causa de disfonía funcional.
- C: Los corticoides inhalados pueden ser causa de disfonía funcional.
- D: Habría que pensar en hemangioma pediátrico como causa de disfonía funcional.

83 En relación al testículo no descendido, señale el enunciado FALSO:

- A: La criptorquidia puede ser bilateral hasta en un 10% de los casos.
- B: La mayor parte de los testículos no descendidos son intraabdominales.
- C: No es recomendable solicitar una prueba de imagen antes de la derivación, ya que con frecuencia ocurren falsos positivos por estímulo del reflejo cremastérico.
- D: Las complicaciones de la criptorquidia consisten en menor fertilidad y mayor riesgo de malignización.

84 Sobre el cuestionario M-CHAT cuál es la opción correcta:

- A: Se puede realizar a niños desde los 15 meses.
- B: No se puede hacer antes de los 3 años.
- C: Se puede realizar a partir de los 18 meses.
- D: Es mejor utilizar esta herramienta para discriminar signos de alerta del trastorno del espectro autista en niños menores de 15 meses.

85 ¿Qué antibiótico se asocia con mayor riesgo de selección de resistencias si se usa de forma indiscriminada?

- A: Amoxicilina
- B: Ceftriaxona
- C: Penicilina V
- D: Fosfomicina

86 Con respecto a la proteinuria en el paciente pediátrico, indique la respuesta INCORRECTA:

- A: La proteinuria glomerular es la causa más frecuente de proteinuria en edad pediátrica.
- B: Una orina muy concentrada puede ocasionar falsos positivos, al igual que un pH ácido menor de 4,5.
- C: El 50% de las proteínas eliminadas por la orina de modo fisiológico son secretadas por el epitelio tubular (proteínas de Tamm-Horsfall).
- D: Se considera normal un cociente proteinuria/creatinina en una muestra aislada de orina $<0,20$ en el niño mayor de 2 años, y $<0,50$ en niños menores de 2 años.

- 87 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones obliga a descartar una causa orgánica de estreñimiento en un niño?
- A: Incontinencia fecal diurna en el contexto de posturas retentivas.
 - B: Emisión de meconio antes de las 24 horas de vida.
 - C: Distensión abdominal persistente y vómitos biliosos.
 - D: Inicio tras periodo libre, coincidiendo con control de esfínteres.
- 88 ¿Cuál es la postura típica en la parálisis de Duchenne-Erb?
- A: Brazo en abducción y rotación externa.
 - B: Brazo en aducción, rotación interna, codo extendido.
 - C: Brazo flácido con reflejos conservados.
 - D: Mano en garra con hiperextensión de dedos.
- 89 Respecto al síndrome de Guillain-Barré (SGB), ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?
- A: Es una polineuropatía aguda adquirida inmunomediada que se caracteriza por una debilidad simétrica rápidamente progresiva, de comienzo distal en extremidades inferiores y avance proximal.
 - B: Es la causa más común de parálisis flácida aguda en niños sanos.
 - C: En las manifestaciones clínicas en los niños menores de 6 años predomina al inicio el dolor (en espalda y piernas) y el rechazo de la marcha.
 - D: El estudio de líquido cefalorraquídeo es necesario para confirmar el diagnóstico.
- 90 ¿Cuál de las siguientes es INCORRECTA respecto al programa de atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil de Aragón?
- A: Las funciones del equipo de salud mental incluyen labores de prevención y promoción de la salud.
 - B: Las funciones del equipo de salud mental incluyen labores asistenciales y rehabilitadoras.
 - C: El equipo de salud mental se compone exclusivamente por psiquiatras y psicólogos.
 - D: Dentro de las labores del Pediatra de Atención Primaria se incluye la detección temprana de señales de alerta.
- 91 Requieren control periódico de la audición los niños menores de 3 años:
- A: Afectos de Neurofibromatosis tipo 1.
 - B: Afectos de Neurofibromatosis tipo 2.
 - C: Afectos de Laringomalacia.
 - D: Los que hayan padecido infección en los primeros meses de vida por Coxsackie virus.
- 92 Lactante con fiebre alta de 3 días de evolución, desaparece bruscamente y aparece exantema rosado en tronco. ¿Qué complicación se asocia con más frecuencia a esta patología?
- A: Otitis media aguda.
 - B: Convulsión febril.
 - C: Neumonía.
 - D: Artritis.
- 93 Indique la causa más frecuente de Hipotiroidismo Congénito Permanente:
- A: Ectopia tiroidea.
 - B: Déficit de yodo.
 - C: Agenesia tiroidea.
 - D: Dishormonogénesis.

- 94 ¿Cuál de los siguientes alimentos NO está incluido entre los desencadenantes más frecuentes de anafilaxia en la población pediátrica?
- A: Pescado
 - B: Leche
 - C: Frutas rosáceas
 - D: Huevo
- 95 En el cribado de ambliopía, ¿cuál de las siguientes es correcta?
- A: Hasta que los niños no colaboran no podemos descartar ambliopía.
 - B: No se recomienda realizar un examen de agudeza visual antes de los 4 años.
 - C: Un estrabismo ocasional puede ser normal hasta los 4- 6 meses.
 - D: Una asimetría en la agudeza visual de ambos ojos no permite sospecharla.
- 96 Respecto a la artritis idiopática juvenil (AIJ) señale la FALSA:
- A: Agrupa a las artritis inflamatorias de inicio en < de 16 años de causa desconocida y > 6 semanas de duración.
 - B: No existen pruebas de imagen que confirmen el diagnóstico.
 - C: Algunos pacientes deben realizar controles oftalmológicos periódicos.
 - D: Su diagnóstico requiere factor reumatoide positivo en dos determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- 97 ¿Cuál es un signo temprano de retraso del desarrollo motor en lactantes?
- A: Sonrisa social a los 2 meses.
 - B: Falta de apoyo en manos a los 6 meses.
 - C: Balbuceo a los 3 meses.
 - D: Seguimiento visual de objetos a los 4 meses.
- 98 En cuál de las siguientes situaciones NO es preciso repetir el cribado endocrino-metabólico:
- A: Primer gemelo ingresado por ictericia
 - B: Prematuro de 31 semanas
 - C: Recién nacido término que precisa transfusión de concentrado de hemáties a las 36h de vida
 - D: Recién nacido a término alimentado con lactancia artificial
- 99 Respecto a la caries señale la opción FALSA:
- A: Es causa de demanda odontológica.
 - B: Para prevenirla el cepillado debe iniciarse con la aparición de los primeros dientes.
 - C: La caries se inicia con una desmineralización irreversible.
 - D: En cuanto a la ingesta de alimentos azucarados es mas dañina la frecuencia que la cantidad ingerida de una vez.
- 100 ¿Cuál de los siguientes NO se considera un factor determinante del riesgo psicosocial en el desarrollo del niño?
- A: Dinámica conflictiva entre hermanos
 - B: Desestructuración familiar
 - C: Maltrato infantil
 - D: Ausencia o exceso de disciplina

- 101** La sensibilidad de una prueba diagnóstica representa:
- A: La probabilidad de clasificar correctamente a los enfermos.
 - B: Un cociente entre verdaderos negativos y el total de enfermos.
 - C: La probabilidad de padecer la enfermedad cuando el resultado de la prueba diagnóstica es positivo.
 - D: La probabilidad de clasificar correctamente a los sanos.
- 102** ¿Cuál de las siguientes definiciones es correcta respecto al desarrollo psicoevolutivo?
- A: Las estereotipias son movimientos espontáneos, sin propósito final, tales como acunarse, sacudidas de manos, etc.
 - B: El gesto protoimperativo consiste en señalar con el dedo índice algún objeto de interés con el único fin de compartir con otra persona las emociones que produce.
 - C: El gesto protodeclarativo consiste en señalar como forma para pedir un objeto.
 - D: Cuando hablamos de atención conjunta nos referimos a que el foco de atención entre el niño y su madre no convergen en el mismo suceso o interés.
- 103** Indique el enunciado FALSO respecto a las infecciones del tracto urinario (ITU):
- A: Se reconoce una predisposición individual y genética a padecer ITU.
 - B: Aproximadamente el 5% de los niños y el 10% de las niñas padecerán al menos un episodio de ITU.
 - C: La presencia de fiebre no siempre supondrá afectación del parenquima renal.
 - D: En los lactantes la clínica es mucho más inespecífica.
- 104** ¿Cuál de los siguientes virus requiere exclusión escolar y es de declaración obligatoria semanal?
- A: Niño de 3 años que tuvo 3 días de fiebre y posteriormente le aparece un exantema de progresión cefalo-caudal.
 - B: Niño de 4 años con vesículas pruriginosas en diferentes estadios de evolución.
 - C: Niño de 5 años con diarrea por norovirus confirmada con deposiciones normales desde hace más de 48 horas.
 - D: Niño de 3 años no vacunado con exantema morbiliforme de 5 días de evolución y que tuvo mancha de Koplik.
- 105** ¿Cuál es el cambio más relevante en las recomendaciones de RCP pediátrica del 2020 respecto a la activación del servicio de emergencias?
- A: Esperar 5 minutos antes de activar el sistema de emergencias.
 - B: Activar el sistema emergencias tras 5 insuflaciones si solo hay un reanimador y se dispone de teléfono móvil en altavoz.
 - C: Activar el sistema de emergencias tras 5 insuflaciones y comprobación de signos vitales y/o pulso arterial central, si solo hay un reanimador y se dispone de teléfono móvil en altavoz.
 - D: Si no se dispone de teléfono móvil se realizará la RCP durante 2 minutos, y en ese momento, se activará al servicio de emergencias.
- 106** Madre de lactante de 5 meses con lumbalgia, ¿cuál de los siguientes fármacos analgésicos es MENOS compatible con la lactancia materna?
- A: Paracetamol
 - B: Ibuprofeno
 - C: Tramadol
 - D: Metamizol

107 ¿Qué tipo de fractura de clavícula suele ser asintomática en neonatos?

- A: Fractura completa
- B: Fractura con desplazamiento
- C: Fractura en tallo verde
- D: Fractura con espasmo muscular

108 ¿Cuál es el tumor sólido más frecuente en la infancia?

- A: Neuroblastoma
- B: Tumor de Wilms
- C: Meduloblastoma
- D: Linfoma de Hodgkin

109 Señale la afirmación correcta sobre los trastornos digestivos funcionales:

- A: La aerofagia es más frecuente en niñas sanas.
- B: La rumiación suele ocurrir durante el sueño o cuando el lactante está interactuando con otras personas.
- C: Los episodios de vómitos cíclicos suelen comenzar por la acción de algún agente desencadenante (chocolate, queso, glutamato monosódico, soja, proteínas de leche de vaca y huevo).
- D: La migraña abdominal no se suele acompañar de síntomas vegetativos.

110 ¿Qué factor NO predice la continuidad del trastorno de conducta en la edad adulta?

- A: Existencia de alteraciones de conducta graves antes de los 11 años.
- B: Comorbilidad con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
- C: Alto nivel intelectual.
- D: Disfuncionalidad a nivel familiar.

[illegible]