

A DESTACAR

- Tema de Salud Pública
Hidatidosis en Aragón 1986-2025

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada InfoEDO

Tabla de número de casos. Semana 10/2026

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA					
Hepatitis A	0	0	0	0	6
Hepatitis B	0	1	2	3	17
Hepatitis, Otras	0	0	5	5	11
Infección Gonocócica	0	0	3	3	34
Legionelosis	0	0	1	1	8
Paludismo	0	0	0	0	9
Parotiditis	1	0	1	2	14
Sífilis	1	0	0	1	22
Tosferina	0	0	0	0	1
Tuberculosis	1	0	5	6	29

(*) Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

No se han notificado **enfermedades de BAJA INCIDENCIA** relevantes durante la semana 10.

Información epidemiológica relevante

Desde el BESA anterior, no se ha identificado información epidemiológica relevante.

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

En la semana 10 se registraron 255* defunciones. Los valores observados se sitúan por debajo de los umbrales superiores calculados en todos los canales del corredor (IC 95%: 265-285).


[Enlace a canales de mortalidad](#)

*Pueden aumentar los casos que todavía no han sido notificados.

Hidatidosis en Aragón 1986-2025

Las zoonosis son enfermedades, infecciones o infestaciones que se transmiten entre animales y humanos, directa o indirectamente. La gravedad de estas enfermedades en los seres humanos varía desde síntomas leves hasta afecciones potencialmente mortales. La hidatidosis o equinococosis es una parasitosis zoonótica causada, en el área mediterránea, por el estadio larvario del cestodo *Echinococcus granulosus*.

Incidencia de hidatidosis en Aragón, 1986-2025



Fuente: EDO individualizada e InfoEDO.

En 1986 se pusieron en marcha programas de control y erradicación de hidatidosis en diferentes CCAA. Estos programas se apoyaban en la desparasitación y control de perros, el control de vísceras en mataderos y de cadáveres en el campo, e información y educación sanitaria.

En Aragón, los resultados de estos programas se han reflejado en la disminución en la incidencia (ver gráfico). Desde 1986, se han notificado un total de 2.335 casos. En los últimos cuatro años, se notificaron un total de 6 casos, 1 de ellos en 2025.

La mejor prevención consiste en impedir que los perros, especialmente los rurales y vagabundos, se infecten por consumir vísceras contaminadas. En zonas endémicas conviene reducir el número de perros vagabundos, y los perros domésticos deben tratarse periódicamente con cestodocidas para evitar que sean portadores de esta enfermedad. En la población general, es importante la educación para que evite la exposición a las excreciones de perro e insistir en las prácticas higiénicas básicas, como el lavado de manos.

Enlaces:

- [ECDC- Echinococcosis](#).
- [Página web sobre equinococosis](#) de la Organización Mundial de la Salud (en castellano).
- [RENAVE- Hidatidosis](#).

Otra información epidemiológica (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **Timor Oriental:** Desde diciembre de 2025, Timor Oriental ha notificado un incremento de casos de **dengue**, lo que supone uno de los brotes más importantes por esta enfermedad en el país. Entre el 1 de enero y el 21 de febrero de 2026, se han notificado 2.906 casos de dengue y 17 muertes relacionadas (tasa de mortalidad del 0,6 %). Los datos de años anteriores muestran un marcado patrón estacional, con picos durante la temporada de lluvias (de enero a marzo). A nivel nacional y local se están llevando a cabo medidas de prevención y control. El riesgo para Timor Oriental se considera alto debido a la transmisión intensa en curso, las condiciones climáticas favorables para los vectores competentes y las posibles deficiencias en el control vectorial y en las capacidades y recursos para la gestión clínica. La probabilidad de detectar casos importados de dengue en España procedentes de Timor Oriental se considera bajo, dado el escaso volumen de viajeros entre ambos países y la ausencia de conexiones aéreas directas.
- **España:** En España, a fecha de 3 de marzo de 2026, se han notificado un total de 9 482 casos confirmados de **mpox** desde el inicio del brote en abril de 2022, procedentes de 17 Comunidades Autónomas. Con respecto al mpox del clado se han notificado en España, un total de 103 casos de mpox clado I: 16 de clado I y 87 de clado Ib.
- **España:** Desde la última actualización (ver BESA 9/2026) se han notificado 2 nuevos focos de **gripe A(H5N1)** en aves silvestres, en Toledo (Castilla-La Mancha) y en Barcelona (Cataluña). Desde el 01.01.2026 se han notificado un total de 13 focos en aves: 12 en aves silvestres y 1 en aves de corral. Hay 5 CC.AA. afectadas: Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.


Vigilancia de Infección Respiratoria en Aragón. Temporada 2025-2026

Gripe

En la semana 10/2026, la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 6,2 casos por 100.000 habitantes, por debajo del umbral epidémico establecido para la temporada en 59,6 casos por 100.000.

En los hospitales públicos se registraron 25 urgencias por gripe, 02% del total de urgencias atendidas.

Gráfico 1. Incidencia semanal de gripe, OMI AP. Porcentaje de urgencias hospitalarias por gripe, PCH Urgencias. Temporada 2025-26




En la semana 10/2026 se notificaron 2 detecciones de virus de gripe a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM), 2 Ah3. Desde el inicio de la temporada se han notificado 509 detecciones de virus de gripe no centinela. En la semana 10 se notificaron 9 detecciones de VRS entre las 155 muestras analizadas.

Infección Respiratoria Aguda (IRAs)

En la semana 10/2026 la tasa global de IRAs fue 438 casos por 100.000 habitantes.

Gráfico 2. Incidencia semanal de IRAs. Vigilancia sindrómica OMI AP. Aragón. Temporada 2025-26



Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Para más información: [Vigilancia en Aragón](#), [España](#), [Europa](#) y en el [mundo](#).