GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Sanidad

Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón

Información de Salud Pública para profesionales sanitarios. ISSN 1988-8406
Semana 33/2025 (11/08/2025 al 17/08/2025)

A DESTACAR

- **Tema de Salud Pública**

Situación epidemiológica de los casos de mpox en España. Evaluación de riesgo en países no endémicos.

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada InfoEDO

Tabla de número de casos. Semana 33/2025

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA					
Hepatitis A	0	0	2	2	51
Hepatitis B	1	0	5	5	90
Hepatitis, Otras	0	0	0	0	48
Hidatidosis	0	0	0	0	3
Infección Gonocócica	3	1	4	8	123
Legionelosis	1	1	0	2	43
Paludismo	0	0	1	1	14
Parotiditis	0	0	0	0	32
Sífilis	0	0	4	4	90
Tosferina	0	0	0	0	8
Toxiinfección Alimentaria	6	0	14	20	257
Tuberculosis	1	0	2	3	97

(*) Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Entre las **enfermedades de BAJA INCIDENCIA,** en la semana 33 se han notificado un caso de **enfermedad de Lyme** en la provincia de Huesca y dos casos de **shigelosis,** uno en la provincia de Zaragoza y uno en la provincia de Teruel.

Información epidemiológica relevante

- Desde el BESA anterior, no se ha identificado información epidemiológica relevante.

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

- En la semana 33 se registraron 246 defunciones. Los valores observados se encuentran por debajo de los umbrales superiores calculados en todos los canales del corredor. Enlace a canales de mortalidad

Tema de Salud Pública

Situación epidemiológica de los casos de mpox en España. Evaluación de riesgo en países no endémicos.

La viruela de los monos (monkeypox, MPX) es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente que hasta 2022 era endémica en algunos países de África occidental y central. Todos los casos de MPX identificados fuera de áreas endémicas hasta entonces habían sido importados o vinculados a un caso importado o a animales importados de áreas endémicas. En 2022, se produjo un brote mundial por el clado II (subclado IIb) cuyo principal mecanismo de transmisión fue a través del contacto estrecho en el contexto de relaciones sexuales. El brote afectó de manera mayoritaria, aunque no exclusiva, a hombres que tienen sexo con hombres (HSH). El día 23 de julio de 2022, el Director General de la OMS, determinó que el brote de MPX constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). El número de casos disminuyó a finales de ese mismo año y, desde entonces, el virus continúa circulando de manera global, pero con una baja incidencia.

A finales de 2023 se originó un brote en República Democrática del Congo (RDC) que se extendió a otros países en la región. Los casos identificados en estos países corresponden al clado I (subclados Ia y Ib) existiendo diferencias epidemiológicas entre ambos subclados, de manera que el subclado Ib ha afectado predominantemente a varones adultos y su expansión se sustenta principalmente en el contacto asociado a relaciones sexuales mientras que los casos por el subclado Ia se han dado mayoritariamente en población infantil y se han documentado múltiples modos de transmisión, incluida la transmisión de persona a persona.



Mapa de distribución de casos de MPX clado Ib a 7 agosto 2025 Fuente: OMS

En España y el resto de países europeos, desde la finalización de la anterior ESPII debido al brote internacional de 2022 por subclado IIb y hasta el momento actual, se ha mantenido una circulación del virus de mpox (MPXV) en niveles bajos con un perfil epidemiológico estable, afectando mayoritariamente a hombres gais, bisexuales y otros hombres que tiene sexo con hombres. A fecha de 5 de agosto se han notificado un total de 8.863 casos confirmados de mpox desde el inicio del brote en 2022, de los cuales 85 casos pertenecen a nuestra comunidad autónoma. Toda la muestra analizada corresponde al clado II (4 al clado IIb).

Enlaces de interés

- Evaluación del riesgo para España de la expansión del Clado I del virus de mpox en algunos países de África
- Informes situación mpx en España
- OMS: situación actual

Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- Francia: Hasta el 8 de agosto de 2025, el departamento de Mayotte (territorio francés situado entre Madagascar y Mozambique) ha notificado 18 casos de **malaria**, la mayoría probablemente autóctonos, con inicio de los síntomas entre febrero y agosto de 2025. Los casos se notificaron en Brandelé, Longoni y Chirongui. Todos los casos confirmados fueron diagnosticados por PCR y la especie implicada en todos ellos fue *Plamodium falciparum*. En la zona sospechosa se ha capturado el mosquito *Anopheles gambiae*. Los últimos casos autóctonos notificados hasta ahora en Mayotte fueron en el año 2020. Desde entonces el territorio de Mayotte ha participado activamente en el proceso de eliminación de esta enfermedad con el apoyo de la OMS. La Agencia Regional de Salud de Mayotte está implementando medidas de salud pública en las zonas.

Actualizaciones

- España: Desde la última actualización (ver BESA 32) se han notificado tres nuevos focos de **gripe zoonótica A(H5N1)** en aves silvestres: Erandio (Vizcaya), Villafáfila (Zamora) y Cáceres. Desde el 01.01.2025 se han notificado doce focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, País Vasco, Castilla La Mancha y Castilla y León, dos focos en aves de corral en Extremadura y Castilla la Mancha y un foco en aves cautivas en el País Vasco.

Desde la última actualización (ver BESA 32), hasta el 13.08.2025, se ha notificado el primer caso de **fiebre del Nilo Occidental** en España. Se trata de una persona residente en la provincia de Cáceres que no desarrolló ningún síntoma. El caso de detectó a través de las pruebas de cribado realizadas por el Banco de Sangre.

Desde el inicio de la temporada de vigilancia, se ha notificado un foco en animales, en équidos, en el municipio de Almería. Se han detectado mosquitos positivos en las provincias de Badajoz, Sevilla y Almería.