

A DESTACAR

- Tema de Salud Pública

Plan de acción para la erradicación de la poliomielitis. Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada InfoEDO

Tabla de número de casos. Semana 38/2025

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA					
Hepatitis A	0	0	3	3	61
Hepatitis B	0	0	3	3	100
Hepatitis, Otras	0	0	0	0	52
Hidatidosis	0	0	1	1	4
Infección Gonocócica	0	0	4	4	140
Legionelosis	1	1	1	3	54
Paludismo	0	0	0	0	19
Parotiditis	0	0	3	3	38
Sífilis	0	0	4	4	102
Tosferina	0	0	0	0	11
Toxiinfección Alimentaria	0	2	0	2	254
Tuberculosis	0	1	6	7	120

(*) Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Entre las **enfermedades de BAJA INCIDENCIA**, en la semana 38 se ha notificado un caso de **leptospirosis** en la provincia de Zaragoza.

Información epidemiológica relevante

- Brote de gastroenteritis por ***Clostridium difficile*** en una residencia de Zaragoza, con 3 casos confirmados. En una de la muestra de heces de uno de los casos se ha detectado mediante PCR el gen de la toxina B. Se han recogido muestras al resto de residentes con síntomas y se han dado las recomendaciones oportunas.
- Brote de **COVID-19** en una residencia de Zaragoza con 5 casos de 99 residentes. Se han dado las recomendaciones para limitar la transmisión del brote.

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

- En la semana 38 se registraron 221 defunciones. Los valores observados se sitúan por debajo de los umbrales superiores calculados en todos los canales del corredor. [Enlace a canales de mortalidad](#)

Plan de acción para la erradicación de la poliomielitis. Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda

En España, la situación libre de polio se monitoriza con la vigilancia de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en menores de 15 años, como [recomienda la OMS](#).


Cualquier caso compatible con poliomielitis en menores de 15 años, implica la notificación urgente a Salud Pública. El objetivo es identificar los síndromes sugerentes de polio en menores de 15 años y descartar la presencia de poliovirus mediante el cultivo de heces. La notificación mensual Cero-casos de PFA, tras búsqueda activa, ha mejorado notablemente en los últimos años, reflejo del compromiso de los servicios de epidemiología de las CCAA con el [Plan de acción en España para la erradicación de la poliomielitis](#).

En Aragón, en 2024 se notificó un caso de PFA en menores de 15 años.

Hay que mantener una vigilancia activa y una elevada cobertura de vacunación para conservar la situación libre de poliomielitis, evitando la introducción de poliovirus salvajes procedentes de países endémicos. En junio de 2025, la [OMS](#) estableció que, a pesar de los progresos notificados, la situación de la polio continúa siendo una Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional, se clasifica a los países según el riesgo de transmisión de poliovirus.

El Ministerio de Sanidad establece recomendaciones para [viajeros internacionales](#) a zonas de riesgo.

Gráfico 1. Número de casos de PFA en menores de 15 años notificados en Aragón, 2005-2024



Enlace de interés

- [European Centre for Disease Prevention and Control. Polio interactive map](#)

Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **España:** El 23.09.2025, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid notificó el primer caso confirmado en España de infección por **mpox** perteneciente al **clado Ib**. Se trata de un caso importado en una persona residente en la Comunidad de Madrid, con antecedente de exposición de riesgo durante viaje reciente a Tanzania, país donde se ha documentado transmisión comunitaria de este clado. El caso inició los síntomas el 08.09.2025, confirmándose por PCR en muestra de líquido vesicular recogida el 18.09.2025. Las autoridades sanitarias han implementado las medidas de prevención descritas en el [protocolo para la detección y manejo de casos de mpox en España](#).

La detección de casos importados de mpox clado Ib procedentes de zonas endémicas en otros países, no se ha asociado con una mayor gravedad ni mayor transmisibilidad asociada a este clado. El riesgo de transmisión de mpox para la población general en España se considera bajo, pudiendo aparecer nuevos casos aislados relacionados con viajes a zonas donde exista transmisión comunitaria. El impacto de esta enfermedad para la población se considera bajo, debido a la clínica leve y localizada que suelen presentar la mayoría de los casos junto con la capacidad del sistema sanitario español para dar soporte y tratamiento.

Actualizaciones (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **España:** Desde la última actualización se han notificado 7 nuevos casos confirmados de infección por **virus del Nilo occidental**, de los cuales, 6 con exposición más probable en la provincia de Badajoz, y 1 en la de Almería. Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 15 casos confirmados, 13 con lugar de exposición más probable en Extremadura, 1 en la Comunidad Valenciana y 1 en Andalucía.

