




# INFORME CUATRIMESTRAL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

## PARQUE EÓLICO EL CAMPO Y LAT

<b>Nombre de la instalación:</b>	PE EL CAMPO Y LAT
<b>Provincia/s ubicación de la instalación:</b>	ZARAGOZA
<b>Nombre del titular:</b>	ENEL GREEN POWER
<b>CIF del titular:</b>	B-61234613
<b>Nombre de la empresa de vigilancia:</b>	TESTA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE S.L.
<b>Tipo de EIA:</b>	ORDINARIA
<b>Informe de FASE de:</b>	EXPLOTACIÓN
<b>Periodicidad del informe según DIA:</b>	CUATRIMESTRAL
<b>Año de seguimiento nº:</b>	AÑO 4
<b>Nº de informe y año de seguimiento:</b>	INFORME Nº 3 DEL AÑO 4
<b>Período que recoge el informe:</b>	SEPTIEMBRE 2023 - DICIEMBRE 2023

TESTA Calidad y Medio ambiente S.L.

www.testa.tv | Pza. Madrid 3, 6º Izq. 47001 Valladolid | info@testa.tv | 983 157 972



## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
1.1 OBJETIVO .....	3
1.2 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y NORMATIVA VIGENTE .....	3
<b>2. DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO .....</b>	<b>6</b>
2.1. PROPIEDAD DEL PARQUE EÓLICO Y LA LAT .....	6
2.2. UBICACIÓN .....	6
2.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO .....	6
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PARQUE EÓLICO .....	8
<b>3. EQUIPO TÉCNICO Y FECHA DE REALIZACIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>4. METODOLOGÍA .....</b>	<b>11</b>
4.1. REALIZACIÓN DE LAS VISITAS PERIÓDICAS Y EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO .....	11
4.2. SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA SOBRE LA AVIFAUNA Y LOS QUIRÓPTEROS .....	12
4.2.1 Seguimiento de siniestralidad .....	12
4.2.2 Mortandad estimada .....	16
4.2.3 Seguimiento de especies vivas .....	16
4.2.4 Seguimiento de quirópteros .....	17
4.3. SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA DE INNOVACIÓN IMPLANTADA .....	18
<b>5. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO .....</b>	<b>19</b>
5.1 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS .....	19
5.2 SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS .....	20
5.2.1 Seguimiento de mortandad .....	20
5.2.2 Tasa de mortandad .....	22
5.2.3 Mortandad estimada .....	23
5.2.4 Mortandad por aerogenerador .....	26
5.2.5 Censo de aves .....	26
5.3 SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS .....	32
5.4 SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD SONORA DEL AIRE .....	33
5.5 SEGUIMIENTO DE LA EROSIÓN, DRENAJES Y RESTAURACIÓN VEGETAL .....	34
5.6 SEGUIMIENTO DE LA PRESENCIA DE CARROÑA EN EL ENTORNO DE LA INSTALACIÓN .....	34
5.7 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN .....	35
<b>6. INCIDENTES .....</b>	<b>37</b>
<b>7. VALORACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES .....</b>	<b>38</b>
<b>8. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>40</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>42</b>

**ANEXO I: CENSO DE AVES**

**ANEXO II: REPORTAJE FOTOGRÁFICO**

**ANEXO III: PLANOS**

**ANEXO IV: FICHAS DE SINIESTRALIDAD**

**ANEXO V: INFORME DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA**

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 OBJETIVO

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a la Resolución de 10 de julio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se hace pública la resolución del expediente INAGA 500201/01/2018/05151 denominado “Parque Eólico “El Campo”, de 20 MW, y sus infraestructuras de evacuación”, promovido Enel Green Power España, S.L.U. Esta Resolución señala en su punto 16 de la Declaración de Impacto Ambiental, en lo relativo a la vigilancia ambiental, que *“Se remitirán a la Dirección General de Energía y Minas y al INAGA-Área II, informes cuatrimestrales relativos al desarrollo del plan de vigilancia ambiental, los cuales estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente responsable de la vigilancia”*.

El alcance del informe, en referencia a las instalaciones indicadas en el párrafo anterior, a su vez indicadas en la Resolución, se limita al parque eólico citado y su línea de evacuación.

El desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental es un requisito reglamentario que viene desarrollado en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 2013, que especifica que *“el programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación”*.

Los objetivos que debe cumplir el programa en la fase de explotación, definidos en el punto 7b) del Anexo VI de la Ley 21/2013, son los siguientes:

- 1. Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.
- 2. Realizar el seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la actividad.
- 3. Alimentar futuros Estudios de Impacto Ambiental.

Con el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental en su fase de funcionamiento se comprueban los efectos medioambientales que provoca la presencia y el funcionamiento del parque eólico, así como el grado de eficacia de las medidas correctoras y protectoras propuestas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental (incluyendo el propio Programa de Vigilancia Ambiental) como en la Resolución del INAGA.

### 1.2 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y NORMATIVA VIGENTE

La documentación de referencia y normativa vigente más relevante tenida en cuenta para la elaboración del presente informe de PVA del parque eólico “El Campo” y su LAT ha sido la siguiente:

- *Resolución del expediente INAGA 500201/01/2018/05151 denominado “Parque Eólico “El Campo”, de 20 MW, y sus infraestructuras de evacuación”.*
- *Estudio de impacto ambiental del del proyecto Parque Eólico "El Campo" y Línea Aérea “SET El Campo – SET Valcardera”.*
- *Libro Rojo de las Aves de España, 2021 (SEO/BirdLife).*
- *Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Boletín Oficial de Aragón, de 14 de septiembre de 2022).*
- *Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, derogando la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados, modificada por la Orden de 13 de junio de 1990.*
- *Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.*
- *Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.*
- *RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.*
- *Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.*
- *Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón.*
- *Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.*
- *Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del R.D. 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.*
- *Ley 07/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.*
- *Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.*
- *Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.*

- *Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.*
- *Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.*

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO

### 2.1. PROPIEDAD DEL PARQUE EÓLICO Y LA LAT

El parque eólico “El Campo” y su línea de evacuación son propiedad de ENEL GREEN POWER, con CIF B-61234613 y domicilio a efecto de notificaciones en la C/ AZNAR MOLINA 2, 21 PLANTA 50002, de ZARAGOZA.

### 2.2. UBICACIÓN

El Parque Eólico El Campo se localiza en el término municipal de Mallén, a unos 5,5 km al este de su casco urbano.

El acceso al parque Eólico “El Campo” se lleva a cabo a partir de un vial existente, compartido con los PPEE La Estanca, Dehesa de Mallén y San Francisco de Borja. Este vial parte de una rotonda en la circunvalación del núcleo urbano de Mallén, aprovechando una vía de acceso a la N-232, desde donde sale un camino rural que, tras salvar la AP-68, se dirige directamente al Parque Eólico. Salvando el cruce con el PE La Estanca y avanzando por el vial existente, adaptado a las necesidades del parque, se alcanza la posición EC-01. Antes de llegar a esta posición, parten dos bifurcaciones que dan acceso a las posiciones EC-02 a EC-04 y TM con algunos tramos de camino de nueva creación y previamente, en otra bifurcación existente, a las posiciones EC-05 y EC-06 con el tramo de vial entre aerogeneradores de nueva creación.

La línea eléctrica atraviesa los municipios de Fréscano, Borja, Agón y Magallón, desde la Subestación “El Campo” hasta la SET “Valcardera”.

### 2.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO

En líneas generales se enmarca en la Depresión del Ebro, dentro del sistema de vales, llanos, parameras y muelas que limitan la llanura aluvial del Ebro. Esta zona se caracteriza por la presencia de arcillas y limos rojizos de carácter continental con presencia de calizas subordinadas y yesos con frecuentes episodios terrígenos. Dichos materiales representan facies fluviolacustres, palustres y lacustres evaporíticas de centro de cubeta.

La topografía, poco contrastada, ha favorecido el intensivo uso agrícola dando lugar a un paisaje llano o suavemente ondulado con dominio de cultivos de cereal y leñosas, fundamentalmente vid, olivo y almendro.

Las manchas de vegetación natural quedan relegadas a los taludes donde no se ha podido allanar el terreno para su uso agrícola, constituyéndose fundamentalmente por matorrales xerofíticos, en parte cartografiados como hábitats de interés comunitario con código UE 6220 “Pastizales

mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces”. También existen algunas pequeñas superficies con pinares de repoblación.

Las características del terreno, con cultivos de cereal de secano, barbechos, pequeñas manchas de vegetación natural y numerosos puntos de agua da lugar a la presencia de aves esteparias, fundamentalmente alaúdidas o presencia esporádica de ortegas y gangas entre otras. Se observa mayor riqueza en cuanto a presencia de rapaces utilizando la zona como zona de paso, residencia o campeo. También la presencia de “La Estanca”, balsa de riego muy naturalizada, incluida en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón, además de numerosas balsas de riego, favorece, fundamentalmente en invernada, la presencia de aves acuáticas.

La línea eléctrica atraviesa espacios eminentemente agrícolas, si bien altamente antropizados por la presencia de los nuevos parques eólicos y líneas eléctricas. Apenas quedan algunos relieves con vegetación natural. El último tramo de la línea se encuentra altamente antropizado por la presencia de dichas infraestructuras.

A continuación, se pueden observar los espacios Red Natura 2000 más cercanos a las instalaciones, siendo el más próximo el LIC ES2200042 “Peñadil, Montecillo y Monterrey”, situado a 545 m al NW del aerogenerador 3:



*Ilustración 1. Ubicación de espacios protegidos y Red Natura respecto al parque eólico*

**2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PARQUE EÓLICO**

El Parque Eólico “El Campo” cuenta con una potencia instalada total de 24 MW. Sus principales instalaciones son:

- **Aerogeneradores:** Los seis aerogeneradores que configuran el parque eólico son de la marca Acciona AW-3300, con una potencia unitaria de 3,3 MW, un diámetro de rotor de 132 m y una altura de buje de 84 m. El sistema de balizamiento nocturno en la zona superior de la góndola es tipo Media A/Media C. Los aerogeneradores cuentan con una plataforma de montaje de 2.500 m<sup>2</sup> aproximadamente, atravesada por los viales de interconexión entre las posiciones afines.

La ubicación de estos se recoge en la siguiente tabla:

AEROGENERADOR	COORDENADA X	COORDENADA Y
EC 01	623.682	4.640.585
EC 02	624.051	4.640.863
EC 03	624.327	4.641.139
EC 04	624.533	4.641.466
EC 05	625.277	4.640.774
EC 06	625.582	4.640.962

*Tabla 1. Coordenadas UTM (Datum ETRS89) de los aerogeneradores*

- **Subestación:** El Parque Eólico El Campo cuenta con una subestación de uso compartido con los Parques Eólicos La Estanca, Dehesa de Mallén y San Francisco de Borja. La subestación, de formas sencillas, queda integrada como una edificación de aspecto rústico acorde con la zona donde se ubica.
- **Línea de evacuación:** Asociada al Parque Eólico está la línea de evacuación que parte de la Subestación “El Campo” y finaliza en la SET “Valcardera”. Cuenta con una longitud de 15,9 km y 51 apoyos en 18 alineaciones que se distribuyen en dos tramos: el primero de 3.939 m desde SET “El Campo” hasta el apoyo 14 en simple circuito y el segundo de 11.969 m desde el apoyo 14 hasta la SET “Valcardera” en doble circuito. Se han instalado espirales salvapájaros en todo el trazado. Las coordenadas de los vértices de la línea se recogen a continuación:

VÉRTICE	COORDENADA X	COORDENADA Y
SET EL CAMPO	624.728	4.639.809
PÓRTICO	624.728	4.639.747
AP3	624.645	4.638.919
AP6	624.417	4.637.910
AP8	624.107	4.637.471
AP9	624.076	4.637.215
AP11	624.278	4.636.734

VÉRTICE	COORDENADA X	COORDENADA Y
AP17	625.394	4.635.647
AP18	625.592	4.635.320
AP19	625.947	4.634.978
AP21	626.777	4.634.687
AP29	629.431	4.633.460
AP35	631.465	4.632.773
AP39	632.666	4.632.543
AP42	633.478	4.632.079
AP43	633.733	4.632.069
AP47	634.159	4.632.591
AP50	634.566	4.633.443
AP51	634.744	4.633.607
SET VALCARDERA	634.791	4.633.655

*Tabla 2. Coordenadas UTM (Datum ETRS89) de los vértices de la línea de evacuación*

### 3. EQUIPO TÉCNICO Y FECHA DE REALIZACIÓN

El estudio previo y presente informe ha sido realizado por la empresa consultora TESTA, Calidad y Medioambiente S.L., a través de un equipo técnico multidisciplinar, especializado en seguimiento ambiental, constituido por los siguientes integrantes:

#### Equipo Técnico:

Puesto: *Responsable del proyecto.*

Responsable: **Begoña Arbeloa Rúa.**

Lda. Farmacia, Especialidad Medio Ambiente, Postgrado medioambiente industrial por EOI.  
Ejerce desde 1997 como técnico en Medioambiente y dirección de proyectos ambientales.

Puesto: *Coordinador del proyecto.*

Responsable: **David Merino Bobillo.**

Ldo. ADE.

Ejerce desde 2001 como técnico en Medioambiente y dirección de proyectos ambientales.

Puesto: *Director técnico del proyecto.*

Responsable: **Alberto De la Cruz Sánchez.**

Ldo. CC Biológicas, Especialidad Zoología y Medioambiente.

Ejerce desde 2005 como consultor de Medioambiente.

Puesto: *Técnico especialista.*

Responsable: **Ángel Rubio Palomar.**

Diplomado en Ingeniería Forestal.

Ejerce desde 2010 como técnico en Medioambiente.

Puesto: *Técnico especialista.*

Responsable: **Daniel Fernández Alonso.**

Graduado CC Ambientales.

Ejerce desde 2019 como especialista en quirópteros e inventariado de fauna.

Puesto: *Técnico especialista.*

Responsable: **Luis Ballesteros Sanz.**

Graduado CC Ambientales.

Ejerce desde 2020 como técnico en Medioambiente.

Puesto: *Técnico especialista.*

Responsable: **Carlos Pérez García.**

Graduado CC Ambientales, Máster en biodiversidad: conservación y evolución

Ejerce desde 2019 como consultora de Medioambiente.

Puesto: *Técnico especialista.*

Responsable: **Daniel Maza Romero.**

Ldo. Ciencias Ambientales

Ejerce desde 2019 como técnico en Medioambiente.

**4. METODOLOGÍA**

La realización del **Programa de Vigilancia Ambiental** del Parque Eólico “El Campo” se ha realizado según la siguiente metodología:

**4.1. REALIZACIÓN DE LAS VISITAS PERIÓDICAS Y EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO**

Los informes comprenden períodos cuatrimestrales de enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre. El presente informe se corresponde con el tercer informe cuatrimestral del año 2023, recogiendo por tanto el periodo de septiembre a diciembre, así como un análisis de los datos recogidos a lo largo de todo el ciclo anual completo.

La periodicidad de las visitas al parque eólico es semanal durante los meses de febrero-abril y agosto-noviembre (periodos migratorios), pasando a quincenal el resto de los meses. Durante el período comprendido entre septiembre de 2023 y diciembre de 2023 se realizaron quince visitas al parque eólico. En la línea de evacuación las visitas se llevan a cabo quincenalmente durante todo el año, habiéndose realizado ocho visitas en este tercer cuatrimestre.

El calendario anual de visitas de seguimiento se recoge a continuación:

DÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1		.	.									
2								.				
3										.		
4												
5				.			.		.			
6						.						
7												
8								.			.	
9		.	.		.							
10										.		
11	.											.
12				.					.			
13												
14							.					
15			.			.						
16		.										
17										.	.	
18								.				
19									.			
20	.			.								
21												
22								.				.
23			.									
24		.			.						.	
25										.		
26				.					.			
27												
28												
29			.								.	
30												
31										.		

Tabla 3. Fechas de visitas de seguimiento ambiental al parque eólico

DÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1												
2												
3												
4												
5												
6									•	•		
7						•		•				
8			•									
9											•	
10				•	•		•					
11	•											
12												
13												
14		•										•
15												
16												
17												
18									•			
19				•								
20												•
21												
22		•									•	
23												
24												
25					•							
26	•						•					
27												
28						•						
29			•					•				
30												
31										•		

Tabla 4. Fechas de visitas de seguimiento ambiental a la línea de evacuación

**4.2. SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA SOBRE LA AVIFAUNA Y LOS QUIRÓPTEROS**

Las especies de fauna más afectadas por el emplazamiento de un parque eólico y su línea de tensión son las aves y, dentro de los mamíferos, los quirópteros. Ello se debe a que en el vuelo de estas especies pueden colisionar con la torre de los aerogeneradores o con sus palas, así como con los tendidos eléctricos y electrocución, lo que provoca una siniestralidad cuantificable. Además de estas pérdidas directas de fauna, también la instalación de estas estructuras puede ocasionar en la fauna otro tipo de afecciones indirectas, debido principalmente a la destrucción de hábitat, al efecto barrera e incluso a los desplazamientos por molestias (Drewit et al., 2006).

El seguimiento de la incidencia desarrollado en el Plan de Vigilancia Ambiental comprende el estudio de la siniestralidad, mediante la inspección del entorno de los aerogeneradores y de los apoyos de la LAT, así como el cálculo de la mortalidad estimada teniendo en cuenta factores de corrección. También se incluye el seguimiento de las aves que utilizan el espacio aéreo del parque eólico y la línea y las posibles modificaciones comportamentales observadas, lo que puede aportar información sobre la afección indirecta.

**4.2.1 Seguimiento de siniestralidad**

**A) PARQUE EÓLICO**

El control de la afección resulta necesario a la hora de establecer medidas de mitigación, mejora de protocolo, modificación de infraestructuras o detección de riesgos calculados, por ejemplo, que

pueden reducir o eliminar la incidencia (Anderson et al.1999; Langston & Pullan, 2004; Schwart 2004, CEIWEPE 2007).

Este control de la incidencia se ha llevado a cabo con una búsqueda intensiva de restos de aves y quirópteros que hayan podido colisionar con un aerogenerador. Para ello, se prospecta un área alrededor de cada uno de los aerogeneradores del parque eólico, cubriendo un área de cien metros de radio, tomados desde el centro de la torre de la máquina (Kerlinger, 2002; Erikson et. al, 2003; Johnson et al, 2003; Smallwood & Thelander 2004; CEC & CDFG, 2007).

El protocolo seguido ante la detección de individuos muertos es el siguiente:

1. Toma de datos “in situ”:
  - fecha y hora del hallazgo;
  - características de la especie (edad y sexo siempre que ha sido posible, diagnóstico de mortandad, estado de conservación del cadáver, etc.);
  - localización de la especie (coordenadas UTM en ETRS89 bajo huso 30, distancia y orientación a la estructura más próxima y hábitat donde se ha encontrado);
  - fotografías del cadáver y del emplazamiento.
2. Comunicación del episodio de mortandad al personal operador de las instalaciones.
3. Aviso a los agentes medioambientales para recibir instrucciones sobre la recogida del cadáver.

Los resultados obtenidos durante la vigilancia ambiental para la localización de ejemplares siniestrados están influidos por dos factores:

- **La eficacia de la búsqueda** por parte del encargado de la vigilancia. Para determinar esta eficiencia, se realiza una búsqueda experimental, ubicando unos señuelos en campo y contando el número de ellos que el técnico es capaz de encontrar durante una jornada normal de inspección. Esta prueba tiene por objeto corregir los valores de la mortandad obtenidos a partir de los restos encontrados, considerando la fracción de cadáveres que no son detectados debido a la capacidad visual del observador y a las condiciones físicas del terreno (concretamente del relieve y la vegetación).

Con esta prueba experimental se determina un factor de corrección de la siniestralidad obtenida en campo. **El FCB o Factor de Corrección de Búsqueda** es el cociente entre el número de señuelos encontrados y el total de señuelos ubicados.

$$\bullet \quad FCB = \frac{N^{\circ} \text{ de señuelos encontrados}}{N^{\circ} \text{ total de señuelos ubicados}} \quad \text{Ecuación 1}$$

- **La intervención de animales carroñeros que se lleven los cadáveres antes de ser detectados.** El método empleado para valorarlo consiste en depositar cadáveres de aves en

el campo a fin de estimar la eficacia con que son removidos por los carroñeros. Con esta metodología se determina el factor de corrección de la depredación.

El **tiempo de permanencia media** de un cadáver se calcularía como:

$$\bullet \quad t_m = \frac{\sum t_i + \sum t'_i}{n} \quad \text{Ecuación 2}$$

Donde:

$t_m$ : valor medio en días de permanencia de un cadáver en el campo

$t_i$ : tiempo en días que un cadáver permanece en el campo (primer test)

$t'_i$ : tiempo en días que un cadáver permanece en el campo (segundo test)

$n$ : número de cadáveres depositados

Para determinar estos factores de corrección en el parque eólico “El Campo” se han empleado datos de **Testa Calidad y Medioambiente S.L.** en pruebas llevadas a cabo por los propios técnicos de Testa en Zaragoza durante el período estudiado.

Para las especies de mayor tamaño o no acarreables como los buitres leonados (*Gyps fulvus*), el tiempo de permanencia es mayor, pudiéndose detectar en campo durante meses y, en algunos casos, años. Por este motivo no se considera oportuno realizar correcciones sobre estas especies, ya que su permanencia y su mayor visibilidad permiten su hallazgo a lo largo del tiempo en alguna visita del periodo de la vigilancia ambiental.

Por otro lado, y siguiendo el protocolo del INAGA para la recogida de cadáveres localizados durante las jornadas de vigilancia ambiental en los parques eólicos, se instaló un **arcón congelador** para almacenar todos aquellos siniestros que no hayan podido ser retirados por el APN o usados en los factores de corrección. Este arcón se localiza en la SET El Campo y sirve de manera conjunta para los parques eólicos El Campo, San Francisco de Borja, Dehesa de Mallén y La Estanca.



*Fotografía 1. Arcón congelador del parque eólico*

## **B) LÍNEA DE ALTA TENSIÓN**

Los principales efectos negativos de las líneas de tensión sobre las aves se corresponden, básicamente, con la posibilidad de colisión y electrocución durante el funcionamiento de la línea y los cambios de comportamiento ocasionados por la presencia de la instalación. No obstante, existen otros efectos menos directos que se enumeran a continuación:

- Colisiones con los cables y electrocución, como causa de mortalidad directa.
- Efecto barrera para la movilidad de las aves, ya que se fragmenta la conexión entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda.
- Destrucción del hábitat. La instalación de las líneas eléctricas de evacuación y los caminos de acceso implica transformación o pérdida de hábitat.

Los resultados obtenidos en otros estudios completados en Europa apuntan a que la incidencia sobre el comportamiento de las aves y la pérdida de hábitats, asociados a las líneas de alta tensión, son mucho más importantes que la mortalidad directa debida a la colisión. Si bien estudios de SEO/BIRDLIFE (Atienza et al., 2008) sobre líneas eléctricas contradicen esta generalización.

El seguimiento ambiental de los impactos sobre la fauna se ha centrado en dos aspectos relevantes:

- Comportamiento de las aves frente a la línea eléctrica.
- Control de posibles siniestros por colisión o por electrocución.

La metodología habitual empleada en la inspección de líneas de tensión dentro del marco de la vigilancia ambiental propone el barrido en zig-zag a lo largo de toda la línea eléctrica, abarcando unos 25 metros a cada lado de la infraestructura y prestando especial atención a los apoyos (Gauthreaux, 1996, Anderson et. al, 1999). En este caso, se ha preferido optimizar esta técnica mediante la sustitución del zig-zag por dos pasillos de 50 metros a ambos lados del eje principal de la línea.

Para el cálculo de los factores de corrección, se ha empleado el mismo índice que para el parque eólico, al considerarse que las características de vegetación y orografía son similares.

#### 4.2.2 Mortandad estimada

Teniendo en cuenta los factores de corrección descritos se puede estimar la mortandad del parque eólico. Para ello se ha empleado la siguiente fórmula correctora:

**FÓRMULA DE ERICKSON, 2003** Erickson et al. (Erickson, W.P. et al., 2003):

$$M = \frac{N \cdot I \cdot C}{k \cdot t_m \cdot p} \quad \text{Ecuación 3}$$

Donde:

**M** = Mortandad estimada.

**N** = Número total de aerogeneradores/apoyos.

**I** = Intervalo entre visitas de búsqueda (días).

**C** = Número total de cadáveres recogidos en el período estudiado.

**k** = Número de aerogeneradores/apoyos revisados.

**t<sub>m</sub>** = Tiempo medio de permanencia de un cadáver sobre el terreno.

**p** = Capacidad de detección del observador (Factor de corrección de eficacia de búsqueda).

Se ha elegido la fórmula de Erickson frente a la de Winkelman (Winkelman J.E. 1989) al prospectarse el 100% de los apoyos en cada visita.

#### 4.2.3 Seguimiento de especies vivas

Los avistamientos llevados a cabo en el parque eólico se realizan mediante observaciones utilizando material óptico adecuado (prismáticos 8x42). Los censos efectuados consisten en la anotación de las especies visualizadas en recorridos lineales y barridos focales de los ejemplares hasta que se pierden de vista, así como a través de identificaciones de tipo auditivo a partir de los reclamos y cantos emitidos por las aves.

Los avistamientos se han registrado desde dos puntos de observación de treinta minutos, desde los que se observaba todo el espacio aéreo, anotándose las especies, el número de individuos, el período fenológico, la hora de la detección, la edad, el sexo, el aerogenerador más próximo, la distancia, la altura respecto al mismo, las condiciones ambientales (visibilidad, nubosidad, precipitación, dirección y velocidad del viento) y aspectos comportamentales. Se ha tenido especial consideración con las posiciones 5 y 6 por contar con medidas de innovación, consistentes en el pintado de rojo de las palas, para estudiar el comportamiento de las aves en estos aerogeneradores. Sus coordenadas son las siguientes:

PUNTO DE OBSERVACIÓN	UTMx	UTMy
P1	623.682	4.640.585
P2	624.536	4.641.485

Tabla 5. Coordenadas de los puntos de observación

Por otro lado, se han registrado las observaciones de fauna de toda la jornada, aunque estuvieran fuera de los puntos de observación, a fin de tener un listado completo de toda la avifauna presente en la zona de estudio.

#### 4.2.4 Seguimiento de quirópteros

Para el seguimiento de la actividad nocturna de los quirópteros se realiza detección no invasiva mediante la utilización de grabadoras de ultrasonidos. Estos son aparatos que captan las emisiones ultrasónicas que emiten los murciélagos a fin de ecolocalizar. Los archivos resultantes son analizados en el ordenador mediante un programa informático específico para con ello poder identificar la especie o, al menos, el grupo de especies al que pertenece el quiróptero que hubiese sido grabado.

Se instala una grabadora de ultrasonidos automática de marca Open Acoustics Devices, modelo Audiomoth 1.0.0. Las grabaciones se realizan con una frecuencia de muestreo de 256 KHz en formato .wav, suficiente para la detección de todas las especies de murciélagos europeas, dado que permite la grabación efectiva de todos los sonidos hasta los 125 KHz. Cabe señalar que el quiróptero ibérico con una frecuencia de emisión más alta es el *Rhinolophus hipposideros*, siendo esta un rango entre 106-112 KHz. Además, al grabarse todo el espectro ultrasónico no existen las limitaciones que podrían surgir del uso de detectores heterodinos o de división de frecuencias, menos apropiados para la determinación específica de los ejemplares.

El periodo de grabación comprende la época de mayor actividad y de apareamiento, llegando a poder identificar a nivel específico los quirópteros salvo en el caso del género *Myotis*, siendo por lo general esta época los meses de mayo a agosto.

Al igual que sucede con los factores de corrección, los resultados referentes a la quiropteroфаuna se presentan de manera conjunta con los parques eólicos El Campo, Dehesa de Mallén y San Francisco de Borja, debido a la cercanía de estos y la homogeneidad del terreno.

#### 4.3. SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA DE INNOVACIÓN IMPLANTADA

---

- Con el objetivo de dar cumplimiento al punto 9.c establecido en la DIA, previamente al inicio de la explotación del parque eólico “El Campo” se implementaron medidas de innovación e investigación encaminadas a minimizar el riesgo de colisión de aves con las palas de los aerogeneradores.

Estas medidas consisten en el pintado de las palas de los aerogeneradores 5 y 6, con el objetivo de aumentar su visibilidad y reducir el riesgo de colisión por parte de la avifauna presente.

- Por otro lado, con respecto a la quiropteroфаuna, se han instalado dispositivos Safe Wind Biodiv, para la detección de quirópteros mediante detección de ultrasonidos, en los aerogeneradores números 1 y 5.

Todos los datos recogidos durante los 8 meses establecidos para el periodo del estudio, de mayo a diciembre del 2023, se detallan en el “ANEXO VI: Seguimiento medida de Innovación”.

## 5. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

A partir de un análisis de la Resolución del expediente INAGA/500201/01/2018/05151 denominado “Parque Eólico “El Campo”, de 20 MW, y sus infraestructuras de evacuación”, se ha realizado un seguimiento y vigilancia de todas las actuaciones recogidas en el documento. Dichas actuaciones se clasifican en:

- Ⓞ Seguimiento de la gestión de residuos.
- Ⓞ Seguimiento de las afecciones a la avifauna y quirópteros.
- Ⓞ Seguimiento de quirópteros.
- Ⓞ Seguimiento de la calidad sonora del aire.
- Ⓞ Seguimiento de la erosión, drenajes y restauración vegetal.
- Ⓞ Seguimiento de la presencia de carroña en el entorno de la instalación.
- Ⓞ Seguimiento de las medidas de innovación e investigación.

Cada seguimiento realizado y sus resultados se detallan en los siguientes apartados.

### 5.1 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Establece la Resolución que se evaluará la correcta gestión de los residuos generados en el parque, la evolución de la restauración vegetal de las zonas restauradas tras las obras, o detección de posibles zonas en las que se produzcan procesos erosivos debidos a las obras. Así mismo, indica la DIA en su punto 12 que *“En la gestión de los residuos de construcción y demolición, se deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por el Decreto 117/2009, de 23 de junio y en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.”*.

Para evidenciar el cumplimiento de la normativa de residuos, el equipo de TESTA encargado de realizar las visitas de seguimiento ha evaluado los siguientes aspectos:

- Identificación de residuos no peligrosos.
- Identificación de residuos peligrosos.
- Almacenamiento de residuos peligrosos.
- Generación y segregación controlada de residuos (ausencia de derrames o vertidos incontrolados de residuos peligrosos).

El equipo de vigilancia ambiental ha podido constatar que la identificación, almacenamiento, cesión y control documental de los residuos en el periodo en estudio se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Los residuos peligrosos se almacenan temporalmente en recipientes estancos e identificados con la etiqueta del residuo en un almacén en la subestación eléctrica, dotado de las medidas necesarias para evitar contaminaciones (almacén cubierto y aireado) y son retirados posteriormente por el Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos. De la misma manera, los residuos no permanecen almacenados más tiempo del reglamentario.

Durante el periodo no se ha detectado ninguna incidencia en cuanto a residuos, de modo que a fecha del presente informe no hay ningún residuo abandonado o incidente relativo a residuos sin resolver.

Se adjuntan fotografías en el “ANEXO II: REPORTAJE FOTOGRÁFICO” donde se puede apreciar el estado del almacén y la correcta segregación de los residuos.

## 5.2 SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

La Resolución establece en el punto 15.c que “Para el seguimiento de la mortalidad de aves, se adoptará el protocolo que propuso el Gobierno de Aragón”.

Se presentan a continuación los datos referidos a este seguimiento de la mortalidad de aves y quirópteros.

### 5.2.1 Seguimiento de mortandad

Durante el periodo de estudio se ha detectado **veinticinco episodios de mortandad** en el parque eólico y **cinco** en la línea de evacuación, indicándose los siguientes apartados:

- Fecha: fecha de hallazgo.
- Sexo: Indeterminado; macho; hembra.
- Edad: indeterminado; joven; subadulto; adulto.
- Distancia: metros al aerogenerador más próximo.
- Orientación: orientación de los restos respecto al aerogenerador.

Fecha	Nombre común	Nombre científico	CNEA*	Sexo	Edad	UTMx	UTMy	Distanc.	Orientac.	Aerog.
01/02/23	Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	IL	Indet.	Indet.	624294	4641060	80 m	E	3
15/03/23	Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	IL	H	Indet.	624422	4641182	80 m	SE	3
23/03/23	Aguilucho lagunero occidental	<i>Circus aeruginosus</i>	IL	M	Indet.	624055	4640863	1 m	E	2
05/04/23	Gorrión chillón	<i>Petronia petronia</i>	IL	Indet.	Adulto	624360	4641137	25 m	SE	3
05/04/23	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	IL	M	Adulto	624063	4640843	18 m	NE	2

05/04/23	Cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>	IL	Indet.	Adulto	624049	4640885	15 m	NE	2
20/04/23	Jilguero europeo	<i>Carduelis carduelis</i>		Indet.	Indet.	625668	4640986	36 m	E	6
20/04/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Indet.	Indet.	624513	4641512	30 m	N	4
24/05/23	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	PE	Indet.	Indet.	625336	4640750	60 m	NE	5
05/07/23	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	IL	Indet.	Indet.	625610	4640982	25 m	E	6
29/08/23	Azor común	<i>Accipiter gentilis</i>	IL	M	Indet.	624535	4641399	70 m	N	4
12/09/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625254	4640775	20m	NO	5
12/09/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Hembra	Indet.	625256	4640774	18m	NO	5
12/09/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625598	4640948	18m	E	6
19/09/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	624499	4641474	20m	NO	4
26/09/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625275	4640769	9m	S	5
26/09/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Indet.	Indet.	625283	4640770	6m	E	5
03/10/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Indet.	Indet.	625269	4640737	30m	E	5
03/10/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Indet.	Indet.	625332	4640724	70m	NE	5
17/10/23	Grajilla occidental	<i>Corvus monedula</i>	Indet.	Indet.	Indet.	624306	4641100	43m	NO	3
17/10/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625253	4640784	15m	O	5
25/10/23	Murciélago rabudo	<i>Tadarida teniotis</i>	IL	Macho	Adulto	625585	4640127	42m	SO	6
31/10/23	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	Indet.	Indet.	Adulto	625603	4641011	60m	NO	6
17/11/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	624531	4641457	10m	S	4
29/11/23	Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	IL	Indet.	Joven	624528	4641389	70m	S	4

Tabla 6. Lista de mortandad en DATUM ETRS89 en el parque eólico

Fecha	Nombre común	Nombre científico	CNEA*	Sexo	Edad	UTMx	UTMy	Distanc.	Orientac.	Apoyo
29/03/23	Grulla común	<i>Grus grus</i>	IL	Indet.	Adulto	634085	4632554	60 m	SO	47
29/03/23	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	IL	H	3	634214	4632641	53 m	NE	47
28/06/23	Ánade real	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	H	Adulto	626250	4634861	60 m	S	20
18/09/23	Zorzal común	<i>Sturnus unicolor</i>	Indet.	Indet.	Indet.	634316	4632926	423 m	NO	48
22/11/23	Estornino negro	<i>Turdus philomelos</i>	Indet.	Indet.	Indet.	630401	4633134	57 m	NE	32

Tabla 7. Lista de mortandad en DATUM ETRS89 en la LAT

\* Categoría de amenaza que presenta la especie según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA, RD 139/11): "En Peligro de Extinción" (PE) y "Vulnerable" (V). Se incluye la categoría "IL" para aquellos taxones que están incluidos en el listado pero que no presentan ninguna categoría de amenaza en el catálogo.

De las especies detectadas sólo una presenta un estatus comprometido según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y el Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón el **milano real** (*milvus milvus*), catalogado como “En Peligro”.

De los 25 siniestros detectados en el parque, en trece ocasiones se trató de aves y doce de quirópteros. En la línea eléctrica el total de los 5 siniestros han correspondido a aves.

### 5.2.2 Tasa de mortandad

Las colisiones del periodo de referencia de aves y quirópteros arrojan los siguientes valores de mortandad para el **parque eólico “El Campo”**:

MORTANDAD	
Mortandad Primer cuatrimestre	8
Mortandad Segundo cuatrimestre	3
Mortandad Tercer cuatrimestre	14

Tabla 8. Número de colisiones en el parque eólico

La tasa de mortandad en el periodo de referencia en el parque es la siguiente (mortandad expresada según el número de aerogeneradores, 6 en el caso de “El Campo”):

TASA DE MORTANDAD CUATRIMESTRAL POR AEROGENERADOR	
Tasa de mortandad Primer cuatrimestre	1,33
Tasa de mortandad Segundo cuatrimestre	0,5
Tasa de mortandad Tercer cuatrimestre	2,33

Tabla 9. Tasa de mortandad por aerogenerador

Las colisiones del periodo de referencia de aves y quirópteros arrojan los siguientes valores de mortandad para la **línea de evacuación**:

MORTANDAD	
Mortandad Primer cuatrimestre	2
Mortandad Segundo cuatrimestre	1
Mortandad Tercer cuatrimestre	2

Tabla 10. Número de colisiones en el parque eólico

La tasa de mortandad en el periodo de referencia en la línea es la siguiente (mortandad expresada según el número de apoyos, 51 en este caso):

TASA DE MORTANDAD CUATRIMESTRAL POR APOYO	
Tasa de mortandad Primer cuatrimestre	0,04
Tasa de mortandad Segundo cuatrimestre	0,02
Tasa de mortandad Tercer cuatrimestre	0,04

Tabla 11. Tasa de mortandad por apoyo

### 5.2.3 Mortandad estimada

Los factores de corrección de la tasa de mortandad correspondientes para el parque eólico “El Campo” y su línea de evacuación son los siguientes:

#### Factor de corrección de la búsqueda

Para determinar la eficacia de búsqueda, cada cuatrimestre se realiza un experimento con los técnicos que realizan vigilancia ambiental en el parque eólico. Se depositan distintos señuelos de color tierra a diferentes distancias de la torre del aerogenerador/apoyo, detectándose un número variable según el técnico que realizó la prospección. El valor promedio obtenido por los técnicos participantes tras el experimento se calcula del cociente entre el número de señuelos que cada técnico ha conseguido localizar y el total de señuelos ubicados:

- *Factor de Corrección de la Búsqueda medio primer cuatrimestre:*  $\overline{FCB} = \frac{\sum FCB_i}{n} = 0,70$
- *Factor de Corrección de la Búsqueda medio segundo cuatrimestre:*  $\overline{FCB} = \frac{\sum FCB_i}{n} = 0,65$
- *Factor de Corrección de la Búsqueda medio tercer cuatrimestre:*  $\overline{FCB} = \frac{\sum FCB_i}{n} = 0,70$

#### Factor de corrección de la depredación

Entre los meses de septiembre a diciembre I, se han colocado en diferentes puntos de las instalaciones dos equipos de fototrampeo APEMAN de 16 MP, dejando por cada equipo restos de cebo de forma secuencial hasta completar un total de diez muestras. Los cebos consistieron en aves accidentadas en infraestructuras viarias, de diferentes tamaños y familias taxonómicas para dotar de variabilidad al experimento. Los días que tardó cada muestra en desaparecer en se presentan en la siguiente tabla:

Muestra nº	Día de desaparición
1	2
2	1
3	0,5
4	0,5

Muestra nº	Día de desaparición
5	1
6	1,5
7	0,5
8	1
9	0,5
10	1

Tabla 12. Número de días que tardó en desaparecer cada muestra del experimento

Como se puede observar en la tabla anterior, existe una clara tendencia a la rápida desaparición de las muestras, siendo en casi todos los casos menor a la periodicidad semanal de las visitas. Por ello, el tiempo de permanencia calculado se considera reducido. Se obtiene el siguiente valor promedio:

*Tiempo de permanencia de cadáveres primer cuatrimestre ( $t_m$ ) = 2,1 días*

*Tiempo de permanencia de cadáveres segundo cuatrimestre ( $t_m$ ) = 0,95 días*

*Tiempo de permanencia de cadáveres tercer cuatrimestre ( $t_m$ ) = 0,95 días*

Para el cálculo de la **mortandad estimada** mediante la fórmula de Erickson se utilizan los siguientes valores:

	PARQUE EÓLICO					
	N	I	C	k	$t_m$	p
Primer cuatrimestre	6	11	8	6	2,1	0,70
Segundo cuatrimestre	6	11	3	6	0,95	0,65
Tercer cuatrimestre	6	8,5	14	6	0,95	0,70

	LÍNEA DE EVACUACIÓN					
	N	I	C	k	$t_m$	p
Primer cuatrimestre	51	15	2	51	2,1	0,70
Segundo cuatrimestre	51	15	1	51	0,95	0,65
Tercer cuatrimestre	51	15	2	51	0,95	0,65

La fórmula es la siguiente:

$$M = \frac{N \cdot I \cdot C}{k \cdot t_m \cdot p} \quad \text{Ecuación 3}$$

Donde:

**M** = Mortandad estimada.

**N** = Número total de aerogeneradores o apoyos.

**I** = Intervalo entre visitas de búsqueda (días).

**C** = Número total de cadáveres recogidos en el período estudiado.

**k** = Número de aerogeneradores/apoyos revisados.

**t<sub>m</sub>** = Tiempo medio de permanencia de un cadáver sobre el terreno.

**p** = Capacidad de detección del observador (Factor de corrección de eficacia de búsqueda).

### Parque eólico:

Introduciendo estos valores en la fórmula de Erickson, el resultado que daría es el siguiente:

$$M = \frac{6 \cdot 11 \cdot 8}{6 \cdot 2,1 \cdot 0,70} = \mathbf{59,86 \text{ individuos/cuatrimestre (primer cuatrimestre)}}$$

$$M = \frac{6 \cdot 11 \cdot 3}{6 \cdot 0,95 \cdot 0,65} = \mathbf{53,44 \text{ individuos/cuatrimestre (segundo cuatrimestre)}}$$

$$M = \frac{6 \cdot 8,5 \cdot 14}{6 \cdot 0,95 \cdot 0,70} = \mathbf{178,95 \text{ individuos/cuatrimestre (tercer cuatrimestre)}}$$

La tasa de mortandad estimada expresada **según el número de aerogeneradores** sería de **29,82** individuos por aerogenerador en el tercer cuatrimestre, mientras que para el segundo fue de **8,9** y para el primer cuatrimestre **9,98** siniestros por aerogenerador. La tasa de mortandad anual es, por tanto, 292,25 individuos al año (48,70 por cada uno de los 6 aerogeneradores).

### Línea de evacuación:

Introduciendo estos valores en la fórmula de Erickson, el resultado que daría es el siguiente:

$$M = \frac{51 \cdot 15 \cdot 2}{51 \cdot 2,1 \cdot 0,70} = \mathbf{20,41 \text{ individuos/cuatrimestre (primer cuatrimestre)}}$$

$$M = \frac{51 \cdot 15 \cdot 1}{51 \cdot 0,95 \cdot 0,65} = \mathbf{24,29 \text{ individuos/cuatrimestre (segundo cuatrimestre)}}$$

$$M = \frac{51 \cdot 15 \cdot 2}{51 \cdot 0,95 \cdot 0,70} = \mathbf{45,12 \text{ individuos/cuatrimestre (tercer cuatrimestre)}}$$

La tasa de mortandad estimada expresada **según el número de apoyos** sería de 0,4 individuos por apoyo en el primer cuatrimestre, de 0,47 para el segundo y para el tercer cuatrimestre 0,88 siniestros por apoyo. La tasa de mortandad anual es, por tanto, 89,82 individuos al año (1,76 por cada uno de los 51 apoyos).

### 5.2.4 Mortandad por aerogenerador

Al evaluar la distribución espacial de los siniestros con respecto a los distintos aerogeneradores que conforman el parque eólico El Campo, se puede observar que, en casi todos ellos se ha registrado alguna colisión durante el año 2023, excepto en el aerogenerador EC-01, Destaca el aerogenerador 5, con ocho colisiones.




Ilustración 2. Distribución espacial de la siniestralidad

### 5.2.5 Censo de aves

Se han avistado un total de **cuarenta y nueve especies** (ver Anexo I) en el parque eólico y **sesenta y tres** en la línea de evacuación.

De las avistadas en el **parque eólico** destaca por su estatus conservacionista según el **Catálogo Nacional de Especies Amenazadas** el milano real (En Peligro de Extinción) y el aguilucho cenizo (Vulnerable). En el **Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón** apa rece el milano real (En Peligro), mientras que se incluyen como Vulnerables el aguilucho cenizo y la chova piquirroja.

En lo que se refiere a la **línea de alta tensión**, se detectaron también las mismas especies del **Catálogo Nacional de Especies Amenazadas**, el milano real, catalogada “En Peligro” y el aguilucho cenizo calificado como “Vulnerable”. Además, aparecen en el **Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón** el milano real (En Peligro de Extinción) y el aguilucho cenizo y la chova piquirroja (Vulnerables).

- Milano real: En el parque eólico se ha anotado registros en cuatro ocasiones, todas con un único individuo, en dos ocasiones, correspondiente a las visitas del 24 de febrero y 1 de marzo, a una distancia 10-50 metros en vuelo de campeo entorno a EC-01 y las otros dos el 26 de abril y 31 de octubre, también en campeo a más de 100 metros de EC-03. Fuera de metodología se ha observado en 6 ocasiones, con un total de 6 ejemplares, en los meses de enero, marzo, abril, junio y octubre. En la línea se observa en 9 ocasiones, un individuo en cada ocasión, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y noviembre.
- Aguilucho cenizo: Un ejemplar observado fuera de metodología el día 26 de abril en el entorno del aerogenerador número 1. En la línea también se registra en una ocasión, visita del 7 de junio, un ejemplar entorno al apoyo número 5.
- Chova piquirroja: en el parque se anota en 12 ocasiones con un total de 76 ejemplares en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre y octubre. En la línea se ha avistado en 5 ocasiones (41 ejemplares). En la visita de mayo se observa un bando de 30 ejemplares.

En el Anexo I se detalla el grado de protección de las aves según el Real Decreto 139/11, que desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y el **Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA)**. En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada. Dicho catálogo se creó en aplicación de la Ley 4/1989 Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (hoy derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), por la que las especies se podrían incluir en dos categorías de amenaza. Estas categorías son las siguientes:

- En Peligro de Extinción (PE): Reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

Además, se incluye la categoría “IL” para aquellas especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial pero que no presentan un estatus de conservación comprometido (es decir, que no aparecen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).

Se añade también una columna (“CAT.REG.”) referida al **Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón**, el cual incluye aquellas especies, subespecies o poblaciones de la flora y fauna silvestres que requieran medidas específicas de protección en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma. Se incluye nuevamente la categoría “IL”, para aquellas especies incluidas en el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE).

A continuación, se muestra el número de individuos por especie avistados durante el ciclo anual:




Ilustración 3. Nº de individuos por especie avistados en el PE durante el ciclo anual




Ilustración 4. Nº de individuos por especie avistados en la LAT durante el ciclo anual

De las 49 especies registradas en el parque eólico destacan la cogujada común (262 ejemplares y el 18,4% de los registros totales), el jilguero con 204 ejemplares, el pardillo común con 173, sumando entre las tres especies el 44,8% de los registros totales. En la línea eléctrica se han registrado 63 especies destacando dos especies, estornino negro y el triguero, con bandos de cientos de estorninos en septiembre, noviembre y diciembre y un bando de miles de trigueros en el mes de noviembre.

### Control de vuelos

Siguiendo las recomendaciones del *Protocolo de seguimiento de parques eólicos del Gobierno de Aragón*, se ha tenido en cuenta la tipología de vuelo, incluyendo la distancia y la altura de vuelo respecto a los aerogeneradores. Se han empleado los datos obtenidos del estudio del uso del espacio aéreo, es decir, los puntos de observación.

A continuación, se detallan los registros de aves que efectuaron vuelos a una distancia menor a 50 metros de los aerogeneradores:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Nº INDIVIDUOS 0-10 m	Nº INDIVIDUOS 10-50 m	Nº INDIVIDUOS 50-1000 m
Águila calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	–	–	1
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	–	–	3
Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	5	19	8
Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	–	3	1
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	–	–	3
Chova piquirroja	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	–	3	49
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	–	–	3
Milano real	<i>Milvus milvus</i>	–	2	–

Tabla 13. Número de ejemplares avistados por especie a distancia del aerogenerador <100 metros

Se ha detectado una especie, buitre leonado (5 ejemplares) a una distancia inferior de 10 metros, 4 especies a menos de 50 metros (27 ejemplares en total) y 8 especies volando entre 50-100 metros de los aerogeneradores con un total de 68 ejemplares.

Respecto a las alturas, se incluyen los registros que se efectuaron en la zona de mayor riesgo, a la altura de la rotación de las palas (altura “b”):

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Nº INDIVIDUOS altura “b”
Águila calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	1
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1
Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	11
Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Nº INDIVIDUOS altura "b"
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1
Chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	12
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	3

Tabla 14. Número de ejemplares avistados por especie a la altura de las palas del aerogenerador

Durante los puntos de observación y en el estudio del uso del espacio aéreo, se detectaron a esta altura un total de 30 vuelos de 7 especies diferentes.

En condiciones de riesgo (distancia inferior a 50 metros y con altura "b" al mismo tiempo), se han anotado cinco registros de una misma especie, el buitre leonado, tratándose en dos ocasiones de un individuo solitario, en dos ocasiones 2 y en una ocasión 5 ejemplares, sumando un total de 11 individuos, todos ellos en los aerogeneradores 3 y 4.

### 5.3 SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS

El análisis pasivo ha registrado 23077 archivos con emisiones ultrasónicas que han permitido identificar las especies de quirópteros que se detallan en la siguiente tabla:

Nombre común	Nombre científico	CNEA	CAT. REG	Nº archivos	% archivos
Murciélago de borde claro	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	IL	-	9668	41,89%
Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	-	6882	29,82%
Murciélago de Cabrera	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IL	-	4019	17,84%
Murciélago montañero	<i>Hypsugo savii</i>	IL	-	1732	7,51%
Murciélago rabudo	<i>Tadarida teniotis</i>	IL	-	362	1,57%
Murciélago ratonero sp.	<i>Myotis sp.</i>	-	-	184	0,80%
Murciélago hortelano	<i>Eptesicus serotinus</i>	IL	-	68	0,29%
Murciélago orejudo sp.	<i>Plecotus sp.</i>	IL	-	20	0,09%
Nóctulo pequeño	<i>Nyctalus leisleri</i>	IL	-	11	0,09%
Murciélago mediterráneo de herradura	<i>Rhinolophus euryale</i>	VU	VU	4	0,05%
Nóctulo grande	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	VU	EP	3	0,02%

Tabla 15. Listado de especies de quirópteros detectadas

Se han identificado un total de 11 especies de quirópteros en el entorno del parque eólico. Los porcentajes dan idea de la actividad relativa de los quirópteros detectados por la grabadora automática, no siendo verdaderos índices de abundancia. Se observan valores similares en varias especies, siendo el género *Pipistrellus* el más activo, destacando sobre todas ellas *Pipistrellus kuhlii* seguido de *Pipistrellus pipistrellus* y *Pipistrellus pygmaeus*.

En cuanto a especies con interés conservacionista, cabe destacar la posible presencia de *Rhinolophus euryale* y el *Nyctalus lasiopterus*, catalogadas como “Vulnerables” en el CNEA y el Catálogo Regional de Aragón como “Vulnerable” y “En Peligro de Extinción” respectivamente, con porcentajes inferiores al 0,5%.

En el caso de los *Myotis* sp. se considera que la determinación específica dentro del género *Myotis* no es lo suficientemente fiable mediante ultrasonidos como para ser certeros con la especie, por lo que se ha optado por indicar simplemente el género. Sin embargo, sí que es probable que se trate de un *Myotis* de pequeño tamaño, es decir, en principio se podría excluir a *Myotis myotis* y *Myotis blithii*. Cabe destacar que el género *Myotis* engloba un buen número de especies con distintas categorías de protección, no siendo posible con los datos disponibles precisar por tanto el grado de protección del ejemplar detectado.

#### 5.4 SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD SONORA DEL AIRE

La Resolución establece en su punto 14 que *“Durante toda la fase de explotación del parque eólico, se deberán cumplir los objetivos de calidad acústica, según se determina en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en la 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón.”*

Se solicita por otra parte en el punto 15.g una *“Verificación periódica de los niveles de ruido producidos por el aerogenerador y del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa sectorial citada anteriormente; para ello, se ejecutarán las campañas de medición de ruido previstas en el estudio de impacto ambiental”*.

Para cumplir este punto, se ha realizado una verificación de los niveles de ruido operacionales, adjuntándose los resultados en el “ANEXO V: Informe de Contaminación acústica”.

Como se puede observar en dicho informe, el parque cumple con los niveles de ruido establecidos según la legislación vigente en todos los puntos analizados.

A continuación, se presentan las principales conclusiones extraídas de dicho informe:

Lugar medición	Ld	Le	Ln	Ley 7/2010 Ruido Aragón
Balsa La Estanca	40,2	43,8	49,6	CUMPLE
Base aerogenerador	56,1	55,7	61,5	CUMPLE

Condiciones de medición:

- LAT 1 min
- 6 mediciones por toma
- Media ponderada de mediciones válidas (+- 3 dB sobre valor medio)
- Calibración 94 dB

Los niveles de ruido generados por el parque eólico en las viviendas más cercanas son inferiores a los valores máximos descritos en la normativa de aplicación en los períodos día-tarde (55 dBA) y noche (45 dBA). **CUMPLE los valores de inmisión.**

#### 5.5 SEGUIMIENTO DE LA EROSIÓN, DRENAJES Y RESTAURACIÓN VEGETAL

---

En el punto 9.f de la DIA se establece que *“Los procesos erosivos que se puedan generar a consecuencia de la construcción del parque eólico, deberán ser corregidos durante toda la vida útil de la instalación.”*. Además, se establece en el punto 15 la obligatoriedad de hacer un *“Seguimiento de los procesos erosivos y del drenaje natural del terreno”*, así como *“de las labores de revegetación y de la evolución de la cubierta vegetal en las zonas afectadas por las obras”*.

Durante el periodo de estudio se ha comprobado el estado de todas las estructuras de drenaje del parque eólico, y la incidencia de posibles encharcamientos, cárcavas o **fenómenos erosivos** asociados a infraestructuras del parque eólico. También se ha llevado a cabo la valoración de las condiciones fisiográficas y cromáticas de los terrenos de afección.

A lo largo del periodo evaluado en el presente informe, los sistemas de drenaje se han encontrado en líneas generales limpios, recogiendo el agua de lluvia y evacuándola fuera del parque eólico, no detectándose problemas de encharcamiento graves, salvo algunas pequeñas acumulaciones de agua en las plataformas, aunque de escasa entidad. No se han localizado tampoco **procesos erosivos** como consecuencia de modificaciones en la evacuación natural del agua de lluvia, ni otras **incidencias** en las instalaciones del parque eólico, por lo que no quedan incidencias pendientes de resolver a fecha del presente informe.

Respecto a los trabajos de **restauración vegetal**, los procesos siguen su curso y no se estima necesario realizar más labores de restauración.

#### 5.6 SEGUIMIENTO DE LA PRESENCIA DE CARROÑA EN EL ENTORNO DE LA INSTALACIÓN

---

En el punto 9.e la DIA establece que *“Deberá evitarse de forma rigurosa el abandono de cadáveres de animales o de sus restos dentro o en el entorno del parque eólico, con el objeto de evitar la presencia en su zona de influencia de aves necrófagas o carroñeras. Si es preciso, será el propio personal del parque eólico quien deba realizar las tareas de retirada de los restos orgánicos. En el caso de que se detecten concentraciones de rapaces necrófagas debido a vertidos de cadáveres, prescindiendo de los sistemas autorizados de gestión de los mismos en las proximidades del parque eólico que pueda suponer una importante fuente de atracción para buitre leonado y otras rapaces, se pondrá en conocimiento de los Agentes de Protección de la Naturaleza, para que actúen en el ejercicio de sus funciones”*.

Durante el período estudiado, no se ha detectado ninguna **carroña** en la zona de estudio.

### 5.7 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Como se ha mencionado en el punto 4.3, como medidas complementarias de innovación se ha llevado a cabo el pintado del quinto final de las palas de color rojo de los aerogeneradores 5 y 6 para favorecer su visibilidad y disminuir las colisiones.

Los datos obtenidos se muestran a continuación:

Fecha	Aerog. más próximo	Colisión	Especie avistada	Nº individuos	Reacción
16/02/2023	EC 06	No	Buitre leonado	6	No
09/05/2023	EC 06	No	Milano negro	1	No
09/05/2023	EC 06	No	Busardo ratonero	4	No
24/05/2023	EC 06	No	Milano negro	1	No
24/05/2023	EC 06	No	Águila calzada	1	No
06/06/2023	EC 06	No	Buitre leonado	1	No
06/06/2023	EC 06	No	Milano negro	2	No
06/06/2023	EC 06	No	Buitre leonado	2	No
16/06/2023	EC 06	No	Milano negro	2	No
16/06/2023	EC 06	No	Aguilucho lagunero	2	No
14/07/2023	EC 06	No	Buitre leonado	1	No
19/09/2023	EC 05	No	Busardo ratonero	1	No
17/10/2023	EC 06	No	Buitre leonado	3	No

Tabla 16. Número de individuos observados por aerogenerador

Como puede apreciarse, durante el período de estudio se han observado **27 ejemplares**, siendo las especies identificadas el águila calzada, aguilucho lagunero, buitre leonado, busardo ratonero y el milano negro haciendo un uso del espacio aéreo próximo a los aerogeneradores con medidas implantadas. En ninguno de los casos se ha observado un efecto disuasorio que implique una variación en la **dirección de vuelo** o el comportamiento de las aves.

Fecha	Nombre común	Nombre científico	CNEA*	Sexo	Edad	UTMx	UTMy	Distanc.	Orientac.	Aerog.
24/05/23	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	PE	Indet.	Indet.	625336	4640750	60m	NE	EC 05
12/09/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625254	4640775	20m	NO	EC 05
12/09/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Hembra	Indet.	625256	4640774	18m	NO	EC 05
26/09/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625275	4640769	9m	S	EC 05
26/09/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Indet.	Indet.	625283	4640770	6m	E	EC 05
03/10/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Indet.	Indet.	625269	4640737	30m	E	EC 05
03/10/23	Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IL	Indet.	Indet.	625332	4640724	70m	NE	EC 05

Fecha	Nombre común	Nombre científico	CNEA*	Sexo	Edad	UTMx	UTMy	Distanc.	Orientac.	Aerog.
17/10/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625253	4640784	15m	O	EC 05
20/04/23	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625668	4640986	36m	E	EC 06
05/07/23	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	IL	Indet.	Indet.	625610	4640982	25m	E	EC 06
12/09/23	-	<i>Pipistrellus sp.</i>	Indet.	Indet.	Indet.	625598	4640948	18m	E	EC 06
25/10/23	Murciélago rabudo	<i>Tadarida teniotis</i>	IL	Macho	Adulto	625585	4640127	42m	SO	EC 06
31/10/2023	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	Indet.	Indet.	Adulto	625603	4641011	60m	NO	EC 06

Tabla 17. Mortandad en los aerogeneradores donde se ha implantado la medida

Respecto a la siniestralidad encontrada en estos aerogeneradores, de los 25 siniestros detectados en el parque eólico durante el año 2023, 13 se corresponden con aerogeneradores con medidas implantadas, correspondiendo al 52% del total de los siniestros registrados en 2023. El aerogenerador EC-05 registra ocho colisiones, una corresponde a un milano real y siete a murciélagos y el aerogenerador EC-06 cinco colisiones, 1 milano negro, 1 jilguero, 1 estornino y 2 murciélagos.

Deteniéndonos en el tamaño de las especies colisionadas, de las 13 especies siniestradas sólo dos de mayor tamaño (milano negro y milano real) colisionaron con un aerogenerador con las palas pintadas, el resto corresponde a nueve quirópteros y a dos passeriformes.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los siniestros y el tamaño muestral del uso del espacio aéreo en los aerogeneradores donde se ha implantado la medida, con los datos actuales no se puede concluir la eficacia de la medida de manera definitiva. En una primera consideración no parece influir directamente en el comportamiento observado en las aves, tampoco en la siniestralidad, al registrar casi la mitad de los siniestros detectados durante el año 2023.

## 6. INCIDENTES

Durante el período estudiado de seguimiento ambiental no se ha detectado ningún incidente relevante en el parque eólico “El Campo” ni en su línea de evacuación, más allá de los comentados en cuanto a siniestralidad.

## 7. VALORACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES

- La evaluación final del Programa de Vigilancia Ambiental para el período de referencia en el Parque Eólico “El Campo” y su línea de evacuación es que **se desarrolla uniformemente en el tiempo y de manera correcta**. De la misma manera, se ajusta a lo dispuesto en los documentos que lo controlan, como es la Resolución del expediente 500201/01/2018/05151, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, no apreciándose una afección significativa a ningún medio.
- Durante el ciclo anual, se han dado 25 **episodios de siniestralidad** en el parque eólico (4,17 por aerogenerador) y 5 en la línea de tensión (0,1 por apoyo). La **mortandad estimada** del parque eólico queda de la siguiente forma:
  - Enero 2023 – abril 20223 *59,86 individuos al cuatrimestre*  
*9,98 siniestros por aerogenerador y cuatrimestre*
  - Mayo 2023 – agosto 2023: *53,44 individuos al cuatrimestre*  
*8,9 siniestros por aerogenerador y cuatrimestre*
  - Septiembre 2023 – diciembre 2023: *178,95 individuos al cuatrimestre*  
*29,82 siniestros por aerogenerador y cuatrimestre*
  - **Año 2023:** ***292,25 individuos al año***  
***48,71 siniestros por aerogenerador y año***
- Mientras que para la línea de tensión la **mortandad estimada** queda de la siguiente forma:
  - Enero 2023 – abril 2023: *20,41 individuos al cuatrimestre*  
*0,40 siniestros por apoyo y cuatrimestre*
  - Mayo 2023 – agosto 2023: *24,29 individuos al cuatrimestre*  
*0,47 siniestros por apoyo y cuatrimestre*
  - Septiembre 2023 – diciembre 2023: *45,12 individuos al cuatrimestre*  
*0,88 siniestros por apoyo y cuatrimestre*
  - **Año 2023:** ***89,82 individuos al año***  
***1,76 siniestros por apoyo y año***
- Según diferentes estudios, la tasa de mortalidad por aerogenerador y año varía entre 0,63 y 10 aves en Estados Unidos (NWCC, 2004). En España, varía entre 1,2 en Oíz (Vizkaya; Unamuno et al., 2005) y 64,26 en el PE El Perdón (Navarra; Lekuona, 2001) (Atienza et al., 2008). En este contexto, **el valor detectado en “El Campo” resulta moderado**.
- Del total de las especies de avifauna detectadas (49 especies en el parque eólico y 63 en la línea), destacan por su estatus conservacionista según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas el milano real (En Peligro de Extinción) y el aguilucho cenizo (Vulnerable). En el **Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón** aparece el milano real (En Peligro), mientras que se incluyen como Vulnerables el aguilucho cenizo y la chova piquirroja.

- En cuanto a número de individuos censados, en el parque destacan la cogujada común (262 ejemplares), el jilguero (204), pardillo común (173) sumando entre las tres especies el 44,8% de los registros totales. En la línea eléctrica de las 63 especies destacan el estornino negro y el triguero, con bandos de cientos de estorninos en septiembre, noviembre y diciembre y un bando de miles de trigueros en el mes de noviembre.
- En condiciones de **vuelo** con riesgo se han anotado cinco registros de una misma especie, buitre leonado, tratándose en dos ocasiones de un individuo solitario, en otras dos ocasiones 2 individuos y en una ocasión 5 ejemplares, sumando un total de 11 individuos, todos ellos en los aerogeneradores 3 y 4.
- Respecto a los **quirópteros**, se han identificado un total de 11 especies en el entorno del parque, siendo el género *Pipistrellus* el más activo, destacando *Pipistrellus kuhlii* con el mayor número de archivos registrados por la grabadora pasiva seguido de *Pipistrellus pipistrellus* y *Pipistrellus pygmaeus*. En cuanto a especies con interés conservacionista, destacar la posible presencia de *Rhinolophus euryale* y el *Nyctalus lasiopterus*, catalogadas como “Vulnerables” en el CNEA y en el Catálogo Regional de Aragón como “Vulnerable” y “En Peligro de Extinción” respectivamente, con porcentajes muy inferiores al 0,5%.
- En cuanto a la gestión de **residuos**, no se ha detectado ninguna incidencia, de modo que a fecha del presente informe no hay ningún residuo abandonado o incidente relativo a residuos sin resolver.
- En lo que se refiere al **estado del parque**, a lo largo del periodo tampoco se ha detectado ninguna incidencia.
- Se continúa utilizando el **arcón congelador** para los siniestros encontrados en el parque, de manera conjunta para los parques eólicos El Campo, San Francisco de Borja, Dehesa de Mallén y La Estanca.
- Los procesos de **restauración vegetal** siguen su curso y no se estima necesario realizar más labores de restauración.
- Durante el período estudiado, no se ha detectado ninguna **carroña** en la zona de estudio.
- Los resultados obtenidos en la medición de los **niveles sonoros** realizada en el parque eólico cumplen con los límites establecidos en la normativa vigente.
- Respecto a la **medida de innovación** implantada en los aerogeneradores 5 y 6, consistentes en el pintado de las palas, con el objetivo de aumentar su visibilidad y reducir el riesgo de colisión por parte de la avifauna, no se puede concluir la eficacia de la medida de manera definitiva, aunque en una primera consideración no parece influir directamente en el comportamiento observado en las aves, tampoco en la siniestralidad, al registrar casi la mitad de los siniestros detectados durante el año 2023 (sólo dos corresponden a rapaces).

## 8. BIBLIOGRAFÍA

**Allué, J.L., 1990.** Atlas Fitoclimático de España. Taxonomías. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

**Anderson, R.; Morrison, M.; Sinclair, K. & Strickland, D. 1999.** *Studying Wind Energy/Bird Interactions: A Guidance Documents*. National Wind Coordinating Committee. Aian Subcommittee. Washington D.C.

**Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante y J. Valls. 2008.** *Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 1.0)*. SEO/Birdlife, Madrid.

**Carrascal, L.M. y Palomino, D., 2008.** Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. SEO/Birdlife. Madrid.

**CEC & CDFG (California Energy Commission and California Department of Fish and Game). 2007.** *California Guidelines for Reducing Impacts to Birds and Bats from Wind Energy Development*. Committee Draft Report. California Energy Commission, Renewables Committee, and Energy Facilities Siting Division, and California Department of Fish and Game, Resource Management and Policy Division.

**CEIWEP (Committee on Environment Impacts of Wind-Energy Projects). 2007.** *Environmental Impacts of Wind Energy Projects*. National Research Council of the National Academies. The National Academies Press. Washington D.C.

**Erickson, W.P.; Gritski, B. & Kronner, K. 2003.** *Nine Canyon Wind Power project avian and bat monitoring report*, September 2002-August 2003. Technical report submitted to Energy Northwest and the Nine Canyon Technical Advisory Committee.

**Escandell, V. 2005.** **Seguimiento de Aves Nocturnas en España. Programa NOCTUA. Informe 2003-2004.** Análisis y establecimiento de una nueva metodología. SEO/BirdLife. Madrid.

**Gauthreaux, S.A. (1996)** Suggested practices for monitoring bird populations, movements and mortality in wind resource areas. Proceedings of the National Avian-Wind Power Planning Meeting II, Palm Springs, CA, 1995, pp. 80-110. NWCC c/o RESOLVE Inc., Washington, DC & LGL Ltd., King City, Ontario. Committee.

**Johnson, G.; Erickson, W.; White, J. & McKinney, R. 2003.** *Avian and bat mortality during the first year of operation at the Klondike Phase*. Wind Porject, Sherman County, Oregon. WEST, Inc. Cheyenne.

**Langston, R.H.W. & Pullan J.D. 2004.** Effects of wind farms on birds. RSPB-Birdlife International. *Nature and environment*, Nº 139.

**Lekuona, J.M. 2001.** Uso del espacio por la avifauna y control de la mortalidad de aves y murciélagos en los parques eólicos de Navarra en un ciclo anual. Informe para la Dirección General de Medio Ambiente-Gobierno de Navarra.

**Madroño, A; González, C.; Atienza, J.C. 2004.** Libro Rojo de las Aves de España. Dirección general de la Biodiversidad SEO-Birdlife. Madrid.

**NWCC. 2004.** *Wind turbine interactions with birds and bats: a summary of research results and remaining questions*, National Wind Coordinating Committee, nov. 2004. [www.nationalwind.org](http://www.nationalwind.org)

**Orloff, S. & A. Flannery. 1992.** *Wind turbine effects on avian activity, habitat use, and mortality in Altamont Pass and Solano County Wind Resource Areas*. Rep. from BioSystems Analysis Inc., Tiburon, CA, for Calif. Energy Commis. [Sacramento, CA], and Planning Depts, Alameda, Contra Costa and Solano Counties, CA.

**Palomo, J. & Gisbert, J., 2008.** Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. ICONA (Organismo Autónomo de Parques Nacionales).

**Rivas-Martínez, S., 1987.** Mapa de series de vegetación de España. Editado por Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

**Schwartz, S.S. (Ed.). 2004.** *Proceedings of the Wind Energy and Birds/Bats Workshop: Understanding and Resolving Birds and Bats Impacts*. RESOLVE, Inc. Washington, D.C.

**Smallwood, K.S. & Thelander, C.G. 2004.** *Developing methods to reduce bird mortality in the Altamont Pass Wind Resource Area*. Final report by BioResource Consultants to the California Energy Commission.

**Tellería, J.L. 1986.** Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Ed. Raices, Madrid.

**Unamuno, J.M. et al. 2005.** Estudio sobre la incidencia sobre la avifauna del Parque Eólico de Oiz (Bizkaia), Noviembre 2003- Diciembre 2004. Informe del programa de vigilancia ambiental.

**Winkelman, J.E. 1989.** Birds and the wind park near Urk: collision victims and disturbance of ducks, geese and swans. RIN Rep.89/15. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem, The Netherlands. Dutch, Engl. Summ.

**PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL**

**ANEXOS**

**PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL**

**ANEXO I: CENSO DE AVES VIVAS**

**PARQUE EÓLICO:**

	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	TOTAL	CAT.REG.	CNEA
1	Abejaruco europeo	<i>Merops apiaster</i>	4		IL
2	Abejero europeo	<i>Pernis apivorus</i>	3		IL
3	Abubilla común	<i>Upupa epops</i>	6		IL
4	Águila calzada	<i>Hieraetus pennatus</i>	1		IL
5	Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	6		IL
6	Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	1	VU	VU
7	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	17		IL
8	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1		IL
9	Alcaudón real	<i>Lanius meridionalis</i>	1		IL
10	Alondra común	<i>Alauda arvensis</i>	89	IL	_
11	Alondra totovía	<i>Lullula arborea</i>	5		IL
12	Avión común	<i>Delichon urbicum</i>	30		IL
13	Bisbita pratense	<i>Anthus pratensis</i>	5		IL
14	Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	87		IL
15	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	13		IL
16	Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	44		IL
17	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2		IL
18	Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	9		IL
19	Chorlitejo chico	<i>Charadrius dubius</i>	3		IL
20	Chova piquirroja	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	76	VU	IL
21	Cigüeña	<i>Ciconia ciconia</i>	1	IL	IL
22	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	262		IL
23	Cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>	19		IL
24	Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	4		IL
25	Collalba gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>	4		IL

	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	TOTAL	CAT.REG.	CNEA
26	Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	4		IL
27	Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1		–
28	Corneja negra	<i>Corvus corone</i>	4		–
29	Culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>	1		IL
30	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1		IL
31	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	59		–
32	Estornino pinto	<i>Sturnus vulgaris</i>	12		–
33	Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	1		IL
34	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	4		IL
35	Grajilla occidental	<i>Corvus monedula</i>	66		–
36	Grulla común	<i>Grus grus</i>	40	IL	IL
37	Jilguero europeo	<i>Carduelis carduelis</i>	204	IL	–
38	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	1		IL
39	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	26		IL
40	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	10	EP	PE
41	Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	2		IL
42	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	20		–
43	Pardillo común	<i>Linaria cannabina</i>	173	IL	–
44	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	13		–
45	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	28		IL
46	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	8		IL
47	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	40	IL	–
48	Urraca	<i>Pica pica</i>	7		–
49	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	6	IL	–

LAT:

	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	TOTAL	CAT.REG.	CNEA
1	Abejaruco europeo	<i>Merops apiaster</i>	18		IL
2	Abubilla común	<i>Upupa epops</i>	4		IL
3	Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	5		IL
4	Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	1	VU	VU
5	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	48		IL
6	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	3		IL
7	Alondra común	<i>Alauda arvensis</i>	93	IL	–
8	Ánade azulón	<i>Anas platyrhynchos</i>	3		–
9	Avión común	<i>Delichon urbicum</i>	3		IL
10	Azor común	<i>Accipiter gentilis</i>	3		IL
11	Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	4		IL
12	Bisbita pratense	<i>Anthus pratensis</i>	2		IL
13	Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	52		IL
14	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	14		IL
15	Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	119		IL
16	Calandria común	<i>Melanocorypha calandra</i>	6		IL
17	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2		IL
18	Cernícalo primilla	<i>Falco naumanni</i>	8		IL
19	Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	21		IL
20	Chova piquirroja	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	41	VU	IL
21	Cigüeña	<i>Ciconia ciconia</i>	2	IL	IL
22	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	233		IL
23	Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	16		IL
24	Collalba gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>	4		IL
25	Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1		IL
26	Corneja negra	<i>Corvus corone</i>	20		–

	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	TOTAL	CAT.REG.	CNEA
27	Cuervo grande	<i>Corvus corax</i>	1	IL	–
28	Culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>	3		IL
29	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2		IL
30	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	3		IL
31	Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	4		IL
32	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	3857		–
33	Estornino pinto	<i>Sturnus vulgaris</i>	502		–
34	Garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>	1	IL	IL
35	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	376		IL
36	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	105		–
37	Grajilla occidental	<i>Corvus monedula</i>	4		–
38	Grulla común	<i>Grus grus</i>	55	IL	IL
39	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	72	IL	–
40	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	4		IL
41	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	9		IL
42	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	9	EP	PE
43	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	20		–
44	Mochuelo común	<i>Athene noctua</i>	1		IL
45	Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	6		IL
46	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	58		–
47	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	101		–
48	Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1		IL
49	Pardillo común	<i>Linaria cannabina</i>	146	IL	–
50	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	27		–
51	Petirrojo europeo	<i>Erithacus rubecula</i>	6		IL
52	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	61		IL
53	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	11		IL

	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	TOTAL	CAT.REG.	CNEA
54	Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1		IL
55	Terrera marismeña	<i>Calandrella rufescens</i>	6		IL
56	Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	4		–
57	Totovía	<i>Lullula arborea</i>	1		IL
58	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2660	IL	–
59	Urraca	<i>Pica pica</i>	54		–
60	Vencejo común	<i>Apus apus</i>	20		IL
61	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	21	IL	–
62	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	4	IL	–
63	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	6		–

**PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL**

**ANEXO II: REPORTAJE FOTOGRÁFICO**



*Fotografías 1 a 4: Visibilidad del parque y línea eléctrica*



*Fotografías 5 y 6: Barquilla del aerogenerador sin derrames de aceite*



*Fotografía 5: Palas pintadas*



*Fotografías 6 a 9: Estado de caminos y viales*



Fotografías 10 y 11: Identificación aerogeneradores



Fotografías 12 y 13: Señales alineaciones



Fotografía 14: Cartel informativo



Fotografías 15 y 16: SET El Campo y SET Magallón



*Fotografías 17 y 18: Apoyos línea alta tensión*



*Fotografías 19 y 20: Salvapájaros*



Fotografía 21: Señalización apoyos de la línea de alta tensión



*Fotografías 22 y 23: Señalización bases apoyos de la línea de alta tensión*



Fotografías 24 a 27: Almacenamiento de residuos




*Fotografía 28: Almacenamiento de residuos peligrosos*




Fotografías 29 y 30: Drenajes

**PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL**

**ANEXO III: PLANOS**



Promotor: 	PROYECTO: <b>Plan de Vigilancia Ambiental PE El Campo</b>		<b>LEYENDA</b>  ☉ Aerogenerador	ESCALA:	FECHA:
Equipo redactor: 	MAPA: <b>Plano de Siniestralidad Ciclo anual 2023</b>	N°: <b>01</b>		<b>1: 6.000</b>	<b>Enero 2024</b>
SISTEMA DE REFERENCIA				<b>DATUM: ETRS89; UTM: 30N</b>	



Promotor: 	PROYECTO: <b>Plan de Vigilancia Ambiental LAAT El Campo</b>		<b>LEYENDA</b>  Apoyos  Aguilucho lagunero  Ánade real  Estornino negro  Grulla común  Zorzal común	ESCALA:	FECHA:
Equipo redactor: 	MAPA: <b>Plano de Siniestralidad Ciclo anual 2023</b>	N°: <b>02</b>		<b>1: 35.000</b>	<b>Enero 2024</b>
SISTEMA DE REFERENCIA <b>DATUM: ETRS89; UTM: 30N</b>					

**PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL**

**ANEXO IV: FICHAS DE SINIESTRALIDAD**

## DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: Parque Eólico El Campo	FECHA REGISTRO: 01/02/2023 HORA REGISTRO: 12.02 h.
TECNICO DEL HALLAZGO: Daniel Fernández	
DEPOSITADO: Se deposita en el arcón congelador de la subestación	CÓDIGO: EC-01

## CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Buitre leonado ( <i>Gyps fulvus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: Restos	SEXO: Indeterminado
DIAGNOSTICO: Probable colisión con el aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Se encuentra el ejemplar descompuesto	CAT.REGIONAL: <i>Li</i>

## LOCALIZACION

## REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PRÓXIMA:

Identificación: A-3  
Distancia (m): 80 m  
Orientación: Este

HABITAT DEL ENTORNO: Ladera de matorral mediterráneo rodeada de campos de cultivo

COORDENADAS (ETRS89)  
UTM<sub>x</sub>: 674.294  
UTM<sub>y</sub>: 4.641.060

OBSERVACIONES: Se deposita el ejemplar en el arcón congelador de la subestación tras avisar al APN correspondiente.

## FOTOGRAFIA DE DETALLE



## FOTOGRAFIA PANORAMICA



## DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: PE El Campo	FECHA REGISTRO: 15/03/2023 HORA REGISTRO: 9:40
DEPÓSITO: Se deposita en el arcón congelador de la subestación	CÓDIGO: EC-02
TECNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	

## CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Colirrojo tizón ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACIÓN: FALLECIDO (CUERPO FRACCIONADO)	SEXO: H
DIAGNÓSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Cuerpo seccionado. Faltan patas y cola que no se encuentran (zona caudal).	CAT.REGIONAL: -

## LOCALIZACIÓN

## REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MÁS PRÓXIMA:

Identificación: EC 03  
Distancia (m): 80 m  
Orientación: Sureste

HÁBITAT DEL ENTORNO: Campos de cultivo.

COORDENADAS UTM  
ETRS89-Huso 30 624422 4641182

OBSERVACIONES: Se deposita el ejemplar en el arcón congelador de la subestación tras avisar al APN correspondiente.

## FOTOGRAFÍA DE DETALLE



## FOTOGRAFÍA PANORÁMICA



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: El Campo	FECHA REGISTRO: 23/3/2023 HORA REGISTRO: 11:20
DEPÓSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-03
TÉCNICO DEL HALLAZGO: José María Rodríguez Rabadán	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Aguilucho lagunero occidental ( <i>Circus aeruginosus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: Fresco	SEXO: M
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Ejemplar entero y fresco de Aguilucho lagunero.	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PRÓXIMA: Identificación: EC 02 Distancia (m): 1 m Orientación: Este	
HÁBITAT DEL ENTORNO: Campos de cultivo- Monte	COORDENADAS ( ETRS89) UTMx 624055 UTMy 4640863
OBSERVACIONES: Se deposita en el arcón de la SET tras tomar fotografías y coordenadas y avisar correspondientemente.	

**FOTOGRAFÍA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 05/04/2023 HORA REGISTRO: 10:58
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-04
TECNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Gorrión chillón ( <i>Petronia petronia</i> )	EDAD: Adulto
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Se localiza el cuerpo entero. Fresco	CAT.REGIONAL: -

LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 03 Distancia (m): 25 m Orientación: Sureste	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624360 4641137
OBSERVACIONES: Se deposita en el arcón de la SET tras tomar fotografías y coordenadas y avisar al APN correspondientemente.	

FOTOGRAFIA DE DETALLE



FOTOGRAFÍA PANORAMICA



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 5/4/23 HORA REGISTRO: 11:28
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-05
TECNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Pinzón vulgar ( <i>Fringilla coelebs</i> )	EDAD: Adulto
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: M
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Se localiza el cuerpo entero.Fresco	CAT.REGIONAL: -


**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 02 Distancia (m): 18 m Orientación: Noreste	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624063 4640843
OBSERVACIONES: Se deposita en el arcón de la SET tras tomar fotografías y coordenadas y avisar al APN correspondientemente.	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE**



**FOTOGRAFÍA PANORAMICA**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 05/04/23 HORA REGISTRO: 11:37
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-06
TECNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Cogujada montesina ( <i>Galerida theklae</i> )	EDAD: Adulto
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Se localiza el cuerpo entero. No fresco.	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 02 Distancia (m): 15 m Orientación: Noreste	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivos.	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624049 4640885
OBSERVACIONES: Se deposita en el arcón de la SET tras tomar fotografías y coordenadas y avisar al APN correspondientemente.	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE**



**FOTOGRAFÍA PANORAMICA**



DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 20/4/23 HORA REGISTRO: 13:23
DEPOSITO: DEPÓSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-07
TECNICO DEL HALLAZGO: Andrés Fernández Jiménez	

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Jilguero europeo ( <i>Carduelis carduelis</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO FRACCIONADO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Ala izquierda con restos del torso.	CAT.REGIONAL: IL

LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 06 Distancia (m): 36 m Orientación: Este	
HABITAT DEL ENTORNO: Plataforma del aerogenerador.	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 625668 4640986
OBSERVACIONES: Se deposita en el arcón de la SET tras tomar fotografías y coordenadas y avisar correspondientemente.	

FOTOGRAFIA DE DETALLE



FOTOGRAFÍA PANORAMICA



## DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 20/4/23/ HORA REGISTRO: 14:14
DEPÓSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-08

TECNICO DEL HALLAZGO: Andrés Fernández Jiménez

## CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Murciélago enano ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Cadáver con insectos y partes en descomposición.	CAT.REGIONAL: -

## LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA:

Identificación: EC 04  
Distancia (m): 30 m  
Orientación: Norte

HABITAT DEL ENTORNO:

Plataforma del aerogenerador.

COORDENADAS UTM  
ETRS89-Huso 30 624513 4641512

OBSERVACIONES: Se deposita en el arcón de la SET tras tomar fotografías y coordenadas y avisar correspondientemente.

## FOTOGRAFIA DE DETALLE



## FOTOGRAFÍA PANORAMICA



DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: LAT El Campo	FECHA REGISTRO: 29/03/2023 HORA REGISTRO: 13:27
DEPOSITO: Se avisa a los APNs para que procedan a su recogida en cumplimiento del protocolo de recogida de cadáveres	CODIGO: LCA-1

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Grulla común ( <i>Grus grus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Posible colisión con tendido eléctrico	CNEA: <i>Li</i>
OBSERVACIONES: Cuerpo entero	CAT.REGIONAL: <i>LESPRE</i>

LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: LAT-47 Distancia (m): 60 m Orientación: Suroeste	
HABITAT DEL ENTORNO: Campo de cultivo	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 634085 4632554
OBSERVACIONES: Cuerpo entero con lesiones apreciables	

FOTOGRAFIA DE DETALLE



FOTOGRAFÍA PANORAMICA



DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: LAT El Campo	FECHA REGISTRO: 29/03/2023 HORA REGISTRO: 13:59
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: LCA-2

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Aguilucho lagunero occidental ( <i>Circus aeruginosus</i> )	EDAD: Adulto
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: Hembra
DIAGNOSTICO: Electrocción en tendido eléctrico	CNEA: Li
OBSERVACIONES: Cuerpo entero y rígido	CAT.REGIONAL: -

LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: LAT-47 Distancia (m): 53 m Orientación: Noreste	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivo	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 634214 4632641
OBSERVACIONES: Claros signos de electrocción	

FOTOGRAFIA DE DETALLE



FOTOGRAFÍA PANORAMICA



DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 24/5/23/ HORA REGISTRO: 10:45
DEPOSITO: Otras actuaciones. Se llama al APN siguiendo el protocolo del gobierno de Aragón ya que al tratarse de una especie en peligro de extinción la tiene que manipular el APN.	CODIGO: EC-09
TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo	

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Milano real ( <i>Milvus milvus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: PE
OBSERVACIONES: Cuerpo entero pero algo deformado por el impacto	CAT.REGIONAL: PE

LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 05 Distancia (m): 60 m Orientación: Noreste	
HABITAT DEL ENTORNO: Erial con herbáceas secas	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 625336 4640750
OBSERVACIONES: Se llama al APN siguiendo el protocolo del gobierno de Aragón ya que al tratarse de una especie en peligro de extinción la tiene que manipular el APN.	

FOTOGRAFIA DE DETALLE



FOTOGRAFIA PANORAMICA



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: LAT El Campo	FECHA REGISTRO: 28/6/23/ HORA REGISTRO: 13:03
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: LCA-3
TECNICO DEL HALLAZGO: Andrés Fernández Jiménez	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Ánade azulón ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	EDAD: Adulto
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: H
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Cadáver fresco con lesión visible en el cuello.	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: AP-20 Distancia (m): 60 m Orientación: Sur	
HABITAT DEL ENTORNO: Vial de la línea.	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 626250 4634861
OBSERVACIONES: Se deposita en el arcón de la SET tras tomar fotografías y coordenadas y avisar correspondientemente	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFIA PANORAMICA**

### DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 05/07/23/ HORA REGISTRO: 12:37
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-10
TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo	

### CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Milano negro ( <i>Milvus migrans</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO DEPREDADO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Cuerpo parcialmente deborado.	CAT.REGIONAL: -


### LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA:	
Identificación: EC 06 Distancia (m): 25 m Orientación: Este	
HABITAT DEL ENTORNO:	COORDENADAS UTM
Encontrado en plataforma rodeado de zona de matorral bajo	ETRS89-Huso 30 625610 4640982
OBSERVACIONES: Se toman los datos necesarios y se lleva al arcón de la set	

### FOTOGRAFIA DE DETALLE



### FOTOGRAFÍA PANORAMICA



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 29/8/23/ HORA REGISTRO: 10:18
DEPOSITO: Depositado arcón congelador SET El Campo	CODIGO: EC-11
TECNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Azor común ( <i>Accipiter gentilis</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO FRACCIONADO)	SEXO: M
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Se Localiza el cuerpo fraccionado.	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 04 Distancia (m): 70 m Orientación: Norte	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624535 4641399
OBSERVACIONES:	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE**



**FOTOGRAFÍA PANORAMICA**



### DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Parque Eólico El Campo		FECHA REGISTRO: 12/09/2023 HORA REGISTRO: 11:07
TÉCNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas		
DEPOSITADO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.		CÓDIGO: EC-12

### CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Murciélago enano ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Fallecido (Cuerpo entero)	SEXO: H
DIAGNÓSTICO: Probable colisión con el aerogenerador.	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Cuerpo entero.	CAT.REGIONAL: -

### LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MÁS PRÓXIMA: Identificación: EC-05 Distancia (m): 18 Orientación: Noroeste	
HÁBITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS (ETRS89) UTM <sub>x</sub> : 625.256 UTM <sub>y</sub> : 4.640.774
OBSERVACIONES:	

### FOTOGRAFIA DE DETALLE



### FOTOGRAFIA PANORAMICA



### DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Parque Eólico El Campo		FECHA REGISTRO: 12/09/2023 HORA REGISTRO: 11:13
TÉCNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas		
DEPOSITADO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.		CÓDIGO: EC-13

### CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: ( <i>Pipistrellus sp</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Fallecido (Cuerpo depredado)	SEXO: I
DIAGNÓSTICO: Probable colisión con el aerogenerador.	CNEA: -
OBSERVACIONES: Depredado por avispas	CAT.REGIONAL: -

### LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MÁS PRÓXIMA: Identificación: EC-05 Distancia (m): 20 Orientación: Noroeste	
HÁBITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS (ETRS89) UTM <sub>x</sub> : 625.254 UTM <sub>y</sub> : 4.640.775
OBSERVACIONES:	

### FOTOGRAFIA DE DETALLE



### FOTOGRAFIA PANORAMICA



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION:

LAT El Campo

FECHA REGISTRO: 18/09/2023

HORA REGISTRO: 14:30

DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.

CODIGO: LCA-04

TECNICO DEL HALLAZGO: Ángel Rubio Palomar

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**ESPECIE: Zorzal común (*Turdus philomelos*)

EDAD: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (RESTOS)

SEXO: I

DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador

CNEA: -

OBSERVACIONES: Restos del plumaje depredados, no fresco.

CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA:

Identificación: AP-48

Distancia (m): 57 m

Orientación: Noreste

HABITAT DEL ENTORNO:

Campo de almendros.

COORDENADAS UTM

ETRS89-Huso 30 634316 4632926

OBSERVACIONES:

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Parque Eólico El Campo	FECHA REGISTRO: 12/09/2023 HORA REGISTRO: 11:56
TÉCNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	
DEPOSITADO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CÓDIGO: EC-14

**CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: ( <i>Pipistrellus sp</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Fallecido (Cuerpo frac. y dep.)	SEXO: I
DIAGNÓSTICO: Probable colisión con el aerogenerador.	CNEA: -
OBSERVACIONES: Depredado por hormigas, Falta la cabeza y el ala izda, que no se localizan.	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MÁS PRÓXIMA: Identificación: EC-06 Distancia (m): 18 Orientación: Este	
HÁBITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS (ETRS89) UTM <sub>x</sub> : 625.598 UTM <sub>y</sub> : 4.640.948
OBSERVACIONES:	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

### DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 19/09/23/ HORA REGISTRO: 11:30
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-15
TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo	

### CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: - ( <i>Pipistrellus sp.</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Cuerpo Fresco y entero	CAT.REGIONAL: -

### LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA:	
Identificación: EC 04 Distancia (m): 20 m Orientación: Noroeste	
HABITAT DEL ENTORNO: Plataforma	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624499 4641474
OBSERVACIONES: Se toman datos necesarios y se lleva al arcon de la set	

### FOTOGRAFIA DE DETALLE



### FOTOGRAFÍA PANORAMICA



DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 26/9/23/ HORA REGISTRO: 11:40
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-16
TECNICO DEL HALLAZGO: Ángel Rubio Palomar	

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Murciélago enano ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Cuerpo entero, depredado por hormigas, no fresco.	CAT.REGIONAL: -

LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 05 Distancia (m): 6 m Orientación: Este	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 625283 4640770
OBSERVACIONES:	

FOTOGRAFIA DE DETALLE



FOTOGRAFÍA PANORAMICA



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 26/9/23/ HORA REGISTRO: 11:45
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-17
TECNICO DEL HALLAZGO: Ángel Rubio Palomar	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: - ( <i>Pipistrellus sp.</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO DEPREDADO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Depredado por hormigas, no fresco.	CAT.REGIONAL: -


**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 05 Distancia (m): 9 m Orientación: Sur	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 625275 4640769
OBSERVACIONES:	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE**



**FOTOGRAFÍA PANORAMICA**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 03/10/23/ HORA REGISTRO: 10:40
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-18
TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Murciélago enano ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO DEPREDADO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Parcialmente devorado	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 05 Distancia (m): 30 m Orientación: Este	
HABITAT DEL ENTORNO: Plataforma. Cultivo	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 625269 4640737
OBSERVACIONES: Se toman datos necesarios y se lleva al arcón de la set	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION:

El Campo

FECHA REGISTRO: 03/10/23/

HORA REGISTRO: 10:45

DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.

CODIGO: EC-19

TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**ESPECIE: Murciélago enano (*Pipistrellus pipistrellus*)

EDAD: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO DEPREDADO)

SEXO: I

DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador

CNEA: IL

OBSERVACIONES: Parcialmente devorado

CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA:

Identificación: EC 05

Distancia (m): 70 m

Orientación: Noreste

HABITAT DEL ENTORNO:

Cultivo

COORDENADAS UTM

ETRS89-Huso 30 625332 4640724

OBSERVACIONES: Se toman datos necesarios y se lleva al arcón de la set

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

### DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 17/10/23/ HORA REGISTRO: 11:12
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-20
TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo	

### CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Grajilla occidental ( <i>Corvus monedula</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO FRACCIONADO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Cuerpo entero fraccionado	CAT.REGIONAL: -

### LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 03 Distancia (m): 43 m Orientación: Noroeste	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivo seco	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624306 4641100
OBSERVACIONES: Se toman datos necesarios y se lleva al arcón de la set.	

### FOTOGRAFIA DE DETALLE



### FOTOGRAFIA PANORAMICA



### DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 17/10/23/ HORA REGISTRO: 11:56
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-21
TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo	

### CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: - ( <i>Pipistrellus sp.</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO FRACCIONADO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Cuerpo entero fraccionado	CAT.REGIONAL: -

### LOCALIZACION

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 05 Distancia (m): 15 m Orientación: Oeste	
HABITAT DEL ENTORNO: Plataforma.	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 625253 4640784
OBSERVACIONES: Se toman datos necesarios y se lleva al arcón de la set.	

### FOTOGRAFIA DE DETALLE



### FOTOGRAFÍA PANORAMICA



## DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 31/10/2023 HORA REGISTRO: 9:52
DEPOSITO: Depositado en arcón congelador de la set El Campo	CODIGO: EC-22
TECNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	

## CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

ESPECIE: Estornino negro ( <i>Sturnus unicolor</i> )	EDAD: Adulto
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Cuerpo entero, con golpe en la cabeza.	CAT.REGIONAL: -

## LOCALIZACION

## REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA:

Identificación: EC 06  
Distancia (m): 60 m  
Orientación: Noroeste

HABITAT DEL ENTORNO:  
Páramo con pinar joven cerca.

COORDENADAS UTM  
ETRS89-Huso 30 625603 4641011

OBSERVACIONES:

## FOTOGRAFIA DE DETALLE



## FOTOGRAFÍA PANORAMICA



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 25/10/23/ HORA REGISTRO: 13:30
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-21
TECNICO DEL HALLAZGO: Andrés Fernández Jiménez	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Murciélago rabudo ( <i>Tadarida teniotis</i> )	EDAD: Adulto
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: M
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Cadáver fresco y entero	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 06 Distancia (m): 42 m Orientación: Suroeste	
HABITAT DEL ENTORNO: Linde entre cultivo y un vial.	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 625585 4640127
OBSERVACIONES: Se recogen los datos necesarios y se traslada al arcón de la SET	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 17/11/23/ HORA REGISTRO: 11:17
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-22
TECNICO DEL HALLAZGO: Rubén Cándido Del Campo	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: - ( <i>Pipistrellus sp.</i> )	EDAD: Indeterminado
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: -
OBSERVACIONES: Cuerpo fresco y entero	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 04 Distancia (m): 10 m Orientación: Sur	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivo	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624531 4641457
OBSERVACIONES:	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION: El Campo	FECHA REGISTRO: 29/11/2023 HORA REGISTRO: 10:40
DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.	CODIGO: EC-23
TECNICO DEL HALLAZGO: Marta Arribas	

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**

ESPECIE: Buitre leonado ( <i>Gyps fulvus</i> )	EDAD: Joven
ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (CUERPO ENTERO)	SEXO: I
DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador	CNEA: IL
OBSERVACIONES: Cuerpo entero.	CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA: Identificación: EC 04 Distancia (m): 70 m Orientación: Sur	
HABITAT DEL ENTORNO: Cultivos	COORDENADAS UTM ETRS89-Huso 30 624528 4641389
OBSERVACIONES:	

**FOTOGRAFIA DE DETALLE**



**FOTOGRAFÍA PANORAMICA**



**DATOS IDENTIFICATIVOS**

NOMBRE DE LA INSTALACION:

LAT El Campo

FECHA REGISTRO: 22/11/23/

HORA REGISTRO: 11:45

DEPOSITO: Se lleva al arcón de la SET tras avisar al APN correspondiente.

CODIGO: LCA-05

TECNICO DEL HALLAZGO: Ángel Rubio Palomar

**CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE**ESPECIE: Estornino negro (*Sturnus unicolor*)

EDAD: Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACION: FALLECIDO (RESTOS)

SEXO: I

DIAGNOSTICO: Colisión con aerogenerador

CNEA: -

OBSERVACIONES: Restos del plumaje depredados, no fresco.

CAT.REGIONAL: -

**LOCALIZACION**

REFERENCIA A LA ESTRUCTURA MAS PROXIMA:

Identificación: AP-32

Distancia (m): 123 m

Orientación: Noroeste

HABITAT DEL ENTORNO:

Cultivos

COORDENADAS UTM

ETRS89-Huso 30 630401 4633134

OBSERVACIONES:

**FOTOGRAFIA DE DETALLE****FOTOGRAFÍA PANORAMICA**

**PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL**

**ANEXO V: INFORME DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA**



**EVALUACIÓN DE NIVELES DE INMISIÓN ACÚSTICA AL AMBIENTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EÓLICO EL CAMPO.**

T E S T A



**INFORME 2023**

Informe periódico sobre los niveles de  
inmisión acústica del parque eólico El

Campo

Campaña 2023


## Contenido

<a href="#">UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</a> .....	3
<a href="#">SITUACIÓN DE MEDIDA</a> .....	6
<a href="#">NORMATIVA DE REFERENCIA Y PROCEDIMIENTO EMPLEADO</a> .....	8
<a href="#">IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA</a> .....	10
<a href="#">PUNTOS DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA</a> .....	12
<a href="#">EQUIPO CON EL QUE SE HA EFECTUADO LA MEDICIÓN</a> .....	14
<a href="#">DETERMINACIÓN DE LOS VALORES:</a> .....	15
<a href="#">CONCLUSIÓN</a> .....	19
<a href="#">CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS</a> .....	21

### UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

El parque eólico El Campo se emplaza en los términos municipales de Mallen, Fréscano, Borja, Agón y Magallón en Zaragoza . Se encuentra en una zona sin núcleos de población, siendo las más cercanas Mallen, Fréscano, Borja, Agón y Magallón.

El peticionario y titular de la actividad es La sociedad Testa Calidad y Medioambiente S.L., con NIF B47462940 y domicilio social en Calle Estación 11-2A de Valladolid.



*Ubicación del Parque eólico*

El parque consta de 6 aerogeneradores AW-132 de 3,3 MW de potencia nominal con 84 m de altura de buje y 132 m de diámetro de rotor distribuidos en el campo eólico, por lo que la potencia total instalada será de 19,8 MW.

Las posiciones de los aerogeneradores referidas a coordenadas UTM Huso 30 ED 50 son las siguientes:

PE El Campo	X etrs89	Y
EC01	623682	4640585
EC02	624051	4640863
EC03	624327	4641139
EC04	624533	4641466
EC05	625277	4640774
EC06	625582	4640962

## SITUACIÓN DE MEDIDA

Considerando la situación y las edificaciones más afectadas, se decidió medir en los puntos descritos a continuación.

Se eligieron los puntos de medición por dos motivos principales:

- No existencia de otras fuentes de ruido que pudiesen afectar a la medición.
- Encontrarse en un punto protegido del viento relativamente, a la vez de cumplir las condiciones para ser considerado "Campo libre".

Los puntos elegidos para la medición pueden considerarse los más significativos para la realización de la medición, al ser los puntos más cercanos a diferentes aerogeneradores donde existen construcciones,

Las mediciones se realizaron el día 21 de diciembre de 2023 entre las 17h hasta la 01h horas. La DIA contempla mediciones en períodos día (Desde las 07.00 hasta las 19.00h) tarde (Desde las 19:00 hasta las 23:00) y noche de 23:00 a 07:00 horas), por lo que se realizaron mediciones en los diferentes períodos.

Se desconoce la producción del parque en el momento de las mediciones.

## NORMATIVA DE REFERENCIA Y PROCEDIMIENTO EMPLEADO

A continuación, se especifica la normativa de referencia y la justificación técnica de la metodología y puntos de medida seleccionados, basándose en la ubicación del parque y la normativa de medición

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre de 2003, del Ruido.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica en Aragón.
- UNE-ISO 1996-2:2009 Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental.

Si bien, será la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica en Aragón la normativa de referencia al estar referidas a esta normativa los requerimientos de la Declaración de Impacto Ambiental del parque.

A continuación, se especifican las condiciones de medidas establecidas por dicha norma, así como algunas soluciones técnicas necesarias para su adaptación a parques eólicos:

- Altura de medida:  $4 \pm 0,5$  metros respecto al nivel del suelo. Se usarán como referencia de viento las mediciones del aerogenerador.
- Ubicación de los equipos: Las localizaciones de los equipos deberán ser representativas de la exposición de la construcción al ruido ambiental, tratando de evitar que los niveles sonoros estén contaminados por focos ruidosos no habituales de la zona. Para ello se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar la ubicación del equipo durante la visita de campo.

- Correcciones por reflexiones: La ubicación ideal es la denominada "posición de campo libre".

Cuando la distancia desde el micrófono a cualquier superficie reflectante, aparte del suelo, es al menos dos veces la distancia desde el micrófono a la parte dominante de la fuente sonora, se puede hablar de posición de campo libre de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1996-2:2009.

En el caso de los puntos de medida, los aerogeneradores más cercanos se encuentran a una distancia de cientos de metros, por lo que no es posible verificar dicha condición y es necesario demostrar que la reflexión tiene un efecto mínimo mediante cálculos, como la propia norma permite.

Para el caso objeto de estudio, se propone la verificación de los siguientes condicionantes mediante un modelo de predicción sonora basado en la norma ISO 9613 :1993 Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors Part 1: Calculation of absorption of sound by the atmosphere y Part 2 : General method of calculation :

1. La aportación sonora producida por las reflexiones sobre los obstáculos y el terreno es inferior en 6 dBA a la contribución acústica por vía directa del foco principal.
2. Las condiciones de campo libre se verifican cuando el micrófono se sitúe al menos a 5 metros de distancia de cualquier fachada o superficie reflectante exceptuando el suelo.

## IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA

Las edificaciones objeto de estudio serán las denominadas como punto 1 a punto 2, considerados los puntos que presentan posible afectación.

Dichas edificaciones son de uso indefinido donde, tras la realización de una inspección in situ de las edificaciones, se procede a situar el sonómetro en el punto de medición, atendiendo a la "posición de campo libre" de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1996-2 :2009.

Para la selección de la propuesta de localización se emplearon los siguientes criterios:

1. Representatividad de los niveles sonoros: Los niveles sonoros deben ser representativos de la afección a la que se encuentra sometida la vivienda, pero a una distancia suficiente para evitar una excesiva influencia del ruido no deseado. La distancia a otros focos ruidosos del área (carreteras, terrenos de labor) deberá ser similar a la existente a las edificaciones.

2. Altura del terreno: La cota de instalación del equipo deberá ser similar a la cota del edificio evaluado, con vistas a que presente la misma visibilidad a los aerogeneradores.

3. Reflexiones: El micrófono deberá encontrarse en situación de campo libre conforme anteriormente.

Reflexiones: Se ha seleccionado un punto de medida situado a varios metros de distancia, dónde se verifican las condiciones de campo libre descritas anteriormente.

Dada la ubicación del parque y de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica en Aragón y en particular en sus anexos III y IV, se propone la siguiente clasificación en zonas acústicas de la zona objeto de estudio:

Anexo III

Punto 3º

En la tabla 6 se establecen los valores límite de inmisión de ruido corregidos Lkd, Lke, Lkn aplicables a actividades.

Tipo de área acústica		Índices de ruido		
		$L_{k,d}$	$L_{k,e}$	$L_{k,n}$
b	Áreas de alta sensibilidad acústica	50	50	40
c	Áreas de uso residencial	55	55	45
d	Áreas de uso terciario	60	60	50
e	Áreas de usos recreativos y espectáculos	63	63	53
f	Áreas de usos industriales	65	65	55

tabla 6: Valores límite de inmisión de ruido corregidos  $L_{k,d}$ ,  $L_{k,e}$ ,  $L_{k,n}$

Del mismo modo y como se indica en el Anexo IV, se tendrán en cuenta los métodos descritos para la evaluación de los índices asociados a los objetivos de calidad acústica, límites y otros elementos de medición.

- Áreas de uso residencial Tipo c: Sectores del territorio con predominio desuelo de uso residencial: Para la valoración de los Objetivos de Calidad Acústica en el Exterior se considerarán bajo esta tipología todas las edificaciones residenciales de tipo rural identificadas. A priori se establece bajo el principio de máxima precaución, que todas las edificaciones identificadas como residenciales están habitadas y no están en contradicción con la legalidad urbanística.

## PUNTOS DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA

Tras la realización de una inspección in situ de las edificaciones se seleccionaron las ubicaciones del punto de medida, atendiendo a la "posición de campo libre" de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1996- 2:2009

El punto seleccionado se encuentra al mismo nivel de la fachada más expuesta, situado a 3,5 metros de distancia, dónde se verifican las condiciones de campo libre descritas. El micrófono se situó a una altura relativa de 4 metros.

Para la realización del estudio se utiliza la metodología señalada en la Ley 7/2010, utilizando el rango de frecuencias de interés en bandas de octava comprendido como mínimo entre 125 Hz y 2000 Hz.

Para la toma de datos se tomaron medidas contra posibles errores de medición por efecto pantalla situándose el observador en el plano normal al eje del micrófono y lo más separado posible del mismo, contra la distorsión direccional y sin sobrepasar las condiciones límites de funcionamiento del sonómetro.

Previamente a cada medida de las fuentes de ruido instaladas, se realizó la medición de ruido de fondo correspondiente en la zona analizada, corrigiéndose los valores de inmisión. Si la diferencia está entre 7 y 10 dB(A) corrección de 0,5 dB(A), si la diferencia está entre 5 y 7 dB(A) corrección de 1 dB(A), si la diferencia está entre 4 y 5 dB(A) corrección de 2 dB(A) Y si la diferencia está entre 3 y 4 dB(A) corrección de 3 dB(A).

En los casos en los que la diferencia es inferior a 3 dB(A) la medida del nivel de fondo enmascara el valor de inmisión de la fuente.

### Ponderación

Se usa en las medidas la **ponderación de tipo "A"** según lo indicado en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica en Aragón. Los valores significativos en las mediciones obtenidas, se tiene que el índice de ruido  $L_{K_{eq},T}$ , es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ( $L_{Aeq,T}$ ), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_1 + K_2 + K_3$$

Donde:

- $K_t$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$  para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el anexo IV;
- $K_f$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el anexo IV;
- $K_i$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el anexo IV;
- Si  $T = d$ ,  $L_{K_{eq},d}$  es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido, determinado en el período día;
- Si  $T = e$ ,  $L_{K_{eq},e}$  es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido, determinado en el período tarde;
- Si  $T = n$ ,  $L_{K_{eq},n}$  es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido, determinado en el período noche;

#### **EQUIPO CON EL QUE SE HA EFECTUADO LA MEDICIÓN.**

La medición se efectuó utilizando para ello el sonómetro integrador con analizador de tercios de octava de la marca CESVA, modelo SC310, n° de serie T235487, CANAL: N/A.

La fecha de la última verificación realizada al equipo es el 17-05-2023 y número de Certificado 23LAC25917F01, ver adjunto.

Del mismo modo, se utilizó un calibrador sonoro para la verificación de las medidas tomadas en el presente estudio de la marca CESVA modelo CB-006, n° de serie 0049942.

La fecha de la última verificación realizada al equipo es el 17-05-2023 y Número de Certificado 23LAC25917F03, ver adjunto.

Se adjunta copia de los certificados de verificación tanto del calibrador como del sonómetro utilizados para la medición en el último apartado de este certificado.

**DETERMINACIÓN DE LOS VALORES:**

Como norma general, en la realización de las mediciones se han seguido los siguientes criterios:

Las medidas en exteriores se efectuaron a 4 metros sobre el suelo.

**Ruido de fondo:**

Para la evaluación de los niveles de ruido en la forma reseñada anteriormente se tendrá en consideración el nivel sonoro de fondo que se aprecie durante la medición conforme lo señalado a continuación.

El ruido de fondo puede afectar al resultado de las mediciones efectuadas, por lo que hay que realizar correcciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Diferencia entre el nivel con la fuente de ruido funcionando y el nivel de fondo ( $\Delta L$ ) y corrección a sustraer del nivel medido con la fuente de ruido en funcionamiento.

$\Delta L < 3$ dB(A).	Medida no válida.
$3 \leq \Delta L < 4$ dB(A).	3 dB(A).
$4 \leq \Delta L < 5$ dB(A).	2 dB(A).
$5 \leq \Delta L < 7$ dB(A).	1 dB(A).
$7 \leq \Delta L < 10$ dB(A).	0.5 dB(A).
$\Delta L \geq 10$ dB(A).	0 dB(A).

Las mediciones de ruido de fondo se realizaron en el mismo paraje, en una zona en la que se consideró nula la influencia del ruido generado por el parque eólico.

El resumen de los resultados obtenidos aparece en la siguiente tabla. Los ficheros en bruto se encuentran disponibles para consulta en formato digital.

A continuación, se adjuntan los valores de las medidas tomadas respecto al nivel de inmisión en la edificación y al exterior.

		<b>Balsa La Estanca</b>	
		41° 53' 21,1"N 1° 31' 0,8"W	
		Viento	8,7
		Fecha	12/21/2023
		<b>Ld</b>	<b>Le</b>
		<b>40,2</b>	<b>43,8</b>
		<b>Ln</b>	<b>49,6</b>
		dB(A)	
		Condiciones de medición: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAT 1 min</li> <li>• 6 mediciones por toma</li> <li>• Media ponderada de mediciones válidas (+-3 dB sobre valor medio)</li> <li>• Calibración 94 dB</li> </ul>	

		<b>Base AG</b>	
		41° 54' 27,3"N 1° 30' 29,9"W	
		Viento	8,7
		Fecha	12/21/2023
		<b>Ld</b>	<b>Le</b>
		<b>56,1</b>	<b>55,7</b>
		<b>Ln</b>	<b>61,5</b>
		dB(A)	
		Condiciones de medición: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAT 1 min</li> <li>• 6 mediciones por toma</li> <li>• Media ponderada de mediciones válidas (+-3 dB sobre valor medio)</li> <li>• Calibración 94 dB</li> </ul>	

## CONCLUSIÓN

Según los resultados del estudio de inmisión acústica realizado y según las condiciones máximas respecto a niveles de inmisión en otros locales establecidos en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica en Aragón, se establece:

### Anexo III

#### 1. Punto 3º

En la tabla 6 se establecen los valores límite de inmisión de ruido corregidos  $L_{kd}$ ,  $L_{ke}$ ,  $L_{kn}$  aplicables a actividades.

Tipo de área acústica		Índices de ruido		
		$L_{kd}$	$L_{ke}$	$L_{kn}$
b	Áreas de alta sensibilidad acústica	50	50	40
c	Áreas de uso residencial	55	55	45
d	Áreas de uso terciario	60	60	50
e	Áreas de usos recreativos y espectáculos	63	63	53
f	Áreas de usos industriales	65	65	55

tabla 6: Valores límite de inmisión de ruido corregidos  $L_{kd}$ ,  $L_{ke}$ ,  $L_{kn}$

La medición indica que los niveles de ruido generados por el parque eólico en las viviendas más cercanas son inferiores a los valores máximos descritos en la normativa de aplicación en los períodos día – tarde (55 dBA) y noche (45 dBA).

Por lo tanto, en cuanto a las fuentes de ruido analizadas se expone lo siguiente:


**CUMPLE los valores de inmisión permitidos en la Declaración de Impacto Ambiental para las fuentes de ruido analizadas.**

Zaragoza, diciembre 2023  
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo: José Mª Santa Bárbara  
Colegiado 8241 COITIAI

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS

<b>CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN</b>	
Instrumentos de medición de sonido audible y calibradores acústicos	
FASE DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO	
 <b>LACAINAC</b> <small>laboratorio de calibración</small>	<b>LACAINAC</b> <b>LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS</b> <b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7, 29031 – Madrid. Tel.: (+34) 91 067 89 66 / 67 <a href="http://www.lacainac.es">www.lacainac.es</a> – <a href="mailto:lacainac@2a2.upm.es">lacainac@2a2.upm.es</a>
TIPO DE VERIFICACIÓN:	PERIÓDICA
INSTRUMENTO:	SONÓMETRO
MARCA:	CESVA MICRÓFONO: CESVA PREAMPLIFICADOR: CESVA
MODELO:	SC-310 MICRÓFONO: C-130 PREAMPLIFICADOR: PA13
NÚMERO DE SERIE:	T235487, CANAL: N/A MICRÓFONO: 11036 PREAMPLIFICADOR: 3360
EXPEDIDO A:	Colegio Of. Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ing. Técnicos Industriales de Aragón Paseo María Agustín, 4-6 Of. 17 50004 ZARAGOZA
FECHA VERIFICACIÓN:	17/05/2023
CÓDIGO CERTIFICADO:	23LAC25917F01
REGISTRO DE AJUSTE:	17/05/2023
PRECINTOS:	16-I-0220105 (lateral) 16-I-0220106 (lateral)
Director Técnico	
<p>Este Certificado se expide de acuerdo a la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida (BOE nº47 24/02/2020).</p> <p>El presente Certificado tiene una validez de un año a contar desde la fecha de verificación del mismo, y acredita que el instrumento sometido a verificación ha superado satisfactoriamente todos los ensayos y exámenes administrativos establecidos en la Orden ICT/155/2020. La verificación ha sido realizada por LACAINAC.</p> <p>La presente verificación solo es válida si se mantienen las condiciones que dieron lugar a los ensayos de verificación; por ello, no se debe realizar ningún tipo de ajuste de servicio, que provocaría la anulación del presente certificado.</p> <p>LACAINAC es un Organismo Autorizado de Verificación Metrológica para la realización de los controles metrológicos establecidos en la Orden citada, por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (Resolución de 11 de marzo de 2019), con número de identificación 16-OV-1002.</p> <p>LACAINAC es un Organismo de Verificación Metrológica acreditado por ENAC con certificado nº 423/EI623.</p>	
	

<b>CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN</b>	
Instrumentos de medición de sonido audible y calibradores acústicos	
FASE DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO	
 <b>LACAINAC</b> <small>laboratorio de calibración</small>	<b>LACAINAC</b> <b>LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS</b> <b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7, 28031 – Madrid. Tel.: (+34) 91 067 89 66 / 67 <a href="http://www.lacainac.es">www.lacainac.es</a> – <a href="mailto:lacainac@2a2.upm.es">lacainac@2a2.upm.es</a>
TIPO DE VERIFICACIÓN:	PERIÓDICA
INSTRUMENTO:	CALIBRADOR ACÚSTICO
MARCA:	CESVA
MODELO:	CB006
NÚMERO DE SERIE:	0049942
EXPEDIDO A:	Colegio Of. Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ing. Técnicos Industriales de Aragón Pasco María Agustín, 4-6 Of. 17 50004 ZARAGOZA
FECHA VERIFICACIÓN:	17/05/2023
PRECINTOS:	16-I-0207103 (lateral) 16-I-0207104 (lateral)
CÓDIGO CERTIFICADO:	23LAC25917F03
<b>Director Técnico</b>	
<p>Este Certificado se expide de acuerdo a la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida (BOE nº47 24/02/2020).</p> <p>El presente Certificado tiene una validez de un año a contar desde la fecha de verificación del mismo, y acredita que el instrumento sometido a verificación ha superado satisfactoriamente todos los ensayos y exámenes administrativos establecidos en la Orden ICT/155/2020.</p> <p>La verificación ha sido realizada por LACAINAC.</p> <p>LACAINAC es un Organismo Autorizado de Verificación Metrológica para la realización de los controles metrológicos establecidos en la Orden citada, por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (Resolución de 11 de marzo de 2019), con número de identificación 16-OV-1002.</p> <p>LACAINAC es un Organismo de Verificación Metrológica acreditado por ENAC con certificado nº 423/E1623.</p>	
	